



Not in Sculsky.









# KORTBEGRIJF

VAN HET ZAMENSTEL DER

# NATUUR,

VAN DEN HEER

C. LINNAEUS,

MET ZEER VEELE ZOORTEN  
VERMEERDERT DOOR

P. BODDAERT,

*Med. Doct., Oudraad der Stad VLISSINGEN,  
Lid van den Keizerlyke Academie der Natuuron-  
derzoekeren, van de HOLLANDSCHE  
Maatschappy der Wetenschappen te HAAR-  
LEM, en van het ZEEUWSCHE Ge-  
noodschap der Wetenschappen te  
VLISSINGEN.*

E E R S T E D E E L.


E E R S T E S T U K.

---

*T e U T R E C H T,*

By J. VAN SCHOONHOVEN, EN COMP.

M D C C L X X I I.



KOBIETSKI

1914



QH  
43  
89913  
1772  
SCHNHR

# O P D R A C H T,

Aan den Wel Edelen zeer Geleerden Heer  
den Heer

NICOLAAS LAURENTIUS BUR-  
MANNUS, M. D.

*Hoogleeraar in de Kruidkunde in het Doorlugtig  
School te Amsterdam, Lid van de Academie  
der Wetenschappen te Halle, en van het  
Zeeuwfche Genootfchap der Wetenschappen  
te Vliffingen:*

Den Wel Edelen Heere

WILLEM VAN DER MEULEN,

*Capitein der Burgery te Amsterdam, Lid van het  
Genootfchap der Wetenschappen in den Opper  
Laufitz, Directeur van het Zeeuwfch Ge-  
nootfchap der Wetenschappen te Vliffingen:*

Den Wel Edelen Heere

P I E T E R C R A M E R,

*Koopman te Amsterdam, Directeur van het Zeeuw-  
fche Genootfchap der Wetenschappen te Vliffingen.*

W e l E d e l e H e e r e n !

**J**ndien eene opregte Vriendschap, en gulhartige  
verkeering, indien aanmoediging en hulp in de  
Wetenschappen, aan een gemoed dat van zynen  
plicht bewustis, de blyken van dankbaare erkentenis afvoor-  
derdt, reken ik my dezelve aan U Edl. verschuldigt,

# OPDRACHT.

de vrye toegang tot U Ed. ryke Natuurschatten, die zelv van vreemdelingen bezocht en bewonderd worden, en uit welke U Ed. my veele zeldzaame Stukken hebt gelieven te vereeren, (nooit immers scheidde ik van U Ed. wooningen, zonder vermeerdering van kennis en bezitting), eischten een openbaar bewys van erkentenis.

Ontfang dan Myn Heeren, dit werk, op U Ed. raad aangevangen, door U Ed. verzamelingen vermeerdert boven het oorspronkelijke en met Uwe hulp zamengesteld; U Ed. kundigheeden zoo bekend, en geacht, als U Ed. verzamelingen, zullen het zelve een aanzien byzetten, die het zonder U Ed. naamen op het Voorhoofd te draagen zoude moeten misfen. Ik beveel het derhalven U Edl. bescherming aan. En eindige met bede, dat het den bron van alle kennis en wetenschap behaage, U Ed. personen en huisgezinnen noch lange met zyne Zegeningen te bekroonen, tot bevordering van alle nuttige Kuudigheden, tot bloey van Amstels Koophandel, en dat die twee Pylers van ons Vaderland, noch door U Ed. kennis en zorg, het Gemeenebest doen bloeyen, en onze Nabuuren tot verwondering strekken moogen; my verder in U Ed. zoo dikwyls onderwonden Vriendschap aanbevelende, noeme ik my met agting:


Wel Edele Heeren!

U E. D. W. Dienaar;

P. BODDAERT.

VOOR-

# VOORREDE.

 **D**AT de kennis der geschapen Wezens eene van de uitgebreidste is, welke zich aan het menschelyk vernuft opdoen, toonen alle de voorwerpen, welke zich rondsom bevinden, en tot welke alle wy eenige betrekking hebben; zommige znn ons van een wezentlyk nut, als door de voorzienigheid geschikt, om ons voedzel en dekzel te verzorgen, ons behulpzaam te zyn in onze bezigheden, en door zekere byzondere eigenschappen ons te vermaaken, of tot heilzaame geneesmiddelen te dienen. Dus zien wy, dat alle de geschapen wezens tot nut van den Mensch moeten dienen, het zy om zyne kundigheden te ver-

## IV V O O R R E E D E.

meerderen, of zyne behoefte te hulpe te komen.

HET is derhalven onze verpligting om deze te kennen. Maar hier opend zich zulk een uitgebreid veld van geschapen wezens, zulk een talrykheid, dat 'er om met den Heer BUFFON te spreken een zekere moed nodig is, om de Natuur in het aangezicht te durven zien; en inderdaad de menigte der voorwerpen verward in den eersten opslag de verbeelding en het geheugen: maar wanneer men Dieren, Planten, en Delfstoffen van elkander affcheid, en yder dezer in hunne benden, rangen en geslagten verdeeld, verkrygt men wel geschikte tafereelen, en de Natuur vertoond zich eenvoudig en in haar eigen gedaante. Hier door  
vor-

## V O O R R E E D E. VII

vordert men niet flegts in de kennis van yder geflacht of bende op zich zelve, maar men ziet het verband, dat zy onderling met elkander hebben. Want het getal, de hoedanigheid en gedaante der deelen, is altoos gefchikt naar het oogmerk dat de *Schepper* in dezelve heeft; en dewyl de volmaaktheid der deelen van een Dier fteeds afneemt, in evenredigheid van het meer of min dierlyk leven, volgt noodzakelyk dat er van den Mensch tot de Plantdieren, en van daar tot de Planten en Delfftoffen een zeker verband moet plaats hebben. Welk verband dien fchakel uitmaakt, met welk alle de gefchapen wezens aan elkander verbonden zyn; en dit heeft niet alleen plaats in de uiterlyke gedaante, maar ook, en wel voornaamentlyk in het

## VIII V O O R R E E D E.

werktuigelyk zaamenstel; hier ziet men die trappen, by welke de natuur afdaalt, ten duidelyksten. En de levenswyze, voeding, voortteeling en groeiing kunnen alleen door hunne overeenkomst of verschil dien grooten schakel aanwyzen. Onder deze beschouwingen is de Dierkunde de voornaamste, de nuttigste en de uitgebreidste. De Dieren, zegt de Heer BUFFON, (1) vereenigen alle de magten der Natuur, en de vermogens die hen bezielen zyn hun eigen en byzonder, zy willen, zy werken, zy bepaalen zich, door hunne zintuigen vereenigen zy zich met de afgelegenste voorwerpen, yder Dier is een middelpunt, alwaar alles

(1) BUFFON *Hist. Nat.* tom. II. pag. 3. (*edit. Amsterd.*)

## V O O R R E E D E. IX

les zamen loopt, en de geheele wereld als in weder gekeert word; en met de Planten hebben zy 't vermogen van groeijen, ontzwagtelen, voortteelen, en vermenigvuldigen gemeen, niet alleen, maar zy hebben zelf een groeibaar leven, en veel overeenkomst met de Planten en Delfstoffen; want de Aarde, die wy betreedden, dient om het Dierlyk ligchaam door middel van de Planten te voeden, en dit keerd weder tot Aarde niet alleen, maar de deelen der Dieren van hun zout, water, olie, en vluggen geeft afgescheiden, laten een aardagtig overblyfzel na; dit was alles wat *Augustus* van den Grooten *Alexander* zag.

EDOCH de Dieren hebben met de Planten eene nauwer vereeniging.

## x V O O R R E E D E

Laaten wy , zegt een der grootste  
Natuurkenners ( 2 ) van onzen tyd ,  
„ de Dieren beschouwen , die als  
„ noch niet ontrolde Planten zyn , en  
„ die de werktuigen , welke in de  
„ Planten naar buiten uitgespreid zyn ,  
„ in zich besluiten . De Dieren be-  
„ staan uit een vaatachtig zamenstel ,  
„ dat zeer takkig is , en de Levens-  
„ boom kan genoemd worden , dat  
„ met het geheel adergestel in ee-  
„ nen veelvormingen verlaatbak ge-  
„ worteld is , en het voedzel door zyn  
„ eigen opening krygt , en door het  
„ slagaderlyk einde , ( overeenko-  
„ mende met in de Lucht zwaaijende  
„ takken ) in oneindig veele werk-  
„ tuigen geschikt word , en alom door  
„ een

(2) PALLAS *Lyf van Plantd.* bl. 9. 10.



„ een vleesachtig gestel ondersteund  
 „ en zamen geweeven, in de opper-  
 „ vlakke van het Ligchaam eindigt,  
 „ gelyk een boom in zyn bladen.  
 „ De Lucht word ingeademdt door  
 „ zeer getakte werkbuizen, en, ge-  
 „ lyk in de Planten door buizen, door  
 „ het geheele Ligchaam geleidt.  
 „ Daar word in het Lichaam van het  
 „ Dier een Ey gemaakt, dat gelyk is  
 „ aan het zaad der Planten”.

DE Ridder LINNAEUS heeft ook deze overeenkomst, tusschen een Dier en een plant aangetoond (3). En op een andere plaats toond de Heer PALLAS dat 'er Dieren zyn, welke geen bloeds omloop hebben, maar alwaar de

(3) LINN. Syst. XII. tom. I, pag. 15.

## XII V O O R R E E D E.

de vochten even als in de Planten opklimmen (4).

BEHALVEN dat zyn'er in de Dieren verscheiden deelen, die als Planten groeyen, gelyk men voornaamentlyk in de Zeefterren, Kreeften en staarten der Haagdischen ziet. Is de voortteeling der Plantluizen, welke tot in het zesde geflagt, zonder vermeniging, vermenigvuldigen, niet gelyk aan die der Planten door zaaden gelyk de geleerde BONNET bewezen heeft (5)? Ziet men niet, dat de Polypen door takfschietingen, doorsnydingen, en door eyeren vermenigvuldigen

(4) PALLAS *Miscell. zool.* pag. 89.

(5) BONNET *Insectol.* tom. II. Zie ook mynen brief over de Coraalgewassen.

gen, even als de Planten door botten, zaaden (6), en ftekken. Eindelyk toonen de Plantdieren, de overeenkomst tuffchen de Dieren, en Planten ten klaarften (7).

De deelen welke het dierlyk Ligchaam uitmaaken zyn veel meer in getal, veel verfcheidener in zoort, en veel verfchillender in werkingen dan die van de Planten, of Mineraalen.

Indien wy het zamenftel der Planten beschouwen, zien wy dat het vaatagtig zamenftel uit *Houtvezelen*, *waterblaasjes*, *lugtbuizen* en *eigen vaat-*  
*ten*,

(6) TREMBLEY *Hift. des Polyp.* overal: en PALLAS *Lyst. van Plantd.* bl. 33—35.

(7) PALLAS *ubi supra* in de inleyding.

## XIV V O O R R E E D E.

*ten*, welke een gecoleurd fap voeren, bestaat.

DEZE vier soorten van Vaaten door alle de deelen van de Plant loopende, maaken drie voornaame bekleedzelen, de *Schorfch*, het *Hout*, en het *Merg*.

DE *Schorfch*, of het buitenfte bekleedzel der Planten, is, of glad en effen, of hobbelig en ruw; en zamengefteld uit breede, niet zeer digt aan een gevoegde Vezelen.

ONDER de *Schorfch* is het *Hout*, dat uit nauwere, digtere, en nader by elkander fttaande Vezelen bestaat, met minder tuffchenwydtens, minder Watervaaten en alleen Lugtvaaten hebbende.

HET

HET *Spint*, in het hart der Plant geplaatst, bestaat byna alleen uit Wattervaaten, die grooter en opgeblaa-zener zyn, dan die van het hout of de schorfch; en welke verminderen, opdroogen en verdwynen met den ouderdom van de Plant.

LAATEN wy de Planten *Phyfiologifch* befchouwen, dan zien wy, dat eene met zout en oliedeelen bezwangerde ftoffe, door de uiterfte mondjes der Wortelvezelen opgenoomen, in de Houtvezelen klimt, en in de waterblaasjes over gaat, en van daar, na dat het daar gekleinft is en bereyd, in een meer of min dik ge-oleurd Vocht, miffchien overeenkomftig met de Chyl der Dieren, overgaat in de zoogenaamde *Vafa propria*

## XVI V O O R R E E D E.

pria of eigen Vaaten. Hier word het door meer of min fyne buizen gekleinfst, en naar alle de deelen heen gevoerd; de uiterste fynheid van de buizen van het voedend Sap, die hen gelyk aan hair buisjes maakt, de werking van de Lucht op de veeragtige plaatjes der Luchtbuizen, en de weder werking van deze, op de Houtvezelen, welke zy omvatten, of van welke zy omvat worden, de warmte die het voedend sap uitzet, en voor al die, welke op de oppervlakte der bladeren werkt, maakt de uitwaaffening, en doet teffens het sap in de buizen klimmen. Hier is derhalven geen omloop van vochten, gelyk in Dieren; by dag wanneer de warmte op de bladeren werkt, fcheiden de kleinsvaaten (*Vasa excretoria*), welke de  
Heer

Heer GUETTARD het eerst in aanmerking genoomen heeft, en die zich aan de ribben van het Blad als bolletjes, pyramides, blaadjes &c. vertoonen, de wateragtige en grove-re deelen van het Sap, dat de wortel opneemt. De Lucht in de Luchtbuizen zich meer en meer uitzettende drukt de houtvezelen, en dringt dus het *Serum* of groeizap naar boven. De warmte van den Dag afneemende met den avond, openen zich de mondjes der bladeren, en slorpen gretig alle de uitwaasfemingen op, die in den Dampkring dryven. De Lugt, in de Lugtbuizen door geen warmte meer uitgezet, krimpt in, hier door zetten zich de houtvezelen uit, en neemen het sap in, dat hen door de bladeren gezonden wordt, deze zappen vereeni-

## XVIII V O O R R E E D E.

gen zich met het overfchot van het geen by dag opgeklimmen was, en loopen zamen naar den wortel.

DE Schorfch zend vezelen naar zyn uiterfte einde; het voedende zap der fchorfch niet verder konnende klimmen, of voortgaan, zet zich, door de aandrang van de ftraks te noemen deelen genoopt, naar alle kanten uit, en maakt een taay bekleedfel of bloemkelk, terwyl het hout zyne fynere vezelen, veelyds en meest al evenwydig aan de fchorfch dezelve groeiing geeft. Doch de eigen vaaten (*vasa propria*) met een gecoleurd fap bezwangerd, behouden hunne dikte, terwyl die der fchorfch allengskens dunner en doorzigtiger worden. Deze in eene of meer bondels verzameld fpreiden zich uit en  
maa-



maaken eene een- of veel- bladige bloem. De Lugtvaaten, zich verlengende en in verscheiden rolronde buizen zamen loopende, maaken de helmstyltjes (*Stamina*) terwyl het merg der Plant het stampertje voorbrengt.

DIT is kortelyk de ontleedkundige Natuurkunde der Planten, welke ik by de beschouwing van het zamenstel van het groeibaar Ryk nader zal inzien.

DE Dieren, uit meer zamengestelde deelen bestaande, hebben een geheel ander werktuig ter voeding.

DE *Oeconomia Animalis*, of dierlyke huishouding, bestaat wel, gelyk in

de Planten, uit vloeijbaare en vaste deelen. Edoch deze zyn van een geheel byzonder maakzel, zamenftel, en gebruik.

IN de Planten, zagen wy dit voedend fap opklimmen en uitwaaffemen, en weder daalen, of langs den zelve weg naar den wortel keeren.

LAATEN wy nu dit in de Dieren befchouwen.

DEZE ontfangen hun voedzel door den mond, welke aan den *Slokdarm* vastgehegt is, die weder zich in de maag inplant en met dezelve een ligchaam maakt, terwyl de andere opening der maag zich in de Darmen ontlast.

DE

## V O O R R E E D E. XXI

DE *Slok darm* ontfangt de gekauwde spyzen, brengt dezelve in de maag, alwaar zy door het maagsap bereid worden, en, door den spieragtigen rok gedrongen, naar de ingewaanden overgaan: hier worden zy door het sap van het Alvleesch (*Succus Pancreaticus*) het ingewandsap (*Succus Entericus*) en de gal bereid, een gedeelte derzelve word afgekleinst, en tot een vloeibaare stoffe gebragt, die in de Chylbak overgaat, en door de Chylbuis in het Bloed gebragt word. Dit Bloed loopt in sterke vliefigebuizen, welke beiden uit het hart haaren oorsprong hebben, en waar door de omloop geschiedt. Het gewigt van deze zaak, zoo door haare natuur, als door haare duuring en den toefstel van werktuigen, vereifcht onzen diepften aan-

\*\*

3

dacht,

## XXII V O O R R E E D E.

dacht, en inderdaad in deze beweging is zulke grootsche vertooning, en die zoo zeer het oog van een wysgeer moet treffen, dat hy in de diepste verwondering moet zeggen met den Koninglyken Dichter, dat hy op eene vreeffelyke wyze gemaakt is; en zich over de onbegrypelyke Almacht en wysheid van zynen grooten **MAKER** verwonderen.

IN het midden van de Borst, tuschen twee vaatachtige klompen (*Massa's* der Longen) legt het Hart, met zyne twee Ooren. Ieder Oor loopt in het Hart, en maakt daar twee holigheden. Dit Hart bestaat uit twee laaggen vleeschagtige vezelen, waarvan de eene schuin sch van het breedste eind naar de punt loopen, en de andere  
loopen

loopen dwars: dus veroorzaaken zy twederley bewegingen, die van het hart korter en wyder te maaken, en die van het zelve te vernauwen, en te verlengen. Het Hart fchynt deze twee bewegingen te verrigten, door als eene fchroef op haare spil te draayen.

TWEE groote vaten hegten zich aan beide ooren, een slagader en eene ader. De *slagader* van het regter oor brengt het bloed in de *Longen*. De regter Ader is de groote ftam van het *adergestel*, en brengt het bloed uit alle de deelen van het ligchaam weder naar het Hart. De *slagader* van het linker oor is de groote ftam van het *slagaderlyk gestel*, en brengt het bloed door het geheele ligchaam. De *Ader*

## XXIV V O O R R E E D E.

van het linker oor brengt het Bloed weder na het zelve. Deze Aders en *slagaders* verdeelen zich in verscheiden takken, welke weder takken naar alle de deelen van het Lichaam zenden; en in de uiterste deelen worden aders en slagaders in elkander door inmonding gevat, en het bloed keerd weder naar het hart.

MAAR deze omloop zoude ongenoegzaam zyn, indien niet het bloed telkens door toevoer van versche Lugt verfrist, en gezuiverd wierd. Dit nu geschied in verschillende Dieren op verschillende wyze, gelyk ik elders in het breede heb aengetoond (8). In het algemeen ademen de vier voetige Die-

(8) *Verbandel. der Holl. Maatschappy XIV.D.*

Dieren door middel van de Longen. Wat voor en ter zyden den flokdarm legt in viervoetige Dieren en vogelen een Luchtbus, die van vooren uit kraakbeenige ringen, en van agter uit een spieragtig vlies bestaat, doch in de meeste vogelen zyn dezelve geheel (9) gelyk ook in de Haagdischen. Deze Luchtbus verdeelt zich in twee takken, welke zich weder in veele alengskens kleiner wordende takjes verdeelen, welker einde in blaasjes en kliertjes eindigt. Uit de Longslagader, nu komen kleine takjes, welke langs de takjes van de Luchtbus heenen loopen; en dezelve voedsel verschaffen. Dit Longengestel verschilt egter na de woonplaatzen en aard der Dieren.

DE

(9) HALLER *Elem. Physiol.* tom. III.

## XXVI V O O R R E E D E.

DE Visschen ademen door kieuwen, de Insecten door Lugtgaten aan de zyden van het Lichaam geplaatst.

GEEN mindèr verscheidenheid vind men in de deelen der zintuigen van de Dieren. De Visschen, in een dikkere Middelftof levende, hadden een ander Cristallyn nodig dan de viervoetige; de oogen van der *Chamaeleon*, die van de *Hoogkyker* Vifch (10) zyn de eenige van die verwonderlyke soort in hunne benden, de oogen van de Insecten, Kreeften, Spinnen, Krabben, Slakken, Watervloijen verschillen alle van elkander. De gerimpelde hoorens van de Harten, de Hartebokken de dubbele ooren der Vledermuizen, het

(10) SEBA *Schatk. III.* pag. 108. tab. 34. fig. 7.



## V O O R R E E D E . xxvii

het gehoortuig der Vogelen, zelfs van de tweeslagtige, dat der Visschen, door den geleerden CAMPER betoogt en afgebeeld; de reuktuigen naakt in de viervoetigen, gedekt in den Olyphant, zoo aanmerkelyk in de dikkop Vledermuis, (II) in het *Ethiopisch* Varken, dubbeld in veele visschen. De tong der viervoetigen, zoo verschillende naar hunne verschillende levens wyze, dubbeld in veele twee slagtigen en vogelen, als een geboogen of gekrulde snuit in de Insecten.

SLAAN wy de voortteeling der Dieren gade dan vinden wy dat het innerlyk gestel verschild. De eenvoudigste

(II) DIRRK. MENGELW. I. D. II. Stuk tab. III. en IV.

digfte voortteeling is die van het *Klootdiertje* en van den *Proteus*, welke laatste als uit elkander vallende, uit yder deel een jong geeft (12).

**HIER** na volgen de Plantdieren welke door takfschieting en eyeren voortteelen. De derde rang, is zulke die zonder blykbaare vermenging eyeren leggen, gelyk de zeekwallen, en alle de zagtschalige.

**DE** vierde rang bestaat uit zulke welke mannelyke en vrouwlyke teeldeelen in het zelve ligchaam hebben, gelyk de Schelpviiffchen, de *Aplysia* of zeehaas.

**IN** den vyfden rang komen zulke, welke de Mannelyke en Vrouwelyke teel-

(12) ROES. *Insect. tel.* tom. II. tab. 101.

teeldeelen byzonder hebben, en voorts aan elkander gelyk zyn. In andere verfchild het mannetje van het wyfje op eene aanmerkelyke wyze, gelyk in de glimwormen, *Cochenilles* beesjes, het winteruiltje, enz.

**HIER** uit blykt teffens, hoe groot het verfchil in het innerlyk geftel der voortteeling zyn moet, welk ftuk ik elders in het breede zal aantoonen.

**EVEN** zoo veel verfchil vind men in de groeiing der Dieren, welke altoos in de viervoetigen evenredig is aan hunne voorteelingskragt en grootte, gelyk de Heer **BUFFON** beweezen heeft. Zommige groeijen tot een verbaazende, grootte gelyk de Olyphant en *Rhinoceros*, de andere ontslippen de beste  
ver-

ver grootglaazen, enz. 27000000 kleiner dan eene zandkorrel, en in evenredigheid tot een bije, als eene bije tot eene Paard, volgens het gevoelen van *Leenwenboek*, en de *Malezieux*. In alle landen vind men zulk een verschil van grootte, welke trapsgewyze afneemt van den Olyphant tot het *Siberische* muisje. Men stelt dat een Olyphant vyftig maal zwaarder is dan een mensch (13), en het *Siberische* muisje weegt  $1\frac{1}{2}$  drachma (14), en van de Struisvogel die 80 pont weegt (15) tot het vlieg-vogeltje, dat 40 greinen zwaar is, (16) als

(13) BUFF. *Hist. Nat.* de l'Elephant.

(14) PALLAS *Reisen durch verschiedene Provinz. des Russischen Reichs* I. pag. 454.

(15) BUFF. *Hist. desoiseaux.* tom. II. p. 13. edit. Magna.

(16) SLOANE *Voyages.*

als ook in de tweeflagtige in verfchillende zoorten, welk een onderscheid tuffchen den grooten afgod der *Fida* negers *Jacapara* slang, &c. en tuffchen, het kleine eijereetertje *Ovivorus*, dat nauwlyks een fpan lang is. Het zelve onderscheid ziet men in de viſſchen, van den Walviſch tot den kleinen kringbuik; in de Inſecten ziet men zulks byna in yder geſlacht, en in de ſchulpen byna in yder zoort.

Dus het dierlyk leven, de voorteling en groeij der Dieren beſchouwende, ziet men uit deze lugtige ſchets hoe uitgebreid het verheven deel der Dierkunde is. Ik zoude dit breeder verhandeld hebben, waare het niet, dat dit te breedvoerig voor deze inleyding zyn zoude, en ik voorneemens  
was,

was, dit gewigtig stuk, in byzondere verhandelingen, de Hollandfche Maatfchappy van tyd tot tyd aantebieden.

**LAATEN** wy nu het groeibaar Ryk nagaan, door de Plantdieren zoo naauw aan het Dierenryk verbonden, welke derhalven zulk een duidelyk bewys geeven van dien grooten fchakel der Natuur. De *Planten* derhalven zyn wezens welke een groeiend leven hebben, nooit van plaats veranderen, en hun voedsel door den wortel opflorpen.

**HIER** voor zagen wy hun vaatagtig zamenftel en eenvoudige groeiing. Wat aangaat hunne voortteeling, de nieuwe ontdekkingen hebben hun mannelyke en vrouwelyke deelen toe-  
ge-

gekend, welke of in dezelve plant plaats hebben, en alleen in getal verschillen, of welke in byzondere bloemen van dezelve plant of in verschillende geplaatst zyn, of eindelyk welke alleen voor een gewapend oog zichtbaar zyn. De stampertjes, ontfangen de zaadstof der helmtjes, die door die buis als door de scheeden in den grond der bloem (*receptaculum*), valt, daar gekoesterd word, zwelt, en een of meer vrugtjes maakt, na de verscheiden aart en zoorten der Planten, die eindelyk tot rypheid gekoomen, het zaad in zich bevatten, en de hoop van het volgende geslacht voortbrengen. Dit is egter de eenige weg niet waar door de Planten vermenigvuldigen, de botten, stekken, en in-

## XXIV V O O R R E E D E.

eningen vermeerderen dezelve insgelyks.

DEZE groeibaare wezens, schoon van zenuwstel ontbloot, en dus geene zintuigen hebbende, toonen niet te min een werktuigelyk vermogen, dat door ligchaamen buiten hun in beweging gebragt word. De *Oxalis sensitiva* *Mimosa pudica* die zich op het aanraken van haare blaaderen sluit, en haar takken buigt. De *Dionea* die de gekorvenen welke op het zap van haare kliertjes aast insluit en dood; de *Euphorbia*, de *Lathyrus*, het *Cunil*, de *Curaçaosche Asclepias*, de *Americaansche Nagtschade* laten in den Herfst zoo hunne bladeren om de steel vallen, dat zy dezelve geheel be-



bedekken, en wel zoo, dat het buitenste van het blad tegen den steng aanlegt. En om hier een aanmerkelijk voorbeeld van by te brengen; de Heer LINNÆUS den *Lotus ornithopodioides* van den Heer SAUVAGES ontvangende, zag dat dezelve twee bloemen had, en was voornemens om dezelve aan den Tuinier wel aan te beveelen, edoch door andere bezigheden afgetrokken, riep hy den Tuinier des avonds, doch men vond geen bloemen, des anderendaags vertoonde zich dezelve weder; doch waaren des avonds niet te vinden. De derde dag zich weder vertoonende en des avonds als verdwynende, vond men eindelyk na langzoekens, dezelve onder drie bladen als onder een dak verschoolen.

## XXXVI V O O R R E E D E.

DUS slaat de *Atriplex*, de *Asclepias* de *Alfine* de bladen naar boven, en dekt dus de bloem.

DE *Seda abutilon* slaat zyne twee bladen naar boven, zoo dat de bovenste zyde loodlynig na buiten staat, en het onderste voegt 'er zich tegen aan, zoo dat de bloem der nachts tuschen twee bladen inlegt.

DE *Peruviaansche Maluwe*, slaat des nachts den halm naar beneden, en het blad naar boven, dat den halm als met de hand omvat. De *Iva* slaat des nachts alle haare bladen naar boven, die de bloem dus als omtuynen. De *Datura* draayt haare bloem schroefsge wyze in elkander en slaat 'er de blaeden om.

DE

## VOORREDE. XXXVII

DE *Hibiscus Sabdariffa* laat haare bladen loodlynig vallen rontfom de fteng, (17). Dit is het geen de flaaap der platen genoemd wort.

EN gelyk men in het Dierenryk veel al gewaer word dat de fchoonfte verwen van de huid dikwerf een wreed-aardig en roofzugtig gemoed verbergen, ziet men in de planten insgelyks, dat hunne verw hunne eigenschap te kennen geeft. Dus zyn de geele bloemen meest al bitter gelyk de *Gentiana*, de *Aloe*, het *Chelidonium*, de *Curcuma*. De roode zyn zuuragtig, gelyk de *berberis*, de *doornbes*, de *moerbes*, de *aalbes* de *aardbey*, de *zuure appel*, de *morel*, de *rooze knoppen*, de *opuntia*

(17) Zie *Amoenit. Acad.* tom. I.

## XXXVIII. VOORREDE.

*ria.* De groene vertoond onrype vruchten.

DE bleeke verw geeft geen smaak, gelyk in de *Latuw*, *Chicorey*, *asperges*, &c.

DE blaauwe verw is veelyds hartsterkende planten eigen, als in de *Borage*, het *Echium*, de *Malva*, &c.

DE witte verw geeft eene zoete smaak, gelykin de *witte aalbessen*, *witte pruimen*, &c.

HET zwart toont meest, vergift gelyk in de *bessen* van de *Atropa Atropa*, het *Solanum*, *Empetrum*, *Padus* &c.

DE-

DEZE kragten worden ook door de reuk gekend.

ZULKE die eene *Amber* of *Muscus* of *Zibeth* reuk hebben, hebben ook een hartsterkende, maag versterkende en opstygingen dempende kragt, gelyk de *Asperula*, het *Abel mosch*, het *Geranium moschatum*, het *Milium*, de *Aera*, de *Malva moschata*.

DIE een aangenaame reuk hebben, gelyk de *Crocus*, de *Chaeranthus*, de *Jasmin*, de *Violier*, de *Polianthes*, de *Oranje bloesem*, zyn versterkende. De *Aromatike* Planten koomen in reuk en smaak overeen, gelyk de *Kaneel*, de *Laurier*, de *Sassafras*, de *Campher*, de *Foelie* &c.

## XL. V O O R R E E D E.

DE stinkende hebben of een lookreuk gelyk *Look*, *Ajuin*, *Prey*, de *Alharia*, het *Scordium*, de *Petiveria*, de *Asfa foetida*; of eene bokken reuk, gelyk de *Orchis*, de *Vulvaria*, het *Hieracium foetidum*.

NOCH stinkender reuk en teffens na-deeliger kragten hebben de *Sachys foetida*, de *Cotula foetida*, de *Tagetes*, het *Opium*, de *Cannabis*, de *Ebulus*, de *Anagyris*.

DE walgende Planten gelyk de *Hel-leborus*, het *Veratrum*, de *Tabak*, de *Convallaria*, het *Asarum*, de *Coloquint*, hebben een walgende reuk.

ALLE de grasplanten (*gramina*) strekken ter spyze voor Dieren en  
men-

## V O O R R E E D E. xli

menſchen, gelyk de *Ryſt*, de *Rogge*, de *Haver*, de *Gerſt*, de *Wyth*, de *Mays* &c.

ALLE de planten aan welke bladeren ſtersgewyze (*Stellata*) ſtaan zyn piſdryvende, gelyk de *Meekrap*, de *Asperula*, de *Asperine*, het *Galium*. De ruigbladige (*Asperifolia*) zyn flymerig en lymagtig, gelyk de *Anchufa*, *Borrago*, de wortel van de *Consolida major* &c.

HET *Solanum*, de *Hyoscyamus*, de *Tabak*, de *Atropa*, de *Mandragora*, het *Capsicum* en alle die dezelve in verw gelyken en in gedaante, zyn ſcherpe, of verdoovende, en dolmaakende planten.

## XLII V O O R R E E D E .

DE kransbloemen (*Umbellatae*) zyn op het Land groeiende heilzaamé *Aromatike*, verwarmende, afdryvende Planten, maar de water kransbloemen hebben vergiftige wortels en zaaden.

DIE zes helmstyltjes hebben en een wortel zonder reuk, zyn eetbaar; maar indien de wortel een vergiftige reuk heeft, gelyk de *Gloriosa*, de *Scilla*, *Hyacinth*, *Anthericum*, *Leucojum*, *Narcissus*, *Kroonimperiaal* zyn vergift.

ALLE de tweehoornige (*Bicornes*) zyn zamen trekkende, en de *besfen* zyn zuur, gelyk de *Erica*, *Pyrola Vaccini-um*, *Uva Ursi*, *Guajacana*, &c.

DIE meer dan twintig helmstyltjes heb-



## V O O R R E E D E. XLIII

ben zyn vergiftig of fchadelyk, gelyk het *Aconitum*, de *Anthora*, de *Aquilegia*, de *Staphisagria*, *Delphinium*, *Elleborus*, *Clematis*, *Pulsatilla*, *Paeonia*, *Actæa*, *Melidonium*, *Euphorbia*, *Cambogia*, *Peganum*.

DE *Wervelbloemen* (*Verticillatæ*) hebben eene aangenaame verfterkende reuk, zyn goed voor de zenuwen, ontbinden verftoppingen, &c. gelyk het *Marum*, de *Dictamnus Satureja*, *Thym orego*, *Majorana*, *Kunil*, *Pulegium*, *Mentha*, *Melissa*, *Lavendel*, *Salie*, *Rosmaryn*, &c.

DE Peuldragende (*Siliquosæ*) zyn waterachtig fcherp, afveegende, pisdryvende.

DE

## XLIV V O O R R E E D E.

DE Pylaartjes dragende (*Columnifera*) zyn flymagtig, smeerende, verftompemde, en rypmaakende, dus heilzaam in borftziektens, koudepis, fteen, colyk, &c.

DE *Vlinderbloemen*, (*Papilionaceæ*) gelyk de boonen, erwten, lenzen, cicers, zyn meelagtig en opblaazende.

DE zamengeftelde bloemen (*Compositi flores*,) zyn meest bitter.

DE *Orchideæ*, of die welker wortel een balzak afbeeld, en eene bokken reuk hebben, zyn zaad verwekkende, gelyk de *Orchis*, het *Satyrion*, de *Vulvaria*, en voor al de *Vanille*.

DE *Conifera*, of welker vrugt een  
ke-

kegel gelykt, geeven een harft, en zyn pisdryvende, gelyk de *Sabina*, *Olibanum*, *Pynboom*, *Denneboom*, *Cypres*.

DE Planten, welke een byhangzel hebben, dat van de bloembladen onderscheiden is, zyn gemeenlyk vergiftig, gelyk het *Aconitum*, de *Helleborus*, de *Aquilegia*, *Nigella*, *Parnassia*, *Epimedium*, *Clusia*, *Kiggelaria*, *Stapelia*, *Nerium*, *Zygophyllum*, gelyk ook alle planten, welke gekwetst zynde een melkagtig wit of geel vocht geeven, gelyk de *Rauwolfia*, de *Thevetia*, *Cerbera*, *Plumieria*, *Taberna Montana*, *Ceropegia*, &c.

ALLE deze verwonderenswaardige eigenschappen der Planten, leiden ons derhalven op tot het scheikundig  
on-

onderzoek van derzelver vloeibaare deelen. Hier opent zich voor het oog van een wysgeerig natuur onderzoeker een uitgebreid veld van beschouwing. In de verschillende vlugge geeften, olien, zouten, wateren, aftrekzelen en overblyfzelen der Planten.

DIT talryk heir uit byna 1300. geslagten zamengefteld, gaat door de Steenplanten of Coraalen tot het Delfbaar Ryk over.

DE *Coraalen* immers groeijen als planten, doch misfen alle, behalven de *Corallina opuntia*, dat vaatagtig zamensfel der Planten. Ik heb ten dezen einde, de *Corallina officinalis*, *terrestris*, *rubens*, *rigens*, en *opuntia* onderzocht, en heb in de laatste alleen een vezel

ag-

## V O O R R E E D E. XLVII

agtig zamenftel, dat met een kalkkorft overdekt was, gezien. Of de Turksche Veder van ELLIS (*corall. tab. 33. fig. c.* en de *Corallina Tubulosa* van PALLAS (*Elench. Zoophyt. pag. 430. n. 12.* SLOANE *Voyag. I. tab. 20. fig. 10*) tot de *Coraalen* behooren twyffel ik zeer, en deze hebben een vaatagtig zamenftel, doch geen fteenagtige korft.

DE *Delfftoffen* zyn levenlooze onbewerktuigde lichaamen, die de vaste deelen van onzen aardbol uitmaaken.

HET eerste dat ons hier voorkomt, is *Aarde*, uit welke de mergel, de kley, het kryt, de oker, gebooren worden, hier van daan de tayheid en fmerigheid verharig en 't beftand zyn tegen het vuur.

HET

HET *Zand*, zoo verschillende in soort als de *Aarde*, is het eerste beginzel der steenen. De *Kalk*, volgens het nieuwste gevoelen, een dierlyke aarde, komt door alle haare eigenschappen noch nader aan de bende der steenen, want zy bruifcht op met zuure schei-vochten, en word marmer, gyps, kryt, keyspath, na de verscheiden omstandigheden, waar in het zich bevind.

DE steenen groeijen dus uit aarde, kunnen ontbonden worden, en weder groeijen, dus word kley talk, die weder in steenmergel verandert, en als asbest weder te voorschyn komt. Het zand word tot dryffsteen, die weder tot grover zand overgaat, en in grove steen (*Saxum*) herboren word. De *Aarde* word *Schist*, en die ontbonden

den

en die ontbindt zich in oker, waar uit de tuffteen ontstaat.

DE kalk wordt tot marmer, dat in kryt ontbonden word, en dit kryt word weder tot gypssteen.

DE gesteentens, die doorzigtig zyn, worden uit eenen vloeibaaren oorsprong, en die ondoorzigtig zyn uit eene vast beginzel gebooren.

DE *Mica* is dus een zamengroeiing van kley of mergel, en dus ondoorzigtig, buigbaar, glanzig en bestand tegens het vuur.

DE *Quartz* is eene Crystalwording van water, en dus, doorschynende

*I. Deel. I. Stuk.*

\*\*\*\*

hard

## L V O O R R E E D E.

hard, en met vitriool dikwerf door-  
drongen.

DE *Spath* is eene Cryftalwording van kalkagtig water, en dus broos, ten zy het met yzer gemengd zy. De Cryftallen komen uit zout, bevatten zout, of 'er word zout uit gebooren. Van de eerfte zoort, zyn de edelgefteentens, de tweede de zwavelkies *Pyrites*, de derde zyn de metaal Cryftallen, gelyk die van yzer, koper, tin, &c.

ZOUTE, zwavelige, of *bitumene* deelen, en metaaldeelen zamen gevoegt, maaken zouten, zwavel, Jodenlymen, *Ertzen* en metaalen, het zy door doorzypeling, of door bezwan-  
ge-



## V O O R R E E D E. LI

gering, doch altoos door drukking der Lucht en aantrekking der gelykende deelen, zulke die alleen uit zouten bestaan kunnen in water ontbonden worden, gelyk het *Natrum*, de *Selenites*, het *Zeezout*, de *Salpeter*, de *Aluin*, de *Vitriool*. Die uit zout en zwavel bestaan, kunnen door vuur ontbonden worden, en hun rook geeft een reuk als de Barnsteen, de Amber, de *Pyrites*, het *Arsenicum*. De Mineraalen uit zout, zwavel en kwik bestaande geeven in het vuur een ondoorzigtige blinkende gecoleurde *Regulus*, gelyk het *Antimonium*, de *Zinc*, de *Bismuth*, Yzer, Tin, Koper, Goud.

ALLE de Delfstoffen kunnen ontbonden worden, door bekwaame scheivochten. Het kryt, keyen &c.

## LII V O O R R E E D E.

worden door zuuren ontbonden en met opbruifching. De Zwavels door vuur, de zouten door water, de metaalen en ertzen door fcheyvogten en vuur. Deze ontbindingen, de gronden van de Scheykunde, Bergwerk-kunde, en Metaalscheidingen, brengen de Delfftoffen tot geheel andere gedaantens, welke egter in veele Metaalen tot haaren eerften oorsprong, in voorige gedaantens konnen herfchappen worden. Dus, om hier een voorbeeld van by te brengen, Ge-granuleerd Zilver in fterkwater ontbonden fchynt geheel verdweenen, en even als zout in water gefmolten, een koperen ftaaf in dit met zilver bezwangerd Schey-vocht geplaatst, doet het zilver als een poeder op de grond vallen, dit poeder gedroogd, en in  
een

## V O O R R E E D E. LIII

een ander glas geworpen, en met kookend water overgooten, word melkwit, en Maanmelk (*Lac Lunæ*) genaamd, door zyne zwaarte zakt het poeder, nu wit geworden, naar beneden, en word *Magisterium Lunæ* genoemd: dit *Magisterium* word gedroogd, en in sterk water, of geest van zout geworpen, en eenigen tyd zagties op warm zand gewarmd, en daar na met schoon water gekookt, tot dat het zynen smaak verlooren hebbe, hier uit word de *Luna Cornea* of het Hoorn-Zilver gebooren, dit geeft weder door bereiding de *Lapis Infernalis*, en deze op het vuur gelegd, geeft het zilver weder zuiver, op dergelyke wyzen worden de overige metaalen in verscheiden vaste en vloeibaare ge-

\*\*\*\*

3

daan-

## XLIV V O O R R E E D E.

daantens verandert, en weder tot hunne voorige gedaante gebragt.

WANNEER men dus de *Ontleedkunde* en *Scheikunde* in de naspooring der geschaapen wezens te hulp neemt, ontdekt men een noch uitgebreider veld, en uit dit verheven gedeelte der *Natuurlyke Historie* ziet men, dat een enkel voorwerp zelv, een onderzoeker zyn geheel leven door kan bezighouden; en deze beschouwing der *Natuur* leid ons op tot den *Grooten Schepper*; hoe meer, hoe nader wy deszelvs werken inzien, hoe meer wy overtuigd worden moeten van het bestaan van een *Wys, Almagtig, en goed Opperwezen*, dat onze verwondering, onzen eerbied, aanbidding en dank-

## V O O R R E E D E.    Lv

dankbaarheid vordert, het geen wy weeten, en het geen wy niet weeten, maar ten deele giffen, het geen de ondervinding, ondersteund door alle de pogingen van ons vernuft, ons leert, geeft ons het verhevenste en heerlykste denkbeeld van een Almagtig en en Alwys Schepper. Nooit waaren *Newton*, *Cassini*, *Reaumur*, of *Linnaeus*, *Godlochenaars*, *Mirabeau*, *la Mettrie*, en *Bolainvilliers*, zagen dezelve slechts oppervlakkig, en kenden geen God.

EDOCH om tot deze kennis van het verhevene deel der Natuurlyke Historie te koomen, is het voor afnodig, dat men de voorwerpen kenne in hunne uiterlyke gedaante, en in hun verband met elkander, waar door men

\*\*\*\*

dezelve leert onderscheiden. Dit is de grond der zamenstellen. Wel is waar, dat 'er onder alle de geschapen wezens eene zekere order en zamenhang plaats hebben, waar doorzy alle elkander geregeld volgen; indien wy dezen schakel volkomen hadden, dan waaren de zamenstellen onnodig; maar dewyl wy alle de voorwerpen by lange na niet kennen, en van de huishouding, levenswyze, en inwendig zamenstel van die geene die ons bekend zyn weinig weeten, konnen wy dezen keten niet ten einde brengen. Hierom hebben de wysgierige Natuuronderzoekeren ons maar stukken kunnen geeven van de order der Natuur, en de geheele Natuur uit een ander oogpunt beschouwd, door voornamentlyk uit de overeenkomst der

## V O O R R E E D E. LVII

der deelen, of hun verschilrang schikkingen op te maaken, welke zy weder in Benden, de Benden in Orders, de Orders, in Geslagten, de Geslagten in Soorten, de Soorten in Bysoorten of Verscheidenheid van soorten verdeelen.

LAATEN wy nu deze rangschikkingen, zoo van de Natuurlyke order als van de zamenstellen beschouwen.

ALLE de voorwerpen der Natuur worden in drie ryken verdeeld; het ryk der Dieren, der Planten, en der Delfstoffen. Wy zagen hier voor, dat de Dieren door de Plantdieren aan 't groeijbaare ryk verbonden zyn, en dat de Coraalgewassen de planten aan

\*\*\*\*

## LVIII V O O R R E E D E.

de Delfstoffen verbinden. Dit leert de Natuur, dit is door de grootſte Natuurkenners van deze Eeuw geſtaafd.

DE *Viervoetige Dieren*, die de eerſte Bende uitmaaken, hegten zich door den *Struisvogel* aan de *Vogelen*, terwyl de *Vliegende draak* de *Vogelen* aan de tweeflagtigen verbind, die door de *Viſch Haagdiſch* aan de *Viſſchen* verbonden worden. De Viſſchen gaan door het *Draakje* over tot de gevleugelde gekorvenen, deze hegten zich door den *Scorpioen* aan de *Hardſchaligen*, welke door de *Zandkokers* aan de Plantdieren verbonden worden. De Plantdieren hegten het Dierenryk aan het groeibaare door hunne *Polypi*, welke als levende en zich bewegen-



gende bloemen van het Plantaardig gewas kunnen aangemerkt worden (17).

DE Heeren van ROYEN (18), LINNÆUS (19), en CRANTZ (20), hebben getragt de order der Natuur in de schikking der Planten te volgen. De Heer van ROYEN verdeelt dezelve in *Palmen, Lelien, Grasplanten, Kransbloemen, Zaamengestelde Bloemen, Driezadige, Onvolmaakte planten, Planten die haar vrugt uit de bloem geeven, Planten,*

(17) Zie *Lyst der Plantd.* inleiding, en mynen *Brief over de Bedenkingen der Dierlykheid der Co-raalgew.*

(18) In zyne *Prodromus Flor. Leyd.*

(19) LINNÆUS *Philos. Bot.* §. 77. *Gener.* ed. VI. pag. .

(20) H. I. N. CRANTZ *Instit. rei Herb.*

## LX V O O R R E E D E.

*ten, welker kelk een vrugt wordt, Gaapende bloemen, Hauwtjes draageude, Pyl-aartjes draagende, Peuldraagende, die zoo veel helmstyltjes als bloembladen hebben, die tweemaal zoo veel helmstyltjes als bloembladen hebben, die 'er meer hebben, die 'er geen hebben.*

DE Heer LINNÆUS telt 58. Natuurlyke Orders. 1. Palmboomen. 2. Planten die eene bytende scherpe smaak hebben. 3. Die dunne styve stengen hebben. 4. Grasplanten. 5. Met drie bloembladen. 6. Met zwaardgewyze bladeren. 7. Die na het Stengelkruid gelyken. 8. Die een aangenaame reuk hebben. 9. Die eene bloemkoker hebben. 10. Kroonplanten. 11. Rankdragende. 12. Moeskruiden. 13. Sappige Planten. 14. Wier zaadhuisjes langgebekt zyn. 15. Wa-  
ter-

V O O R R E E D E. LXI

terplanten. 16. *Wier kelk een vrucht word.* 17. *Wier Bloem een vrucht word.* 18. *Welker helmtjes als hoorntjes gespleeten zyn.* 19. *Hesperische.* 20. *Raderbloemen.* 21. *Vroeg bloeiende.* 22. *Die naar Angelieren gelyken.* 23. *Die drie Zaadplekjes hebben.* 24. *Welke een byhangzel agter de bloembladen hebben?* 25. *Welke Zaadbuisjes doppen zyn.* 26. *Die veel peultjes dragen.* 27. *Heulplanten.* 28. *Schadelyke planten.* 29. *Klokjesbloemen.* 30. *Gedraaide planten.* 31. *Fyn gedoornde.* 32. *Vlinderbloemen.* 33. *Die groote Peulen met een of meer bokjes hebben.* 34. *Kauwoerde planten.* 35. *Doornige planten.* 36. *Appelplanten, die kernen van binnen hebben.* 37. *Pylaartjes draagende planten.* 38. *Driezadige.* 39. *Hauwdragende.* 40. *Gapende of getronyde planten.* 41. *Wier bla-*

## LXII V O O R R E E D E.

*bladen ſcherp zyn. 42. Wervelbloemen.*  
43. *Struiken. 44. Hegplanten. 45. Krans-*  
*bloemen. 46. Veil of Klimopplanten.*  
47. *Met gesternde of Stersgewyzebladen.*  
48. *By elkander ſtaandebloemen. 49. Za-*  
*mengesteldebloemen. 50. Katjes. 51. Ke-*  
*gelvrugten. 52. Vereenigde. 53. Ruu-*  
*we planten. 54. Gemengde. 55. Vaar-*  
*ren. 56. Mosfen. 57. Wier. 58. Cam-*  
*pernoeljes.*

DE Heer CRANTZ in zyne *Institu-*  
*tiones rei herbariæ juxta nutum naturæ*  
*digestæ* te Weenen 1766. in II. Dee-  
len in 8vo uitgegeven, ſtelt de na-  
volgende natuurlyke Orders. 1. *Ver-*  
*borgenbloemen. 2. Onvolmaakte. 3. Za-*  
*mengestelde. 4. Grasplanten. 5. Palm-*  
*boomen. 6. Lelyplanten. 7. Gaapen-*  
*de. 8. Vlinderbloemen. 9. Kruis-*  
*bloe-*

bloemen. 10. *Kransbloemen.* 11. *Py-  
laartjesdragendebloemen.* 12. *Uit de  
Kelk vrugtdragendebloemen.* 13. *Wel-  
ker bloemen vrucht draagen.* 14. *Die wei-  
nig helmstyltjes hebben.* 15. *Die veel  
helmstyltjes hebben.*

DE HEER GUETTARD in zyne *Ob-  
servations sur les plantes*, 8vo Paris 1747.  
heeft eenige Natuurlyke orders uitge-  
dacht van welke verscheiden met boven-  
gemelde overeenkomen, hy leid dezelve  
af van zekere hairtjes en draadjes,  
die men op de agterzyde van het bladt  
vindt. Zie hier zyne rangschikkingen.  
1. *Kampernoeljes.* 2. *Wier.* 3. *Vaa-  
ren.* 4. *Mosfen.* 5. *Waterplanten zon-  
der draadjes.* 6. *Zulke die het Stengel-  
kruid gelyken.* 7. *Lelieplanten.* 8. *Riet-  
planten.* 9. *Grasplanten.* 10. *Cuscu-  
ta's*

## LXIV V O O R R E E D E.

- ta's. 11. Die kliertjes als gersten koornjes hebben. 12. Kattestaarten. 13. Die puntig uitlopende byhangzelen hebben. 14. Vlinderbloemen. 15. Met rolronde draadjes. 16. Die naar Anemones gelyken. 17. Die naar Rozen gelyken. 18. Appeldragende. 19. die naar zurig gelyken. 20. Met enkele kegelagtige draadjes 21. Met korte draadjes, en verheven kliertjes. 22. Gesternde planten, die naar het kleefkruid gelyken. 23. Kransbloemen. 24. Radbloemen. 25. Sappige planten. 26. Met blaasachtige kliertjes. 27. Die naar de Tipbagelyken. 28. Pylaartjesdragende. 29. Kruisbloemen. 30. Die na de Malva gelyken. 31. Met blaasagtige klierjes, zonder draatjes, en met zwarte tepeltjes. 32. Heyplanten. 33. Getroonide. 34. Kauwoerde planten. 35. Met geknoop-
- te

*te draadjes.* 36. *Planten, die naar Angelieren gelyken.* 37. *Trechtersgewyze planten.* 38. *Planten die naar Distelbloemen gelyken.* 39. *Planten met Fleurons.* 40. *Getongde planten.* 41. *Ge-straalde..*

UIT deze vier Schetzen der Natuurlyke rangen ziet men, dat'er verscheiden zyn, welke algemeen aangenoomen worden, en hunne kentee-kens zigbaar met zich draagen, gelyk de *Katjes*, de *Lelie planten*, de *Peuldraagende*, de *Kruisbloemen*, &c.

IN het ryk der Delfstoffen toonen zich de Natuurlyke rangen noch duidelyker, de *Aardens*, de *Steenen*, de *Zouten*, de *Zwavelstoffen*, de *Ertzen*, de *Versteeningen*, de *zamen-*

\*\*\*\*\*

ge-

# LXVI V O O R R E E D E.

gegroeide steenen toonen hun verband of onderling onderscheid.

INDIEN wy eindelyk onzen Aardbol beschouwen, als een vast ligchaam uit verscheiden deelen zaamen gesteld, zien wy uit de getuigenis der Heilige Schrift (21), en de Schriften der oude (22), en latere Wysgeeren (23), dat de aarde uit water geboren is, en deze herschepping van eene vloeibaare stoffe tot eene vaste gaat noch voort, en zal tot in het einde der Eeuwen duuren.

IK

(21) GEN. I.

(22) THALES ARISTOL. zie *Stanl.* . . .

(23) BUFFON *Hist. Nat.* Tom. I. . .

(24) LINN. *de increm. tellur.* . RASPE *de globo terraque* p. 23.



V O O R R E E D E. LXVII

Ik zal by de Inleiding van het Ryk der Delfstoffen nader onderzoeken, welke de eerste Aarde (*terra primigenia*) zy, en deszelvs veranderingen nagaan. Ik zal hier dierhalven alleen de verscheiden zamenstellen nagaan, in welke het Delfbaare Ryk verdeelt wordt. Zommige onder de Ouden, en Lateren verdeelen dezelve in twee Benden, en gelyk onder de Ouden, ARISTOTELES *Meteorol.* (gestelt zynde, dat dit zyn werk is,) LIBAVIUS *Comment. Metall.* lib. I. EMANUEL MENDEZ DE COSTA *Hist. Nat. of fossils.* Lond. 1757. WALCHIUS *Steinreich* 4to. 1762. LESSER *Litholog.* 1732.

ANDEREN verdeelen dezelve in drie benden, gelyk LACHMUND, *Oryctol.* 1669. LINNÆUS, *Syst. Nat. edit.*

\*\*\*\*

LXVIII V O O R R E E D E.

XII. tom. III. 1768. ARGENSVILLE, *Oryctologie* 1755. Andere met CARDANUS *de Subtilit.* 1664. CAESALPINUS. BECHERUS, *Physic. subterr.* BROWALL, *Catal. rer. cur.* 1698. WALLERIUS, *Mineralogia*, 1747. CRONSTADT, *Versuch einer mineralogie*, 1772. SCOPOLI, *Princip. miner. syst.* 1772. verdeelen dezelve in 4. Benden. Andere in 5. Benden, gelyk AGRICOLA, *de Ortu subterr.* 1657. ENCELIUS, *de Re metallica*, 1551. CALCEOLARIUS, *Mus.* 1622. SCHWENKFELD, *Cat. Plant. & foss. Siles.* 1600. &c. Andere in zes, gelyk IMPERATI, *Hist. Nat.* 1672. BROMEL, *Inleiding*, 1730. HENKEL, *Mineral.* WOLTERS DORF, *Mineral. System.* 1755. JUSTI, *Grundris des Mineral. Reichs.* 1757. VOGEL, *Practisch Mineral. Syst.* 1762. An-  
de

## V O O R R E E D E. LXIX

dere in 7. gelyk de Heer HIERNE, J. SCHEUCHZER, *Metereol. & oryctol. Helv.* WOODWARD, *Fossils of all kinds digest.* 1728. J. F. CARTHEUSER, *Elem. Mineral. System.* BAUMER, *Geschichte des Mineral. reichs* 1763.

DE Heer PATRICK BROWNE, in zyne *Natural Hist. of Jamaica*, verdeelt dezelve in agt Benden.

DE Heer VALMONT DE BOMARE, *Mineralogie*, in tien Benden. By de Inleiding van het Delfbaar Ryk, zullen wy deze verdeelingen nader beschouwen.

HET water door de Lucht met Aarde en Zoutdeelen bezwangert, brengt uit deze twee beginzelen de

\*\*\*\*\*

## LXX V O O R R E E D E.

zenden voort, welke een veelhoekige gedaante hebben, doorschynend zyn, een smaak hebben, en weder in water ontbonden worden. Dus heeft men eerst de *Salpeter*, welke aan het zand den oorsprong geeft, het Zeezand, dat een voornaam beginzel der *Kley* is. Het *Natrum*, dat door stolling de Kalk maakt, en het *Aluyn*, dat de Aarddeelen verbindt. --- Uit deze, op verscheiden wyzen zamengesteld, worden, de steenen gebooren.

DE *Aarddeelen* door crystalschieting, bezinking, zuurwording, en verrotting voortgebracht, geeven met Zee-water kley, met regenwater zand.

DE verrottende gewassen geeven Aarde, en verrottende Dieren kalk.

DE

## V O O R R E E D E. LXXI

DE *Kley* geeft *Kalk*, die weder in *Asbest* ontbonden, en in *Mica* herbooren wordt.

HET Zand eener Aarde die uit regenwater bezonken, en met *Salpeter* bezwangerd is, komt het naafte aan de *Crystallen*, en maakt de slyp- en molenfteenen, en wordt door ontbinding en weder aangroeiing *Quartz*.

DE *Aarde* der Planten vol *Salpeter*-deelen, word door drukking *Schift*, en wanneer 'er *Jodenlym* bykomt, *Steenkool*, de *Schift* word in *Oker* ontbonden, uit welke de *Tuffsteen* herfchapen word.

DE *Kalk* is een dierlyke Aarde die uit een *Loogzout* bestaat, en met

\*\*\*\*\*

## LXXII V O O R R E E D E .

aard- en kleydeelen gemengd *Marmet* maakt; dit door het vuur van zyne verbindende deelen beroofd, wordt het *Kryt*; dit *Kryt* groeit weder zaamen tot een *Key*; deze ontbonden zynde, en gecryftallizeerd, word in *Spath* herfchapen.

WANNEER de Cryftallen met een Metaalvocht verharden, worden zy edelgefteentens van verfchillende verwen.

DE *Aluin*, met metaal-deelen gemengd, geeft *Vitriool*; Zwavel by de *Vitriool* komende word *kies*. Deze in poeder ontbonden word metaaloker.

DE *Metaalen* worden uit *Zout*, *Aar-*  
de

## V O O R R E E D E. LXXIII

de en *Zwavel*, gelyk wy by de Delfstoffen zien zullen, voortgebragt.

ZAND, *Quartz*, *Spath*, Aarde, by elkander komende maaken de gemengde fteenen.

Dus hebben wy kortelyk het zamenftel van Dieren, Planten en Delfstoffen befchouwd. En gelyk de Plant-Dieren, de planten aan het Dierenryk verbinden, zoo worden de Delfstoffen door de Steenplanten aan het groeibaar ryk gehegt, en alle de gefchappen wezens maaken dus een geheel. Maar dewyl wy alle de fchakels noch niet kennen, welke alles onderling zaamen verbinden, is men verpligt eenen anderen weg in te ftaan. De Heeren KLEIN, en BRISSON, maak-

## LXXIV V O O R R E E D E.

ten derhalven uit de voornaamfte deelen der Dieren kanmerken, welke wy ftraks befchouwen zullen.

NIEMAND egter kwam hier verder in dan de groote LINNÆUS, wiens naam in agting zal blyven, zoo lang men de blyken van Wysheid en Almacht in het gefchapene zal zoeken nategaan; en die *hun bestaan niet hebben in de hersenen van dien Profesfor te Upsal, die de geheele Natuur ziet in een klein Steedje van Zweeden*, gelyk zeker Schryver voor een aardigheid opgeeft (25).

DIT

(25) DIT zyn de woorden van een Schryver die zich noemt *Advocaat der Vaderlandsche Kerk*, II. *Stuk* bl. 86. een Werk met een oproerigen geest, in een winderigen styl zamengeftelt, om  
de



# V O O R R E E D E. LXXV

DE Heer KLEIN, *Secretaris te Dantzig*, heeft in de Voorrede van  
zyne

de gemoederen van wederzyden te verbitteren, het *Oodium Theologicum* aan te blaazen, en zig, gelyk *Hierostratus*, te vereeuwigen, door het verbranden van den Tempel. Ondertuffchen gelieve die waanwyze Schryver te weten, voor eerst, dat 'er zulke nagtmenschen zyn als *Lineus* opgeeft, de *Chacralas*, namentlyk of witte Mooren; dat MAUPERTUISEN VOLTAIRE dezelve gezien hebben en, ik 'ereen dergelyke in 1747. in Zeeland zag.

— Het tweede Deel van zyn *Bon Mot*, is even zoo onwaar, want LINNAEUS, heeft de Natuur niet *Upsal* in gezien, maar geheel Europa door; hy heeft dezelve gezien uit de berigten van elf van zyn Leerlingen, uit daagelyksche berigten van alle Geleerden, en heeft nooit zyne stellingen, waare of valsche in de nieuws papieren als egt laten uitventen; maar noch LINNAEUS, noch BURMANNUS, zullen hunne achting verliezen, by zulke die hunne verdiensten kennen en waardeeren, en zich aan geen aardigheden, ten hunnen koste verzonnen, stooren. *Sapientes eruditos autem se maligno dente rodere, equidem,*

*non*

## LXXVI V O O R R E E D E.

zynen *Historie avium prodromus*, welke te *Lubek*, 1759. in 4to het ligt zag, de Viervoetigen in drie rangen verdeelt, namelyk in *Hairige gehoefde*, in *Hairige gevingerde*, en in zulke die de *Huid kaal hebben*, de eerste rang is in vyf gezinnen verdeelt.

I. MET eene enkele hoef aan den poot.

II. Met twee hoeven.

III.

*non invideo, sed miror magis*: zegt LINNAEUS *Syst.* XII. tom. III. in de Voorrede. Omtrent den Heer BURMAN, heeft de *Advocaat* ook verscheidene aardigheden van zyne vinding. Uitmuntende belezendheid, zonder oordeel, door een krakeel zugtigen, en onbezonnen geest aangevoerd, is het beste middel, om Theologifche twisten levendig te houden; en dat doet de *Advocaat* meesterlyk. *Hic niger est, hunc tu Batave cave-  
to.*

## V O O R R E E D E. LXXVII

- III. MET drie hoeven.
- IV. MET vier hoeven.
- V. MET vyf hoeven.

### II. Hairige en gevingerde.

- I. MET twee Vingeren.
- II. MET drie Vingeren.
- III. MET vier Vingeren.
- IV. MET vyf Vingeren.
- V. MET vyf Vingeren, die door een vlies zaamen verbonden zyn.

### III. Kaal van Huid.

- I. Schildraagende.
- II. Geharnafte naakte.
- III. Naakte.

DE

# LXXVIII V O O R R E E D E.

DE Heer BRISSON, voorheen opzigtcr van het Cabinet, den den Heer de REAUMUR, gaf in het jaar 1756. zyn *Regnum Animale* uit, en verdeelt zelve in XVIII. rangen.

I. VIERVOETIGE Dieren zonder tanden.

II. \_\_\_\_\_, die alleen kiestanden hebben.

III. \_\_\_\_\_, die kies en hondstonden hebben.

IV. \_\_\_\_\_, die geen voortanden in

in de boven  
kaak heb-  
ben, en in  
de onder-  
kaak zes.

V. **VIERVOETIGE DIEREN**, die geen  
tanden in  
de boven  
kaak heb-  
ben, en *acht*  
in de onder  
kaak.

VI. \_\_\_\_\_, die in bei-  
de Kaak-  
beenderen  
snytanden  
hebben, en  
geheele  
hoeven.

VII.

VII. VIERVOETIGE DIEREN, die in beide kaakbeenderen snytanden hebben, en gefpleeten hoeven.

VIII. —————, die in de beide kaakbeenderen snytanden hebben, en drie hoeven.

IX. —————, die in beide kaakbeenderen twee snytanden

tanden  
hebben, en  
vier hoe-  
ven, aan de  
voor- en  
drie aan de  
agter-voe-  
ten.

X. VIERVOETIGE DIEREN, die in bei-  
de Kaak-  
beenderen  
tien voor-  
tanden heb-  
ben, en vier  
hoeven aan  
de voor- en  
drie aan de  
agtervoe-  
ten.

*I. Deel. I. Stuk.* \*\*\*\*\*

XI.

LXXXII V O O R R E E D E.

XI. VIERVOETIGE DIEREN, die voortanden hebben aan beide kaakbeenderen en vierhoeven.

XII. \_\_\_\_\_, die twee voortanden hebben, en de voeten met nagels.

XIII. \_\_\_\_\_, die vier voortanden hebben aan yder kaakbeen, en de voeten met nagels.

XIV.



V O O R R E E D E. LXXXIII

XIV. VIERVOETIGE DIEREN, die vier voortanden hebben aan de boven- en zes aan de onderkaak, de voeten genageld.

XV. \_\_\_\_\_, die zes voortanden van boven en vier van onder hebben, de pooten genageld.

XVI. \_\_\_\_\_, die zes

\*\*\*\*\*

2

voor-

# LXXXIV V O O R R E E D E.

voortanden  
aan yder  
kaakbeen  
hebben, en  
de voeten  
genageld.

XVII. \_\_\_\_\_, die zes  
voortanden  
van boven  
en acht van  
onder heb-  
ben, de  
voeten ge-  
nageld.

XVIII. \_\_\_\_\_, die tien  
voortan-  
den van  
boven  
en

en acht  
van on-  
der heb-  
ben, de  
voeten  
gena-  
geld.

DE Heer DE BUFFON in zyne be-  
kende *Histoire Naturelle, Generale en  
particuliere*, maakt eene andere rang-  
schikking: Hy verdeelt de Viervoeti-  
gen, in zulke, die aan de oude  
Waereld behooren, die alleen in  
*America* gevonden worden, en die  
tot beide behooren.

TOT de Oude Waereld behooren.

I. DE *Geboefde*, het *Paard*, de  
*Zebra*, de *Ezel*.

\*\*\*\*\* 3

II.

## LXXXVI V O O R R E E D E.

II. DIE *Gespleeten hoeven en holle Hoornen* hebben, de *Os*, de *Buffel*.

III. HET groote gezin der kleine *gespleeten hoeven met holle hoornen*, de *Schapen*, *Bokken*, en *Hartebokken*, &c.

IV. MET gevulde hoornen, die afvallen; de *Eland*, het *Hart*, de *Rhee*, de *Rheebok*, het *Bengaalsch Hart*.

V. MET halfgekloofde hoeven, het *Varken* met alle zyne soorten.

VI. HET groote gezin der *verscheurende Dieren*, met nagelen, die zy kunnen intrekken. De *Panther*, *Luypaard*.

VII.

## VOORREDE. LXXXVII

VII. VERSCHEURENDE Dieren met vaste nagelen, de *Wolf*, de *Vos*, de *Jakbals*, de *Hond*.

VIII. \_\_\_\_\_ met vaste nagelen, en een zak by den Aars de *Ngama*, *Civetkat*, *Genette*, *Das*.

IX. \_\_\_\_\_ met een verlengd lichaam, vyf nagelen aan yder voet, de duim afgezonderd, het *Fret*, de *Marter*, de *Wezel*.

X. HET groote gezin van genagelde, die twee snytanden aan yder kaak hebben, en geen stekels op het ligchaam, *Haazen*, *Konynen*, *Eekboornen*, *Ratten*, &c.

\*\*\*\*\* 4

XI.

## LXXXVIII V O O R R E E D E.

XI. GENAGELDE met stekels, de *Stekel-*, en *Izervarkens*.

XII. ————— met schubben, de *Schubbaagdijch*.

XIII. —————, die in 't water, en op het Land leven, de *Otter*, de *Bever*, de *Zeebond*, de *Walrus*.

XIV. DE vierhandige *Aapen*, *Baviaanen*, *Meerkatten*, *Spookdieren*.

XV. DE vliegende genagelde, de *Vledermuis*.

BEHALVEN deze stelt de Heer de BUFFON negen geslachten die alleen staan: De *Olyphant*, de *Rhinoceros*,  
het

V O O R R E E D E. LXXXIX

het *Rivierpaard*, de *Kameel*, de *Leeuw*,  
de *Tyger*, de *Beer*, de *Mol*.

TOT de nieuwe Waereld behooren.

I. DE kleine *Aapjes*, *Sapajous*.

II. DE kleine *Aapjes* met grypftaarten, *Sagouins*. Deze behooren tot den veertienden rang.

III. DE *Philander* en *Langschenkel*. Deze behooren tot den negenden rang.

IV. DE *Bergkat*, *Couguar*, *Bizamkat*. Deze behooren tot den Zesden rang.

V. DE *Coati's*, deze behooren tot den Zevenden rang.

\*\*\*\*\* 5

VI.

VI. DE *Wezels*, deze behooren tot den Negende rang.

VII. DE *Agouti*, *Paca*, enz. deze behooren tot den Tienden rang.

VIII. DE *Schildvarkens*. Deze behooren tot den Twaalfden Rang.

IX. DE *Miereeters*, deze behooren tot den Agtsten rang.

X. DE *Luyaards*.

DE groote LINNÆUS gaf in 1767. zyn *Systema Naturæ*, ten twaalfden maale uit, en verdeeld in het zelve de viervoetige in zes Benden.

I. DE *Primates* of Dieren, die vrug  
ten



ten kaauwen, en de borsten aan de borst hebben.

II. DE *Bruta* of Dieren zonder voortanden; en die de spys met het verhemelte drukken.

III. DE Verfcheurende Dieren, *Fera*.

IV. DE Knaagende Dieren, *Glires*.

V. DE Herkaauwende Dieren, *Pecora*, met gespleeten hoeven.

VI. De Gehoefde.

By deze voegt de Heer LINNÆUS, de *Walviffchen*, om dat zy in innerlyk zamenftel, voortteeling en

voe-

## XCII V O O R R E E D E.

voeding der jongen, met de viervoetigen overeenkomen.

DIT zamenstel van den Heer LINNÆUS, byna door het geheele geleerd *Europa* aangenomen, wierd het onderwerp, en als het waare den inslag van een groot werk, dat de Heer HOUTTUYN in het jaar 1757. begon uit te geven; en thans het geheele Dieren Ryk bevat; in 16. Deelen in groot 8vo. Een Werk zekerlyk van eenen grooten arbeid, maar voor eerst, volgt de Heer HOUTTUYN alleen LINNÆUS, zonder 'er veele andere soorten by te voegen; die hy echter in BUFFON, en andere Schryvers hadde kunnen vinden, als ook in de *Amsterdamsche* Cabinetten der Liefhebberen. Daar by liet de uitgestrektheid  
van

van zyn Werk hem niet toe, om overal dat oordeel te gebruiken dat 'er nodig is, in zulke eene onderneeming. Verscheide stukken spreekten elkander vlak tegen. Ik zoude meer aanmerkingen op dit Werk kunnen maaken; maar dewyl zulks zoude schynen voor te koomen uit een geest van wraakzucht, over de onheusche behandeling, my in zyn XIV. Deel. op meer dan eene plaats aangedaan, (in welke ik egter met de Heeren LINNÆUS, PALLAS, VAN PHELSUM, MARTINET, BASTER, in verscheide andere deele), stap ik hier lieft van af.

DOCH het Werk van den Heer HOUTTUYN te lang zynde om agter een geleezen te worden, nam ik voor om enkel de Geslagten, en korte beschry-

## XCIV V O O R R E E D E.

ſchryvingen der zoorten in het ligt te geven, en 'er alle die by te voegen, welke in het zamenſtel van den Heer LINNÆUS niet gevonden worden, ook heb ik 'er alle de bynaamen (*Synonyma*) van alle andere Schryvers afgelaaten. Ik heb geene Schryvers ontrent de viervoetige Dieren aangehaalt, dan de Heeren BUFFON, en EDWARDS, als by welke de beſte afbeeldingen te vinden zyn. Door het beloop van het geheele Werk heb ik zulke den voorrang gegeven, die goede, en gecoleurde afbeeldingen geeven, van welke men de Naamlyſt voor yder Bende vinden zal.

Ik heb de Geſlagtmerken by zommigen vermeerdert.

IN de Behandeling der Vogelen heb ik my aan de Heeren D'AUBENTON, en BUFFON, EDWARDS, CATESBY, VOSMAER, BRISSON, en ALBIN, daar hy goed is, gehouden.

IN de Insecten heb ik REAUMUR, DE GEER, VOET, DRURY, SEPP, SCHAEFFER, ROESEL, en *Juffr.* MERIAN gevolgt.

ALLE de nieuwe soorten heb ik van PALLAS, en BUFFON, en anderen ontleend, of uit de Cabinetten van de Heeren BURMANNUS, Vader en Zoon, van de Heeren VANDER MEULEN, P. CRAMER te Amsterdam, en J. JULIANES, kundig Apotheker, en kenner der Natuurlyke Historie alhier; en voor de Insecten, de schoone ver-

zameling van den Hooggeleerden Heer P. LUCHTMANS Hoogleraar in de *Ontleed en Heelkunde* op dit *Hoogeschool*, en de schoone Verzameling van Plantdieren van den Hooggeleerden Heer J. D. HAHN, *Hoogleeraar in de Natuur-schei- en Kruidkunde* alhier. Aan de geachte vriendschap van deze begunstigers myner oeffeningen is dit Werk zynen oorsprong verschuldigt.

DE by LINNÆUS niet beschreeven soorten heb ik met A. B. &c. onderscheiden. Onder de geslagten heb ik, op het voetspoor van den Heer PALLAS, het schoone geslagt de *Hartebokken* ingevoegt; en gaarne had ik de *Cavia's* van de Muizen afgescheiden, en tot een byzonder geslacht gemaakt,  
door

## V O O R R E E D E.    x c v i i

door PALLAS, volgens de Natuur dezer Dieren aangezet, maar dus voortgaande, zoude ik onder de Vogelen, Tweeflagtige en Viffchen, geheele geflachten hebben moeten fcheuren, en dus zoude het een geheel nieuw Werk geworden zyn, het geen myn oogmerk niet was, als alleen bedoelende een kort begrip van het zamenftel der Natuur van LINNÆUS te geeven.

EGTER heb ik het gewaagd eene nieuwe rangfchikking van *Slangen* en *Haagdifchen* voor te ftellen, om daar door de zoo laftige als onftandvaftige telling der fchubben voor te komen, welke men voor de optelling der zoorten dezer Dieren vinden zal; en welke ik aan het oordeel der kenners onderwerpe; verre van dat ik onverschil-

*I. Deel. I. Stuk.*

\*\*\*\*\*

lig

## XCVIII V O O R R E E D E.

lig zoude zyn, aan het oordeel van kundige vernuften, onderwerp ik gaarne myne werken aan hunne geleerde aanmerkingen; welke ik, met kundigheid en bescheidenheid voorgesteld, in dank zal aanneemen; doch op bitze en fcherpe verwytingen, heb ik reeds getoond niet te zullen antwoorden.

ALLE de nieuwe soorten, welke ik by die van den Heer LINNÆUS gevoegd heb, heb ik met A. B. geteekent. By veele geslachten heb ik breeder kenmerken gevoegd.

OMTRENT de Planten heb ik het zelve in agt genoomen, en alleen by yder soort, een Schryver, en zoo veel my mogelyk was een gecoleurde  
af-



afbeelding aangehaald; en hier ontrent moet ik wederom de gulle vriendschap van de Heeren BURMANNUS, en den Heer HAHN erkennen, als die my niet alleen den vrijen toegang tot de Amsterdamsche en Utrechtsche Kruidtuyn gulhartig verleenen, maar ook met hunne uitgebreide kennissen te hulp koomen.

Ik heb liever verkooren dit Werkje stuksgewyze uittegeeven, wyl ik dus gelegendheid heb, om de my naderhand, noch ter hand koomende zooten, gevoeglyker agter yder Benden te kunnen plaatsē. Ik heb vooral zorg gedraagen, om in de aanhalingen getrouw te zyn en 'er geen aangehaald, die ik niet zelve heb nagezien. En de Dieren welke ik of levend, of

## c V O O R R E E D E.

in de Verzamelingen gezien heb, met een \* geteekend. De aanhalingen van den Heer BUFFON zyn alle volgens den Amsterdamschen Druk door den Heer SCHNEIDER vervaardigt.

INDIEN dit Werk het geluk heeft van de goedkeuring van kundige liefhebbers weg te draagen, tot vermeer- ring van de kennis der Natuurlyke His- torie te dienen, en voor al den groo- ten maker in zyne onnaspeurlyke wys- heid, almacht en goedheid te doen kennen, zal ik dezen arbeid, genoeg- zaam beloond agten.

P. BODDAERT.

UTRECHT  
*den 19. September*  
1772.

ZOO-



Z O O G E N D E

# D I E R E N .

MET VOORTANDEN EN SNY-  
TANDEN, DE VIER BOVEN-  
STE EVENWYDIG, TWEE  
MAMMEN AAN DE BORST.



## I. MENSCH

- (a) MET een breed plat aangezicht, op-  
gewipte platte neus, groote mond,  
verheven kaakbeenderen, dikke lip-  
pen, zwart hair en bruin vel, klein

## I. MENSCH

van postuur; de *Laplanders*, *Muscoviten*, inwoonders van *Nova Zembla*, *Borandianen*, *Samojeden*, *Noordsche Tartaren*, *Groenlanders*, *Esquimaux*.

(b) Groote welgemaakte menschen met blaauwe of bruine oogen, lang, blond of castanje bruin hair dat kruld. De *Finnen*, *Gottben*, *Deenen*, *Zweeden*, *Jutten*, *Russen*; de wilden van *Canada*.

(c) Mensch met een breed gerimpeld voorhoofd, korte neus, plat aangezigt, kleine ingezonken oogen, een lange smalle vooruitstekende kin, zwart hair, de *Asiatische Tartaren* van *Rusland* tot aan *Kamschatka*, langs de *Wolga*, langs de grenzen *China*, *Boutan*, *Ava*, de *Calmukken*, de *Krim*.

(d) Mensch, die wel gemaakt, dik is, met een breed roudaangezicht, kleine oogen, groote wenkbraauwen, eene kleine platte neus, yle baard, bruin van vel. De *Chineezzen*, *Japen-*

I. MENSCH

*ponneezen, Siammers, Peguanen, Aracaners.*

- (e) Mensch die blank en blond is, zwak van gezicht, met een roode oogappel, en die by dag slaapt en 's nagts leeft (\*).
- (f) Mensch die bruin zwart is, met zwart neerhangend hair, groote oogen, en breede wenkbraauwen. *Javaanen, Maleyers, enz.*
- (g) Mensch die taankleurig is, welgemaakt, het hoofd klein, het aangezicht eirond, het voorhoofd plat, roode lippen, zwarte tanden, woond in de *Philippynsche Eilanden.*
- (h) Mensch die zeer groot is, met een dikke neus, groote oogen, lang  
zwart

(\* Dit is een Nacht-mensch van LINNÆUS, welke op het Eiland *Java* woond, en van alle andere bekende Volkeren onderscheiden is, en wiens bestaan door den *Advocaat der Vaderlandsche Kerk* gelochend word. Zie myne Aanmerking in de Voorrede.

## I. MENSCH

zwart hair, een lang aangezicht, een woest gezicht; woond in de *Ladrones*.

- (i) Mensch die geheel zwart is, met een mager onaangenaam gezicht, de Vrouwen hangende borsten; woond in de *Papous Eilanden*.
- (k) Mensch die zwart is, met een rond hoofd, platte neus en gekroeft hair; woond in *Guinea*.
- (l) Mensch die olyfcoleurig is met een kort lyf en lange dyen en beenen. De *Mongollers*.
- (m) Mensch, die zwartachtig is, met groote breede ooren, zwart regt hangend hair, woond in *Ceylon*.
- (n) Mensch, die afch coleurig is, met zwart hair, woond in *Guzuratte, Combaya, Goa*.

De verdere soorten van Menschen als *Persianen*,  
*Ara*

*biers*, *Turken*, *Europeërs*, uit vermenging van verscheiden Volkeren gebooren, kunnen tot geene vaste soorten gebragt worden. Zie over deze alle breeder BUFF. *Hist. Nat. Tom. III. pag. 146*  
— 203.



II. DE AAP (SIMIA.) Vier digt by elkander staande Voortanden.

De Snytanden alleen staande, lang, viernaar agter.

De Kiezen stomp.

De Voeten als Handen, de Nagels rond of krom.

a *Geen Staart. Aapen.*

Bosmensch. (1) AAP zonder Staart roestverwig, met het hair der Armen naar boven gekeerd \* , *Pongo*  
(*Satyrus*) BUFF. *Hist. Nat. tom. XIV. tab. 1.*

β. The man of woods EDW. *Glean. I. p. 6. tab. 215.*

γ. Singe fans queue BUFF. *Hist. Nat. tom. XIV. tab. 2.*

*Sylvanus.* (2) AAP zonder Staart met naakte billen, en een rondagtige kop.  
b Pitheque BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. p. 38.

Woond in Klein Afien, Arabien, Hoog Egypten, en in het geheele Noordelyke deel van Africa.

Langarm (A) AAP, zonder staart met naakte billen, een baard en zeer lange armen. *Gibbon* BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 41. tab. 2. 3.

Woond in Malacca, Madagafcar. de Moluccos.

Spook (3) AAP zonder staart met naakte billen, en langwerpige kop \*.  
(*Inuus*) *Magot.* BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 150. tab. 7. 8.  
b *Eene korte staart.*  
*Baviaanen.*

Verkens (4) AAP, die halfgestaard en grys is, met eene kleine baard, bruine oogkringen, en naakte billen.  
(*Nemestrina*)

The Pigtailed Monkie EDW. *Glean.* tab.



tab. 14. *Maimon. BUFF. Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 84. tab. 19.  
Woond in Sumatra.

Apedia. 5. AAP, die half gestaart is, met den duim digt aan de vingeren, lange nagels, die van den duim rond, en hairige billen. Woond in Indien.

Baviaan. 6 AAP, die half gestaart is met scherpe nagels, en naakte billen\*. *Babouin BUFF. Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 64. tab. 13, 14. Woond aan de Caap.  
c *Met een lange staart.*  
*Meerkatten.*

Maimon. 7. AAP, met een lange staart, een baard, blaauwe gestreepte kaaken\*.  
*Mandrill BUFF. Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 713, tab. 16, 17. Woond aan de Goudkust en verder in Zuid Africa.

Boschduivel. 8. AAP, die grys is met hairigen ooren,

- (*Hamadryas*)      ren, fcherpe nagelen, en billen.  
*Macaque* BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIV. pag. 91. tab. 20.
- Oudmannet. 9. Aap, met een lange ftaart, wit met eenen zwaarten baard \*.  
 (*Veter*)      *Lowando* BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIV. pag. 81.  
 Woond in Ceilon.
- Silenus      10. Aap, die zwart is, met eene lange witte baard \*.  
*Ouanderou* BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIV. pag. 81.  
 Woond in Ceylon.  
 NB. Deze is eene verfcheidenheid der voorige.
- Fanus      11. GESTAARTE gebaarde Aap, met een kwasje aan den ftaart.  
*Malbrouk* BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIV. pag. 108. tab. 29.  
 Woond in Guzarate.
- Belzebul. 18. ————— gebaarde Aap, met eene grypftaart, en bruine voeten \*.

*Ouarine*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIV. p. 156.  
Woond in Brafil.

Patas

(B) GESTAARTE Aap, met eene platte kruin, en een witte band boven de oogen.

*Patas*; BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
p. 100. tab. 25.

β. ——— met een zwarte band boven de Oogen. ID. IBID. tab. 26.

Woond aan de Senegal.

Gryfaard

13. ———, gebaarde Aap, die ros is met een grypstaart.

*Alouatte*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIV. p. 156.

Woond in Brafil en Curaçao.

Slingeraap.  
(*Paniscus*)

14. ——— ongebaarde Aap, die zwart is, met een grypstaart, de handen zonder duimen\*.

*Coaita*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIV. pag. 161. tab. 42.

Slin-

Slingeraap of Boschduivel.  
 Vosm. *Beschryv.*  
 Woond in Zuid America.

*Cynomolgos.* 15. AAP zonder baard, met breede  
 Neusgaten, een kromme  
 staart en naakte billen.  
 Woond in Africa.

Hondenkop 16. AAP met een lange staart, geel-  
 agtig, met een uitsteekende  
 bek, een regte staart, naak-  
 te billen.  
 Woond in Africa.

DIANA 17. GEBAAARDE, gestaarte Aap, met  
 een getopte baard en voor-  
 hoofd.  
*Exquima*, BUFF. *Hist. Nat.*  
 tom. XIV. 161.  
 Woond in Guinea.

Schoonhairi- 11. AAP, met een lange staart, zon-  
 der baard, geelagtig van  
 lyf, met lange witte hai-  
 re aan de kaaken.  
 Aapje van St. Jago EDW.  
*Glean.* 1. tab. 215.

*Callitriche*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIV. p. 133. tab. 37.

Aap van Ma- 19. AAP, met een lange staart en ge-  
dagafcar (Ciphus) baarde kaaken, een geelag-  
tige kruin, zwartepooten  
en de staart aan 't eind roeft  
coleurig.

*Mangabey à collier blanc* BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. XIV. pag.  
119. tab. 32. 33.

Woond in Madagafcar.

Huppelaar 20. AAP, met een lange staart, op-  
(*Tripida*) staand hoofdhaar, blaauwe  
pooten, en eene ruyge  
grypstaart.

Woond in Suriname.

Aigret Aap 21. AAP, met eene lange staart byna  
(*Aigula*) geen baard, een in de  
lengte loopende opstaande  
Hairbosch op het Hoofd.

*Aigrette*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIV. p. 19. tab. 21.

Woond in Oost-Indien.

- Sifac (C) GESTAARTE ongebaarde Aap met  
(*Nimacus*) hairige kaaken, en een witte  
staart.  
LINN. *Mantiff. alt.* p. 521.  
*Douc*, BUFF. *Hift. Nat.*  
Tom. XIV. tab. 41.  
Woond. . . .
- Kroonaapje (D) ——— ongebaarde Aap, met  
(*Senica*) het hair van de kruin  
straalsgewyze plat leggende.  
LINN. *Mantiff. alt.* 521.  
*Bonnet Chinois*. BUFF. *Hift.*  
*Nat.* tom. XIV. pag. tab. 30.  
Woond in de Ooft-Indien,
- Roodbek (E) ——— ongebaarde witagtige  
(*Argentata.*) Aap, met een rood aange-  
zicht, en castanie bruine  
staart.  
*Mico*, BUFF. *Hift. Nat.*  
tom. XIV. tab. 28.
- Saki 22. ——— ongebaarde Aap, die  
(*Pithecia*) zwart is met witte puntjes  
op de haitjes, met eene  
zwarte

zwarte zeer ruige staart \*.

*Saki*, BUFF. *Hist. Nat.* XIV.  
pag. 198. tab. 53.

Woond in America.

Knikkebol 23. GESTAARTE ongebaarde Aap die  
(*Nititans.*) zwart hair heeft met bleeke  
puntjes, een witte neus, een  
zeer korte duim, en hairige  
billen.

Woond in Guinea.

Witneus (F) ——— gebaarde Aap, uit o-  
lyfgroen en zwart gemen-  
geld, met een bruine bek,  
en witte neus.

*Blancnez*, ALLAMAND by  
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV.  
pag. 141. tab. 59.

Woond in Guinea.

Witlip (G) ——— kort gebaarde Aap,  
met hairige ooren, en een  
sneuwitte bovenlip.

*Mouftac*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIV. pag. 139. tab. 39.

Woond in Guinea.

Sagouintje 24. GESTAARTE Aap, met ruige wyd  
(*Facokus.*) openstaande ooren, een zeer  
ruige staart, elsgewyze na-  
gelen, die van den duim  
rond\*.

*Ouistiti*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIV. pag. 202. tab. 55.

*Cogui* EDW. *Glean.* I. tab. 218.

Woond in America.

a *Musius* Aapje, met brui-  
ne banden. BRISS. 202.

*Saimin*, BUFF. *Hist. Nat.*

tom. XIV. pag. 189-  
tab. 51.

Woond in America.

Leuwen 25. ——— gebaarde Aap, met  
aapje afhangend hair, een roode  
(*Oedipus.*) staart, en elsgewyze nagelen\*.

*The little 'Lion, Monkey.*

EDW. *Birds* IV. tab. 195.

*Pinche*, BUFF. *Hist. Nat.*

tom. XIV. pag. 111. tab. 58.

Woond in America.

Ruighals. 26. ——— ongebaarde Aap, met  
(*Rosalia.*) een haarig hoofd, de om-  
trek



trek van het aangezicht donkerrood.

*Marikina*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIV. pag. 209. tab. 57.  
Woond in America.

Geelpoot 27. GESTAARTE ongebaarde Aap, met  
(*Midas.*) de bovenste lip gespleeten, naakte vierkante ooren, en elsgewyze nagelen\*.

*Tamarin*, BUFF. *Hist. Nat.* Tom. XIV. p. 200 tab. 54.  
*The little black Monkie*, EDW. *Glean.* tab. 196.  
Woond in America.

Roloway (H) ——— gebaarde Aap, die zwart is, van onder wit, met twee hairige afhangende vellen aan den hals, als de tippen van een halsdoek\*.

*Palatine*, ALLAMAND by BUFF. *Hist. Nat.* tom. XV. pag. 77. tab. 13.  
Woond in Guinea.

Gekje 28. ——— ongebaarde Aap, met  
(*Fatuellus.*) een grypstaart, twee hair-  
B 2 boschjes,

bofchjes, als hoorntjes op  
het hoofd.

Woond in Brafil.

Deze is eene verfcheidenheid van n. 30.

- Sim 29. GESTAARTE ongebaarde Aap, met  
(*Apella.*) byna een grypftaart, een  
bruin ligchaam, zwarte pooten, en hairige billen.  
*Sajou brun*, BUFF. *Hift. Nat.*  
tom. XIV. p. 173. tab. 45.  
Woond in Fernambuco.
- Capucyn 30. ————— ongebaarde Aap, die  
(*Capucina.*) bruin is met een ruige gryp-  
ftaart, de kruin en leden  
zwart.  
*Sajou*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
XIV. pag. 179. tab. 48. EDW.  
*Glean.* tab. 222. *Fluiter* VOSM.  
*Befchryv.* tab. 7.  
Woond in Brafil.
- Chineefchje 1. ————— gebaarde Aap, uit  
geelgroen, en zwart gemen-  
geld, de kaaken hairig, de  
ooren

ooren en voetzoolen zwart.  
*Talapoin*, BUFF. *Hist. Nat.*  
 Tom. XIV. pag. 143. tab. 60.  
 Woond in America.

Samine

31. GESTAARTE ongebaarde Aap, met  
 een uitsteekend agterhoofd,  
 billen, en vier elsgewyze  
 nagels \*.

*Saimiri*, BUFF. *Hist. Nat.*  
 tom. XIV. p. 188. tab. 51.  
 Woond in Guajana.

III. SPOOKDIER (LEMUR.) IV. *Boven voortanden*,  
 de middelste ver-  
 wydert.

VI. *Onder voortanden*,  
 die lang, plat,  
 evenwydig, en  
 dicht by elkander  
 staan.

DE *bondstanden* dicht  
 by elkander, van  
 de voortanden en  
 kiezen verwydert.

Veel kiezen die  
als gekwabd zyn,  
de voorfte langen  
puntig.  
De kop rond, de  
bek langagtig.

Traagloper 1. SPOOKDIER zonder ftaart \*. SEBA  
van Ceilon. I. tab. 35. fig. 1. 2.  
(*Tardigradus*.) *Loris*, BUFF. tom. XIII. pag.  
111. tab. 31.

Woond in Ceilon.

Mongoz 2. ——— dat grys is met een ko-  
leurige ftaart.

*Mongous*, BUFF. *Hift. Nat.*  
tom. XIII. pag. 92. tab. 27.

a *Mongous*, EDW. *Glean.* I.  
p. 12. tab. 216.

b *Pitv. gazoph.* tab. 17. fig. 5.

c *Brisf. Quadr.* 221.

Maki 3. ——— met eenzwarte ftaart,  
(*Macaco*.) de hals met lange hairen. *The*  
*black Maucanas* EDW. *Glean.*  
fig.

fig. 13. tab. 217. *Vari*, BUFFON, *Hift. Nat.* tom. XIII. tab. 28.

Woond in Ooft-Indien.

Catta  
(Inkboorn-  
aapje.)

4. SPOOKDIER met een staart, die wit en zwart geringd is \*. *Moco-co*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIII. tab. 23.

Woond in Ooft-Indien.

Vliegend

5. ——— met een staart, door een vlies rontfom het lyf, vliegende.

Vliegende Kat van Ternate  
Tab. I. pag. 93. tab. 58.

IV. VLEDERMUIS, Een groot hoofd, wyde bek, de voorvoeten gepalmd, een vlies om het ligchaam.

Vliegende  
hond van

1. VLEDERMUIS zonder staart, met een eenvoudige neus, het

B 4

vlies

- Ternate. vlies tuffchen de dyen ge-  
 (Vampyrus.) fcheiden \*.  
*Roussfette*, BUFF. *Hift. Nat.*  
 tom. X. pag. 25. tab. 14.  
 Woond in de Moluccos.
- Vliegende 2. VLEDERMUIS zonder ftaart, treg-  
 hond van ters gewyze neus, met een  
 Nieuw Span- blaadje \*.  
 je. *Vampyre*, BUFF. *Hift. Nat.*  
 (Spectrum.) tom. X. p. 25.  
 Woond in America.
- Gebilde 3. ———— zonder ftaart, de neus  
 (Perfpicilla-) met een plat fcherp blaadje\*.  
 tus.) EDW. *Birds*. 201.  
 Woond in America.
- Spook 3. ———— zonder ftaart, met  
 (Spasma.) een neus met een hantsge-  
 wys blaadje.
- Piekdrager (A) ———— zonder ftaart, met  
 een klaverblad op de neus\*.  
*Fer de Lance*, BUFF. *Hift.*  
*Nat.*  
 Woond in America.

Vliegende (B) **GESTAARTE** Vledermuis, met han-  
 Dog gende wangen en ooren \*.  
 (*Moloffus.*) { Woond in Indien.

Grootkop (C) ————— Vledermuis, met een  
 (*Cephalotes.*) ronde kop, slangtrekken-  
 de tregtersgewyze neusgaa-  
 ten \*. *Dierk Mengel. I. Deel*  
*2de Stuk.*  
 Woond in de Moluccos.

Kirwonba (D) ———— Vledermuis, met een  
 klein neusje, puntigeooren,  
 en een gestreept vlies \*.  
*PALL. Specil. Zool. fasc. 3. p. 7.*  
 Woond in Ceilon.

Vliegende (E) —----- Vledermuis, met een  
 Spitsmuis lange uitsteekende bek, een  
 blaadje op de neus, en een  
 uithangende tong \*. *Dierkun-*  
*dig Mengelw. I Deel. 1ste stuk.*

Vliegende (F) —----- Vledermuis, met een  
 Marmot verlengd hoofd, een breede  
 dikke bek, en nauwlyks zigt-  
 baare staart.  
 Woond in Indien.

- Vliegende Muis (G) GESTAARTE Vledermuis, met een zeer dikke bek, lange lippen, ronde ooren, die elkan- der van agter raaken.  
 BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. p. 39. tab. 20. *Mulot volant Mem. de l'Acad. des Sciences* 1759.
- Groefneus. (H) GESTAARTE Vledermuis, met een voorhoofd, de neus door een groef gefcheiden. BUFF. *ibid.* fig. 2.
- Het Uiltje (I) VLEDERMUIS die ros is, met zeer breede ooren.  
*Noctule*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII. tab. 18.  
 Woond in Frankryk.
- Avondvlieger (K) VLEDERMUIS met korte ooren, en een zwart vlies. *ibidem.*  
 Woond in Frankryk.
- Diklip. (L) ——— met de boven lip gezwollen, en een ruig voor- hoofd. *Pipistrilla*. BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII. tab. 19.  
 Woond in Frankryk.



Trompet- (M) VLEDERMUIS met opgeblazen  
 ter. . . . . wangen, een korte bek, de  
 oogen na by de ooren. *Bar-*  
*bastella*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
 VIII. tab. 19.  
 Woond in Frankryk.

Hoefzyer (N) VLEDERMUIS, met eene half  
 maansgewyze rand om bek  
 en lippen, en een gekrulde  
 neus. *Fer à cheval*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. VIII. tab. 20.

Geoorde 5. GESTAARTE Vledermuis, met een  
 (*Auritus.*) eenvoudige neus en bek,  
 dubbele ooren, die grooter  
 dan het hoofd zyn \*. BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. VIII. tab. 16.  
 Woond in Europa.

Gemeene 6. ———— Vledermuis, met een  
 (*Murinus.*) eenvoudige neus, en kleine  
 ooren.  
 Woond in Europa.



## II. ZONDER VOORTANDEN.

### V. OLYPHANT, Geen voortanden.

De bovenste snytanden lang,  
krom, en kegelagtig.

Een lange *Snuif*, waar mede hy  
grypt.

[Groote hangende Ooren.

Dikke pooten, het Lyf byna  
naakt.]

I. Olyphant. \* BUFF. *Hift. Nat.* tom. XI. p. 1. tab. 1.

Woond in Asia en Africa.

### 5. ZEEROB (*Trichecus*) Geen voortanden.

De boven hondstanden al-  
leen ftaande.

De kiezen zyn een rimpelig  
been.

De lippen dubbeld.

De pooten als een vin aan  
een gegroeidt.

Walrus I. MET uitsteekende (naar om laag  
(*Rosmarus*.) ftaande) hondstanden \*.

*Mar-*

*Morse*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIII. pag. 169. tab. 55.  
Woond in zee by N. America.

Zeekoe 2. MET ingeflooten hondftanden \*.  
(*Manati.*) *Lamatin*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIII. pag. 169. tab. 58.  
Woond aan den mond der ri-  
vieren in Asia en America.

VI. LUYAARD. Geen voortanden.

(BRADYPUS.) De snytanden ftomp, langer  
dan de kiezen, alleen ftaan-  
de.

V. Kiezen, die ftomp zyn.  
Het ligchaam zeer hairig.

Drievingeri- 1. LUYAARDT, met drie vingeren, en  
ge een korte ftart \*.

(*Tridactylus.*) *Ai*, BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
XIII. pag. 27. tab. 6. 7.  
Woond in Z. America.

Tweevinge- 2. LUYAARDT met twee vingeren, en  
rige geen ftart. *Zinau*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. XIII. p. 27.  
tab. 2.

Woond in Brazil,

ZON-

Vyfvingeri- A. LUYAARDT zonder staart, de pooten  
ge met vingeren.

Bengaalfche *Luyaartzoort*

VOSM. *Befchryv.*

Woond in Bengalen.

VII. MIERENEETER. Geen *tanden*. Eene fpil-  
(MYRMECOPHAGA.) ronde Tong, die hy  
kan uitfteeken, de mond  
tot eene fnuit uitgerek. Het ligchaam zeer hai-  
rig.

Twee vingc- 1. MIERENEETER, met twee vingerige  
rige voorpooten, en vier vinge-  
(*Didactyla*.) rige \* agterpooten. *Fourmil-  
lier*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
X. pag. 67. tab. 30. *The lit-  
tle anteater*, EDW. *Glean.* I.  
pag. 20.  
Woond in America.

Drievingc- 2. MIERENEETER, met drie vingeren  
rige aan de voor, en vyf aan de  
(*Tridactyla*.) agter-vingeren \*.  
Woond in America.

Ruigftaart 3. MIERENEETER, met vier voorvin-  
ge-

(*Fubata.*)

geren, en vyf agter vingeren, en een lang gebaarde staart \*. *Tamanoir*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. pag. 67. tab. 29.  
Woond in America.

Kaalstaart. 4. MIERENEETER, met vier en vyf agter-vingeren, de staart kaal\*.

(*Tetradactyla.*)

*Tamandua*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. pag. 67.

Aardvarken (A) MIERENEETER, met hangende ooren, en eenen dikken snoet \*. PALL. *Miscell. Zool.* pag. 64.

Woond aan de Caap.

VIII. SCHUBHAAGD. Geen tanden.

(*Manis.*)

Een Spilronde tong, die hy kan uitsteeken.

Het ligchaam met schubben dekt.

Vyfvingerige 1. SCHUBHAAGDISCH, met vyf vingeren \*. *Pangolin*, BUFF. *Hist.*

(*Pentadactyla*)

*Nat.* tom. X. tab. 15. p. 89.

Woond in Oost-Indien.

met

Viervinge- 2. SCHUBHAAGDISCH, met vier vingere-  
rige ren, [de pooten van onder  
hairig\*.] *Pbatagin*, BUFF.  
*Nat.* tom. X. pag. 83. tab.  
36.  
Woond in Zuid America.

IX. SCHILDVERK. Veele kiezen, geen voortan-  
den of hondstanden. Het  
lichaam, met een beenig  
schild geharnast, dat met  
tanden onderscheiden is.

Cirquençon 1. SCHILDVARKEN, met een in drie  
(*Unicinctus*.) verdeeldt schild en vyf-  
vingerige voeten. *Cirquen-*  
*çon*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
X. pag. 100.  
Woond in America

Apar 2. SCHILDVARKEN\*, met drie banden,  
(*Tricinctus*.) en vyf vingeren, SEB. *Schatk.*  
I. tab. 38. f. 23. BUFF. *Hift.*  
tom. X. pag. 95.  
Woond in America.

Vierband 3. SCHILDVARKEN, met vier banden.  
[NB.

(*Quadricin-*  
*ctus.*)

[NB. Dit is alleen uit een aan-  
eengelymde schaal, die *Fa-*  
*bius Columna* gezien heeft,  
en daar noch stukken aan  
ontbreeken, opgemaakt, en  
is dus waarfchynlyk niet in  
wezen.]

Encoubert 4. SCHILDVARKEN, met zes banden,  
(*Sexcinctus.*) en vyf vingeren \*.

BUFF. *Hift. Nat.* tom. X. tab. 42.

Woond in America.

Tatuëta 5. —————, met zeven banden,  
(*Septemcin-*  
*ctus.*) en vier vingeren \*.

BUFF. *Hift. Nat.* tom. X.

pag. 97.

Woond in America.

[NB. Deze heeft agt banden.]

Cachicame 6. —————, met negenbanden,  
(*Novemcin-*  
*ctus.*) viervingerige voor - en vyf-  
vingerige agtervoeten. BUFF.

*Hift. Nat.* tom. X. tab. 37.

pag. 98.

Kabaffou (A) —————, met twaalf banden,  
C en

(*Duodecim  
cinctus*)

en vyfvingeren. BUFFON  
*Hist. Nat.* tom. X. tab.  
40. 41,  
Woond in America.



### III. WILDE DIEREN.

*De voortanden kegelagtig. De hondstanden  
lang. De kiezen puntige kegels. De  
Pooten met scherpe kromme nagels.  
(De mond met knevel-hairen.)*

X. DE ZEEHOND.  
(PHOCA.)

Zes boven voortanden, die  
evenwydig staan.

IV. Onder voortanden, die  
evenwydig, en wat stomp  
zyn.

Een Hondstand van boven  
van de voortanden, van  
onder van de kiezen af-  
staande.

Vyf of zes drie hoekige  
kiezen.

[De



[De voorvoeten zonder  
dye of schein.

De agter voeten verbreed,  
en als in eene vin zaa-  
men loopende.

Het Ligchaam lang.]

De Zeehond 1. ZEEHOND met ooren. *Phoque*, BUFF.  
(*Ursina*.) *Hift. Nat.* tom. XIII. tab. 53.  
Woond in de Noordzee.

Zeeleeuw 2. ———, met een van vooren ge-  
(*Leonina*.) kuifde kop. BUFF. *Hift.*  
*Nat.* tom. XIII.  
Woond aan de straat Magel-  
lanes.

Zeekalf 3. ———, met een glad hoofd zon-  
(*Vitulina*.) der ooren.  
Woond in de Europifche Zee.

XI. HOND. De boven voortanden zes, de zyling-  
(CANIS.) fche langer, van elkander afstaande.  
De ander voortanden, zydelingge-  
kwabd.  
De hondftanden krom; en alleen  
ftaande, zes kiezen of zeven.

Huishond. 1. HOND, met een staart linksom gekruld \*.  
(*Familiaris.*)

a Huishond, met opstaande ooren. BUFF. *Hist. Nat.* tom. IV. tab. 28.

b Hond met hangende ooren, een basterd nagel, aan de agterpooten.

*Braque de Bengale*, BUFF. *ibid.* tab. 34.

c Bloedhond met hangende kooenen, en een dik ligchaam. *Dogue de forte race*. BUFF. *ibid.* tab. 45.

d Waterhond, met gekroeft hair als een Schaap.

*Barbet*, BUFF. *ibid.* tab. 37. 38.

e Schoothond, als een Eekhoorn.

*Bichon*, BUFF. *Hist. Nat.* *ibid.* tab. 44.

f. Dashond, met een lang ligchaam, kromme pooten, en hangende ooren. *Basset*, BUFF. *Hist. Nat.* *ibid.* 35.

g Spoorhond, met een geknotte staart, *Chien Courant*, BUFF. *ibid.* tab. 32.

Turk-

h Turfche Hond, naakt zonder hair.

- Wolf  
(*Lupus.*)
2. HOND, met een na de regterzyde gekromde ftaart \*. *Loup*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. 7. tab. I.  
Woond in de Boffchen van Europa.
- a Zwarte Wolf. BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX.  
Woond in Kanada.
- b Wolf van Mexico. BUFF. *Hift. Nat.* tom. XV.  
Woond in Nieuw Spanje.

Hyaena. ———, met een regte ftaart, die geringd is, met opftaande hairen aan den hals, naakte ooren, en vier vingeren aan de voorvoeten \*. BUFF. *Hift. Nat.* tom. IX. tab. 51.  
Woond in Africa.

Vos  
(*Vulpes.*)

4. ———, met een regte ftaart, met een witte punt \*. *Renard*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. VII. tab. 4.

- Veldvos (Alepeex.) 5. HOND, met een regte staart met een zwarte punt.  
NB. Eene verscheidenheid van den Wolf.
- Ifatis 6. —, met een regte staart, de punt van een couleur. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. p. 142.
- Jakhals 7. —, gezegd goud-Wolf. *Chacal*, BUFF. *Hist. Nvt.* tom. XIII. pag. 135.  
b Advie, BUFF. *ibid.*  
Woond in het Oosten.
- Bergkat (Mexicanus.) 8. —, met een kromme gladde staart, een afch graauw ligchaam, met bruine banden, en roffe vlekken.  
*Seba, Schatk.* I. Deel, tab. 42. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XV.  
Woond in Nieuw Spanje.
- Thous 9. —, met een neer geboogen staart, het ligchaam grys, de buik wit.  
Woond in Suriname.

HOND;

Wolf hond 10. HOND, met een roffe staart, aan  
 (Corfac.) het begin en het einde  
 zwart. VOSMAER, *Beschryv.*  
 Woond in Siberien en Indien.

XII. KAT. De voortanden gelyk.  
 (FELIS.) Drie kiezen.  
 De tong scherp.  
 De nagels kunnen zy intrekken.  
 [Het Hoofd rond, het Ligchaam  
 gevlaakt.]

Leeuw. 1. KAT, met een verlengde, aan het  
 (Leo.) eind kwastige staart, het lig-  
 chaam rosbruin \*. *Lion*,  
 BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. p.  
 1. tab. 1. 2.  
 Woond in Africa.  
 b *Puma*, BUFF. *Hist. Nat.*  
 tom. IX. p. 19.  
 Woond in America.

Tyger 2. —, met een lange staart, alle de  
 vlakken van het Ligchaam  
 streep gewyze. *Tigre*, BUFF.  
 C 4 *Hist.*

*Hist. Nat.* tom. IX. pag. 57.  
tab. IX.

Woond in Africa.

Panther 3. KAT, met een lange staart, de bo-  
(*Pardus.*) venvlakken van onder ge-  
streept \*, *Pantbere*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. IX. tab.  
11. 12.

Woond in Afrika.

[NB. Van onder gestreept zegt LINN.  
ten onregte, dit Dier is ge-  
lyk alle Tygers gevlakt.]

Jaguar 4. —, met een middelmatige staart,  
(*Onca.*) het ligchaam geelachtig, met  
rondagtige hoekige vlakken.  
BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX.  
pag. 90. tab. 18.

Woond in America.

Kat Pardel 5. —, met een lange staart, de bo-  
(*Pardalis.*) ven vlakken gestreept, de  
onderste rond. *Ocelot*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. XIII. tab.  
36. 37.

KAT;

Kleine Pant-(A) KAT, met een lange staart, een hertje grys ligchaam, met ronde zwarte kringen \*.

*Once*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. pag. 68. tab. 13.

Woond in Perſien.

Luypaard (B) —, met een lange staart, een rosgeel ligchaam, en ringsgewyze hoekige vlakken \*.

*Leopard*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. pag. 68. tab. 14.

Woond in Guinea.

Margay (C) —, met een lange staart, een dofgeel ligchaam, dat gestreept, gebandeerd en gevlacht is. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. pag. 131. tab. 38.

Bifamkat (D) —, met een lange staart, met een grysachtig geel ligchaam, met bruine vlakken. *Bifamkat*, VOSMAAR, *Beschryv.* tab. VIII. van de viervoetige Dieren.

Woond aan de Kaap.

- Wolf Ty. (E) KAT, met een lang staart, een bleek ger. . . . . geel ros ligchaam, met kleine zwarte digt by elkander staande vlakken.  
*Guepard*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. pag. 131.  
 Woond aan de Kaap.
- Kat. 6. —, met een lange staart, die met  
 (*Catus.*) bruin gemengd is, het ligchaam met zwartagtige banden, die in de lengte loopen, de drie zytingsche, als een slangentrek.  
*Chat*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. V. p. 137.  
 b Kat van Angora.
- Los 7. —, met een korte staart, die aan  
 (*Lynx.*) de punt zwart is, de ooren met zwarte hairtjes. *Lynx*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. tab. 21. pag. 108.
- Serval (F) —, met een korte staart, het ligchaam geel ros, met zwart gevlaakt.



*Serval*, BUFF. *Hift. Nat.*  
tom. XIII. p. 122  
Woond in Indien.

**Caracal** (G) KAT, met een korte staart, het  
ligchaam bruin ros, de oo-  
ren met pinceeltjes eindi-  
gende. *Caracal*, BUFF. *Hift-*  
*Nat.* tom. IX. p. 119. tab. 24.  
Woond in Arabien.

**Cugua.** (H) —, met een lange staart, het  
ligchaam geel ros, van on-  
der wit \*. *Couguar*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. IX. p. 97.  
tab. 19.

XIII. WEZEL. De voortanden zes, de middel-  
(VIVERRA.) ste kleiner.

De kiezen meer dan drie.

De tong meest met naar agter  
leggende stekels.

De nagels langs uitstekend.

**Ichneumon. I.** WEZEL, de staart aan 't begin dik,  
allengskens verdunnende, de  
dui-

- duimen wat afstaande\*. *Mongousta*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. tab. 19.  
Woond in Indien en Barbaryen.
- Coati  
(*Nasua*) 2. WEZEL, die ros is, de staart met witte banden. *Coati*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII. pag. 163.  
Woond in America.
- Nanca 3. ———, die bruinagtig is, met een bruine staart.  
Woond in America.
- Skunk  
(*Putorius*) 4. ———, die bruin is, met vier witte banden op de rug\*. *CATESBY Carol. II.* tab. 62.  
*Conepate*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. pag. 151. tab. 41.  
Woond in America.
- Quasje (A) ———, die bruin is, met een dunne bek, zwarte nagels, een eenvoudige staart. *SEBA*, I. tab. 42. fig. 1.

*Coase*, BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
XIII. pag. 154. tab. 39.  
Woond in America.

Chunck. (B) WEZEL, met een bultige rug, een wit ligchaam met drie zwarte banden, en een zeer breede staart. *Cinche*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. pag. pag. 149. tab. 40.  
Woond in Zuid-America.

Mapurita. (C) —, met een losse hairige staart, het ligchaam wit, en zwart gevlacht. *Zorille*, BUFF. *ibid.* pag. 42.

Zibetha. 5. —, met een geringde staart, een asgrauwe rug met zwart golfsgewyze gevlacht \*. *Civette*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. pag. 129. tab. 31.  
Woond in Oost-Indien, en America.

b *Zibeth*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. p. 131. tab. 34.

WE-

Genetta. 6. WEZEL, met een geringde staart, een geelros ligchaam, dat na het zwart held. *Genette*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. IX. tab. 36.

Fosfana. (D) ———, uit gryns, zwart en ros gemengeld, met vier zwarte banden aan de voorzyde. BUFF. tom. XIII. pag. 87. tab. 21.

XIV. FRET. VI. Boven voortanden, die recht op staan, scherp zyn, en van elkander afftaan.

VI. Onder voortanden die stomp zyn, dicht by elkander, en twee naar binnen. De *Tong* glad.

[De bek kort en stomp.

De pooten kort, de ooren rond.

Amerikaanfche 1. FRET, met gepalmde voorpooten, die hairig zyn, de staart  $\frac{1}{2}$  van het Ligchaam lang. *Loutre*  
Otter  
(*Lutris.*)  
de

*de Canada*, BUFF. *Hift. Nat.*  
tom. XIII. p. 165. tab. 45.  
Woond in Noord America.

Otter  
(*Lutria*) 2. FRET, met gepalmde voorvoeten,  
die naakt zyn, de staart half  
zoo lang als het Ligchaam.  
*Loutre*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
VII. p. 63. tab. 11.  
Woond in Europa.

Klein Ot-  
tertje. 3. —, met gepalmde voorpooten,  
die ruig zyn, en een witte  
bek.  
Woond in Finland.

Galera. 4. —, met gefpleeten pooten,  
zwart van onder, aan den  
hals een driehoekige vlak.  
*Galera*, BROWNE, *Fam.* pag.  
485. tab. 49. fig. 1. *Tayra*,  
BUFF. *Hift. Nat.* tom. XV. n. 5.  
Woond in Jamaica en Brasil.

Veelvraat. 5. —, met gefpleeten pooten, een  
(*Gulo*.) ros lyf, het midden van de  
rug zwart. EDW. *Hift. of*  
*Brids*,

*Birds*, pag. 103. tab. 103.

*Glouton*, BUFF. *Hist. Nat.*

tom. XIII. p. 145.

Woond in Siberien.

- Marter 6. FRET, met gespleeten voeten, het  
(*Martes.*) ligchaam zwartagtig ros, en een bleeke keel \*. *Fouine*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII. p. 76. tab. 18.

Woond in Europa.

b *Marte*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII. p. 90. tab. 20.

- Bonzem 7. —, met gespleeten voeten, het  
(*Putorius.*) ligchaam geelagtig zwart, met witte ooren en bek \*. *Putois*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII. p. 95. tab. 23.

Woond in Europa.

- Fret 8. —, die geelagtig witis, met roo-  
(*Furo.*) de oogen \*. *Furet*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII. pag. 101. tab. 24.

Woond in Africa [en Spanje.]

FRET,

Zabeldier 9. FRET, met gespleeten voeten, het  
(*Zibellina*). ligchaam castanje bruin; het  
voorhoofd witagtig, de keel  
afsch grauw \*. *Zibelline*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. XIII, p. 160.  
Woond in Asien, Tartarien,  
Siberien.

Hermelyn- 10. FRET, met gespleten pooten, en  
tje een zwart puntje aan de  
(*Erminea*.) staart \*. *Hermine*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. VII. pag.  
116. tab. 31.  
Woond in Noord Europa,  
en Asia.

Potto (A) FRET, met wittē zamen gedruk-  
te witte nagelen, het ligchaam  
geelachtig grys. *Potto Wezel*.  
*Vosm. Beschryv.* tab. IX. der  
viervoetige.  
Woond in America

NB. Dit geslagt is zoo na vermaagd-  
schapt aan het voorige, dat zy  
beter een geslagt te zaamen zou-  
den uitmaaken. Edoch de Heer  
LINNAEUS het geslagt der *Viver-*

*ræ*, van dat der *Mustelæ* afscheidende, heb ik voor yder een byzonderen geflagts-naam moeten nemen.

- XV. BEER. Zes Voortanden van binnen uitgehold, en overshands ftaande.  
 (URSUS.) Zes onder voortanden, de twee zylings langer en gekwabd.  
 De hondstanden kegelagtig.  
 Vyf of zes kiezen, de eerfte na by de hondstanden.  
 De tong glad.  
 De neus uitfteekend.  
 Het oog met een knipvlies.  
 De fchoft met een krom been.

Beer 1. BEER, met een korte ftaart\*. *Ours*,  
 (*Ursus*.) BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII.  
 p. 122. tab. 31, 32.

Das 2. —, met de ftaart eencoleurig,  
 (*Meles*.) het ligchaam van boven asgrauw, van onder zwart, een zwarte band door oogen en ooren\*. *Blaireau*,  
 BUFF.



BUFF. *Hist. Nat.* tom. VI.  
pag. 49. tab. 7. *Uitgez. ver-*  
*hand.* VIII. p. 362. tab. 56.  
Woond in Europa.

Racoon 3. BEER, met een geringde staart, en  
(*Lotor.*) een zwarte band door de oo-  
gen \*. BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. VIII. pag. 167. tab.  
42. f. 1.  
Woond in America.

Beer van 4. —, met een lange staart, roest-  
Hudsons baay couleurig ligchaam, bruine  
(*Luscus.*) bek, voorhoofd en zyvlak.  
EDW. *Hist. of Bird.* 103. tab.  
103.  
Woond aan Hudsonsbaay.

XVI. BUIDELRAT. Tien boven voortanden.  
(DIDELPHIS.) Zeven onder voortanden,  
de twee middelste korter.  
De hondstanden lang.  
De kiezen gekarteld.  
De tong hairig.  
Een zak aan den buik.  
D 2 But-

Buidelrat. 1. BUIDELRAT, met agt tepels in de  
(*Marsupialis.*) zak \*. *Sarigua*, BUFF. *Hist.*  
*Nat.* tom. X. pag. 128. tab. 45.  
Woond in America.

Philander. 2. BUIDELRAT, met de staart aan het  
begin hairig, hangende ooren,  
en oortepels \*.

NB. Dit is het mannetje van de voorige.

Woond in America.

Zakrot 3. ————, met een halve hairi-  
(*Opoffum.*) ge staart, twee borsten, bo-  
ven de wenkbraauwen een  
bleeke band \*. SEBA, I. tab.  
36. f. 1, 2.

NB. Deze is dezelve zegt BUFF. als  
No. 1.

Bofchrat 4. ————, met een half hairige  
(*Murina.*) staart, en zes tepels \*. *Marmose*,  
BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
X. pag. 131. tab. 52, 53.  
Woond in America.

NB. [Deze heeft geen zak.]

Rugdrager 5. BUIDELRAT, de staart aan het be-  
 (Dorsfigera,) gin hairig, langer dan het  
 ligchaam, stompe vingeren\*.  
 SEBA, *Schatk.* I. pag. 49.  
 tab. 31. fig. 45. MERIAN,  
*Surin.* 66.

Cajopolin (A) ———, met dunne door-  
 zigtige ooren, een stompe  
 bek, een witte buik \*. BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. X. pag. 159.  
 tab. 55.  
 Woond in America.

Ooft-Indi- (B) ———, met de staart aan  
 fche het begin hairig, het ligchaam  
 geelachtig, wit in het man-  
 netje, haazen Colour, met  
 een zwarte streep over den  
 rug, in het wyfje \*. *Pbalan-*  
*ger*, BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
 XIII. pag. 53. tab. 11, 12.  
*Dierk. Mengelw.* I. D. 5. stuk  
 bl. 26.  
 Woond in Amboina.

XVIII. MOL. Zes boven voortanden.

(TALPA.) Zeven onder voortanden.

Een hondftand, die groot is, en zes kleine.

[De voorpooten breed als handen.]

Gestaarte <sup>1</sup>1. MOL, met een ftart, en vyf vingeren \*. *Taupe*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII. pag. 41. tab. 12. SEBA, *Schatk.* I. D. tab. 41. fig. 1—4.

b Witte Mol \*.

Woond in Europa.

Afiatifche 2. —, zonder ftart, met drie vingeren \*. Veelcoleurige *Siberifche* Mol. SEBA, *Schatk.* I. D. pag. 5. tab. 32. fig. 4, 5. BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII. pag. 44.

Woond in Afien, en Siberien.

Purpere (A) —, die donker purper is, SEBA, *Schatk.* I. p. 5.

Woond in Virginien.

- Roode (B) MOL, die rood is. SEBA, *ibid.*  
 Woond in America.
- Gevlakte. (C) MOL, die zwart gevlacht is. SEBA, 51.  
 Woond in Oost-Friesland.

XVIII. SPITSMUIS. Twee gespleeten boven  
 (SOREX.) voortanden.

Zes van onder, de twee  
 middelste korter.

Verscheiden hondstanden.

[Het opperkaakbeen lan-  
 ger, dan het onderste

[Het ligchaam kort en dik.]

- Gekuifde 1. SPITSMUIS, met gekwabde neusgaa-  
 (Cristatus.) ten \*, en een korte staart\*.  
 Woond in Pensylvanien.

[Deze zeer zeldzaame soort maakt  
 den overgang van de Mol tot den Spits-  
 muis, zy gelykt eer een Mol dan  
 een Spitsmuis, ik heb dezelve in het  
 beroemde Cabinet van den Heer *Van  
 der Meulen* te Amsterdam gezien.]

- Kleine 2. ———, met een zeer lange  
 (Minuta.) bek, en geen staart.  
 Woond in Siberien.

- Virginiaan- 3. SPITSMUIS, met gepalmdede witte  
fche pooten, en een korte staart,  
(*Aquaticus.*) die wit is. *Zwarte Mol van*  
*Virginien.* SEBA, *Schatk. D.*  
I. pag. 51. tab. 32. fig. 3.  
Woond in Virginien.
- Javaanfche 4. ———, met een middelmatige  
(*Murinus.*) staart, bruin ligchaam, de  
pooten en staart afchgrauw.  
Woond in Java.
- Gemeene 5. ———, met een middelmatige  
(*Araneus.*) staart, het ligchaam van on-  
der witagtig. *Musferaigne,*  
BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII.  
pag. 29. tab. 10.  
Woond in Europa.
- Waterfpits (A) ———, die zwart is, en van  
muis. onder geelachtig afchgrauw.  
BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII.  
pag. 31. tab. 11.  
Woond in Frankryk.
- Brafiliaan- (B) ———, met een korte staart,  
fche bruin ligchaam, met drie  
zwarte

zwarte banden. BUFF. *Hift. Nat.* tom. XV. p. 43. n. 19.  
Woond in Brafil.

XIX. STEKELVARKEN. Twee van elkander afstaande voortanden.  
(ERINACEUS.)

Twee nader by een staande onder voortanden.


Twee agterleggende hondstanden.

[Het ligchaam met fcherpe pennen.

Egel 1. STEKELVARKEN, met ronde ooren  
(*Europeus.*) en een gekuifde neus \*. *Herisson*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII. pag. 15. tab. 6.  
Woond in Europa.

Amerikaan- 2. —————, zonder ooren,  
fche witte Egel. SEBA, *Schatk.* I.  
(*Inauris.*) Deel p. 78. tab. 49. fig. 3.  
*Tanrec*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII. p. 215. tab. 13.  
Woond in Madagescar.

van Malacca 3. STEKELVARKEN, met hangende ooren. SEBA, I. Deel pag. 81.  
 (Malaccensis.) tab. 51. fig. 1.  
 Woond in Afien.



#### IV. KNAGENDE DIEREN.


*Twee boven voortanden, geen hondstanden.*


XX. YZERVARKEN. Twee boven voortanden,  
 (HYSTRIX.) die schuinſch geknot  
 zyn.  
 Agt Kiezen.  
 Het ligchaam met lange  
 pennen.


Gekuiſde 1. YZERVARKEN, met vier voor en vyf  
 (Cristata.) agtervingers, het hoofd  
 gekuiſd, de ſtaart kort \*.  
*Porc-epic*, BUFF. *Hiſt. Nat.*  
 tom. XII. p. 189. tab. 54, 55.  
 Woond in de warme deelen  
 van Europa en Aſia.

YZER-



Grypftaart 2.  YZERVARKEN, met vier vingerige  
(*Prebensilis.*) voeten, een lange naakte gryp-  
ftaart \*. *Couendou*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. XII. p. 196.  
tab. 57.  
Woond in Indien.

Scherprug 3.  —————, met vier voor, en  
(*Dorsata.*) vyf agter vingeren, de rug  
alleen met ftekels \*. EDW.  
*Birds*, 52. tab. 52. *Urson*,  
BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII.  
pag. 199. tab. 58.  
Woond in Canada.

Langftaart 4.  —————, met vyf vingerige  
(*Macroura.*) voeten, een zeer lange ftart,  
ingeknotfte pennen. SEBA,  
*Schatk.* I. D. p. 84. tab. 52.  
fig. 1.  
Woond in Afia.

NB. Deze is dezelve met de voorige  
zoort.

XXI. HAAS. Twee voortanden, de bovenfte ver-  
(LEPUS.) dubbeld, de binnenfte kleiner.

[Eene

[Eene ronde kop, en lange ooren;  
ruige pooten.]

- Haas (Timidus.) 1. HAAS, met een korte staart, de ooren aan de punt zwart \*. *Lievre*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VI. p. 87. tab. 30.  
b Witte Haas.  
Woond in Europa.
- Konyn. (Cuniculus.) 2. ———, met een korte staart, en naakten ooren \*. *Lapin*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VI. pag. 114. tab. 42.  
b Konyn van *Angora*, tab. 45, 46.  
c Gestreept afchgraauwKonyn, tab. 44.  
d Tam Konyn, tab. 43.  
Woond in Europa. b in Syrien.
- Kaapfch (Capensis.) 3. ———, met een staart, zoo lang als het hoofd, en roode pooten \*.  
Woond aan de Kaap.
- Brefilifch. 4. ———, zonder staart. *Tapeti*, BUFF. *Hist.*

(Brafiliensis.)

*Hift. Nat.* tom. XV. p. 44.  
n. 21.

Woond in Brazil.

XXII. BEVER. De bovenfte voortanden ge-  
(CASTOR.) knot, en met een dwarsfe  
hoek uitgehold.  
De ftaart plat.

Bever.

(Fiber.)

1. BEVER, met een eyronde platte  
ftaart \*. *Castor*, BUFF. *Hift.*  
*Nat.* tom. VIII. pag. 138.  
tab. 36.

Woond in Europa, Afia,  
America.

Desman

(Mofchatus.)

2. —, met een lange ftaart, die  
plagtigtig lancetsgewyze is,  
de voeten gepalmd. *Onda-*  
*tra*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
X. pag. 1. tab. 2.

Woond in Rusland.

Ondatra

(Zibethicus.)

3. —, met een lange zaamen ge-  
drukte ftaart, en gefpleeten

voe-

voeten. BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. X. p. 1. tab. 1.

XXIII. MUYS. De onderste tanden elsgewyze.

Guineesch 1. Muis, zondert staart, met vier-  
biggetje vingerige voorvoeten, en  
(*Porcellus.*) drie vingerige agtervoeten\*.

*Cochon d'Inde*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. VIII. pag. 1. tab. 1.  
EDW. *Glean.* tab. 294. tab. 2.  
Woond in Brazil.

Kaapfch (A) —, zondert staart, met drie  
Mor-meldier voorvingers, en twee en  
(*Cavia Capen-* een halve agtervinger; en  
*sis.*) ronde ooren\*. *Cavia Capen-*

*sis*, PALLAS, *Miscellan Zool.* pag.  
36. tab. 3. *Kaapfch Mor-*  
*meldier*, VOSM. *Beschryv.*  
Woond aan de Kaap.

Aperea (B) —, zonder staart, met ronde  
ooren. BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
XV. pag. 43. n. 20.

Woond in Brazil.

MUIS,

- Aouti            2. **MUIS**, met een korte staart, vier voor, en vyf agtervoeten, en een geele buik.  
 BUFF. *Hift. Nat.* tom. VIII. tab. 50.  
 Woond in Brasil, Guajane, Suriname.
- Javaansche 3. —, met een korte staart, vier  
 (*Leporinus.*)     vingerige voor, endrie vingerige agtervoeten, een witte buik, *Javaansche Haas*, CATESB. *Carol III.* tab. 18.  
 Woond in Java, Sumatra.
- Zifel            4. —, met een korte staart, een  
 (*Citellus.*)       ligchaam zonder ooren. *Zifel*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XV. pag. 35.  
 Woond in Oostenryk, Boheemen, Bolen.
- Leming         5. —, met een korte staart, vyf-  
 (*Lemmus.*)       vingere voeten, en een zwart en ros gevlaakte ligchaam, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XIII. pag. 162.  
 Woond in Lapland.
- MUIS,**

- Cabiai (C) Muis, zonder staart, met drie voor en drie agter vingeren, korte ronde ooren, en een dikke kop. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. pag. 179. tab. 52. Woond in America.
- Paca. 6. —, met een korte staart, vyf vingerige voeten, de zyden geel gestreept \*. *Paca*, BUFF. *Hist. Nat.* X. p. 122. tab. 43. Woond in Brasili.
- Marmotta 7. —, met een lange dikhairige staart, ronde ooren, en bul-tige kaaken. *Marmotte*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII, pag. 109. tab. 28.
- Americaan- 8. —, met een lange matig hairi-  
sch mormel- ge staart, een afchgrauw  
dier ligchaam, ronde ooren, vier  
(*Monox.*) vingerige agter voeten. *Edw.*  
*Birds.* 104. tab. 104.  
Woond in America.
- Bobak. (D) Muis, met vyf voor en vier ag-  
ter

ter vingeren, en een hairigē  
korte staart. *Bobac*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. XIII. pag.  
74. tab. 19.

Woond in Poolen.

Hamster 9. Muis, met een middelmatige staart,  
(*Cricetus.*)      ronde ooren, het ligchaam  
van onder zwart, de zyden  
met drie witte vlakken \*.  
*Hamster*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIII. pag. 69. tab. 15.  
Woond in Duitſchland.

Aardmuis 10. —, met een matige staart,  
(*Terreſtris.*)      die wat hairig is, vier voor  
en vyf agtervingeren, de  
ooren kort \*. *Campagnol*,  
BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII.  
pag. 186. tab. 47.  
Woond in Europa.

Waterfot 11. —, met een lange hairige  
(*Aquaticus.*)      staart, en gepalmde agter-  
voeten. *Rat d'eau*, BUFF.  
E *Hist.*

*Hist. Nat.* tom. VII. pag.  
169. tab. 43.

Woond in Europa.

- Rat  
(*Rattus.*) 12. MUIS, met een lange byna naakte staart, vier voorvingeren en een nageltje, vyf agtervingeren \*. *Rat*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII. pag. 135. tab. 36.  
Woond in Europa.

- Muisje  
(*Musculus.*) 13. —, met een verlengde naakte staart, vier voor, en vyf agtervingeren, en een stomp duim \*. *Souris*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VII. pag. 150. tab. 39.  
Woond in Europa.

- Hazelmuis  
(*Avellanarius.*)  
us.) 14. —, met een hairige staart, een ros ligchaam, een witagtige keel, de agterste duimen stomp \*. *Edw. Glean.* tab. 266. *Muscardin*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. VIII. pag. 95. tab. 26.  
Woond in Newjork.

MUIS,



Eikelmuis 15. **MUIS**, met een lang hairige staart,  
 (*Quercinus*.) een zwarte vlak onder de oogen. *Lerot*, *BUFF. Hist. Nat.* tom. VIII. p. 89. tab. 25:  
 Woond in Duitschland.

Grauwe 16. ———, wiens staart driemaal korter is dan het ligchaam, en het ligchaam wat hairig grys, de buik en pooten wit.  
 (*Gregarius*.) Woond in Duitschland, Zweeden.

Boschmuis 17. ———, met een middelmatige staart, vier voor en vyf agtervingers, een grys ligchaam met zwarte haren, een witte buik. *Mulot*, *BUFF. Hist. Nat.* tom. VII. pag. 158. tab. 41.  
 Woond in de Tuinen, en Boschen in Europa.

Striatus 18. ———, met een middelmatige, byna naakte staart., met vier voorvingers, en vyf agtervingers, met gestipte streep

pen op het ligchaam. SEBA;  
*Schatk.* II. p. 22. tab. 21.  
 fig. 2.

Woond in Indien.

Akkermuis (E) —, met een staart, half zoo lang als het ligchaam, dat geel is, de buik en pooten grys, een zwarte streep van het hoofd tot de staart. PALL.  
*Reiz.* I. pag. 454.

Woond in Siberien.

Kleine (F) —, met een langhairige geringde staart, het ligchaam geelgrys, van onder ligt grys  
 PALL. *ibid.*

Woond in Siberien.

Langpoot 19. —, met een lange hairige staart, vier voor, en vyfagtervingerige, zeer lange dyen. *Daman Israël*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. XIII. pag. 79.

Woond in Syrien, Phenicien, Arabien.

MUIS,

Springer 20. MUIS, met een langestaart met een kwast, zeer lange agter en zeer korte voorpooten\*. EDW. *Birds*, 219. ALLAMAND. by BUFF. tom. XV. tab. 7.

b Springend Konyn *Comment Petropol.* 1760. Alagtagage.

c *Tarfier*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII, pag. 51. tab. 10. Woond in Indien.

Vliegende 21. ———, met een lange staart, vier voor, en vyf agtervoeten, het vel ter zyden uitgebreid. EDW. *Birds*, 191. tab. 191. Woond in Virginien, Mexico.

XXIV. EEKHOORN. Twee voortanden, de bovenste wigsgewyze. (SCIURUS.) De onderste plat. [De staart breed uitgebreid en lang.]

Gemeene 1. EEKHOORN, met ooren, die aan de  
 (*Vulgaris.*) tippen losse haitjes heb-  
 ben, vier voor en vyf agter  
 vingeren \*. *Ecureuil*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. VII. pag.  
 123. tab. 32.  
 Woond in Europa.

Zwarte 2. EEKHOORN, die geheel zwart is \*.  
 CATESBY. *Carol. II.* p. 73.  
 Woond in America.  
 NB. Deze zegt de Heer BUFF. *Hist.*  
*Nat.* tom. X. p. 54. is een ver-  
 scheidenheid der voorige.

Graauwe 3. ———, uit Virginien die a-  
 te schgraauw is \*. *Petitgris*,  
 (*Cinereus.*) BUFF. *Hist. Nat.* tom. X.  
 p. 52. tab. 25.  
 Woond in Noord America.

Geele 4. ———, met ronde ooren, een  
 (*Flavus.*) geel ligchaam, en vyfvin-  
 gerige voeten.  
 Woond in America.

Geteekende. 5. ———, die grys is, met drie  
 ge-

(*Palmarum.*)                      geelagtige streepen, de staart met witte, en zwarte banden. *Palmiste*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. p. 58. tab. 26. Woond in Asia, Africa en America.

Gebandeerd- 6. EEKHOORN, die bruin is, met vier de witte in de lengte loopende (*Getulus.*) banden\*. *Barbaresque*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. pag. 58. tab. 27. Woond in Africa en America.

Gestreepte 7. —————, die geel is, met vyf (*Striatus.*) bruine banden. EDW. 181. CATESB. *Carol II.* p. 75. tab. 75. *Suisse*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. X. p. 58. Woond in Noord-America.

Breedstaarti-8. —————, die grys is, van on- ge Rat. der wit. (*Glis*) Woond in Zuid Europa.

Geelbuik 9. —————, die grysis, van on- (*Aestuans.*) der geelagtig. Woond in Suriname.

Vliegende 10. EEKHOORN, met uitgespreide zy-  
 (Volans.) den vliegende, met een ronde  
 staart \*. *Polatouche*, BUFF. *Hist.*  
*Nat.* tom. X. pag. 43. tab. 21--23.  
 Woond in America.

Springer 11. ———, met uitgespreide zy-  
 (Sagitta.) den vliegende, plat lancetge-  
 wyze. PALL. *Miscell. Zool.* pag.  
 54. tab. VI. fig. 1. 2. Oostin-  
 dische *Eekhoorn*. VOSM. *Be-*  
*schryv.*  
 Woond in Java.

XXVI. NAGTVLIEGER. Twee voortanden, de  
 (NOCTILIS.) bovenste scherp,  
 de onderste twee-  
 kwabbig.

De neusgaten wat  
 voor uitsteekende,  
 rolrond, en dicht  
 by elkander.

Vliegende 1. NAGTVLIEGER, met de onderste  
 Haas. lip wrattig.  
 (*Americanus*.) Woond in America.

Deze

[NB. Deze is een waare Vleermuis, nergens in van de andere voorgemelde verschillende.]



## V. HERKAAUWENDE DIEREN.

*Geen boven voortanden, van onder zes, of agt, zeer ver van de kiezen geplaatst, De pooten gespleeten en hoeven. De Borsten in de Lieschen.*

XXVI. KEMEL. Geen Hoornen.

(CAMELUS. Zes spathelsgewyze beneden voortanden.

De hondstanden 'er van afstaande, drie van boven, twee van onder.

De bovenlip gespleeten,

[De hals lang, het ligchaam wollig.]

Dromedaris I. KEMEL, met een bult op den rug\*.

E 5

Dro-

(*Dromedarius.*)

*Dromedaire.* BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XI. pag. 85. tab. 9.  
Woond in Africa.

Kemel  
(*Bactrianus.*)

2. KEMEL, met twee bulten op den  
rug \*. *Chameau*, BUFFON,  
*Hist. Nat.* tom. XI. pag. 85.  
tab. 22.  
Woond in Afrika.

Glama.

3. ———, met een effen rug, en  
een bult op de borst. *Lama*,  
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XIII.  
p. 20.  
Woond in America.

Peruviaansch  
Schaap  
(*Pacos.*)

4. ———, met een wollig [bloed  
rood] Ligchaam, zonder bul-  
ten. *Paco*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XIII. p. 20.  
Woond in Peru.

XXVII. MUSKUS DIER.  
(*Moschus.*)

Geen Hoornen. De  
slagtanden van bo-  
ven uitsteekende.

Mys.



Muskus Dier 1. MUSKUSDIER, met een zak aan den  
(*Moschiferus.*) navel. *Musc.* BUFF. *Hist.*

*Nat.* tom. XII. p. 169.

Woond in Tartarien.

Jufferbokje. 2. ———, met een bultagtige ver-  
(*Grimmia.*) hevenheid op het hoofd\*.

*Antilope Grimmia.* PALL.

*Miscell. Zool,* p. 1. tab. 1.

*Spicil. Zool,* p. 38. tab. 3.

*Jufferbokje,* VOSM. *Beschryv.*

*Grimme,* BUFF. *Hist. Nat.*

tom. XII. p. 144.

Woond in Africa.

NB. Deze is een Hartebok, zie ge-  
flagt.

Guineefch 5. ———, met pootjes dunner  
Rheetje dan een vinger\*. *Chevrotain,*

(*Pygmaeus.*) BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII.

pag. 145. tab. 44.

Woond in Africa,

XXVIII. HART. Vaste tanden, jaarlykſch afvallende

(*Cervus.*) met een dun vel gedekte hoorens.

Ze-

Zeven onder voortanden, geen  
hondstanden.

[Lange Hals en pooten, korte  
staart.

- Giraffa 1. HART, met zeer eenvoudige Hoor-  
(*Camelopardalis*.) nen, de voorpooten zeer  
lang. *Giraffe*, BUFF. *Hist.*  
tom. XIII. pag. 11. tab. 1,  
Woond aan de Kaap.
- Eland 2. —, met gepalmdede hoornen, en  
(*Alce*.) een krop aan de keel. *Elan*.  
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII.  
pag. 47. tab. 27.  
Woond in Europa, Asia,  
America.
- Hart 3. —, met takkige hoorens, die ge-  
(*Elaphus*.) heel schilrond zyn, en krom  
BUFF. *Hist. Nat.* tom. VI.  
tab 5. 12. *Cerf*.
- Rendier 4. —, met kromme getakte hoorens  
(*Tarandus*.) die spilrond zyn, en aan de  
toppen gepalmd. *Renne*,  
BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII.  
P. 45.

p. 45. tab. 11. tom. XV.

p. 52. tab. 4.

Woond in Lapland.

Damhart 5. HART, met kromme getakte plaat-  
(*Dama.*) te hoornen, de toppen gepalmd, BUFF. *Hift. Nat.* tom. VI. pag. 49. tab, 19.  
Woond in Europa.

Rhee 6. —, met recht opstaande kleine  
(*Capreolus.*) takkige hoorns, de toppen gevorkt\*. BUFF. *Hift. Nat.* tom. VI. pag. 64. tab. 24. 25.  
Woond in Europa, Asia.

Hart van 7. —, dat grys is, van onder zwart-  
Guinea agtig.  
(*Guineensis*) Woond in Guinea.

XXIX. HARTEBOK. Regt opstaande, beenige  
(ANTILOPE.) ongetakte, spilronde hoornen, die niet afvallen, en in een scheede beslooten zyn.

De

De hoeven knobbelig, de  
staart kort.

1. Blaauwe 1. HARTEBOK, met wat naar vooren  
Bok. geboogen hoornen. Het lig-  
chaam asgrauw, de rug zwart,  
een witte vlak aan het oog,  
de buik, en pooten wit.  
PALL. *Dierk. Mengelw. I. D.*  
pag. 4. n. 1. 1. ft.  
Woond aan de Kaap.

2. Gemse 2, ———, met regte opstaande hoor-  
nen, die van boven krom  
zyn, een asgrauw vlak ag-  
ter de hoornen, vol lokken  
aan de knien, het ligchaam  
bruin. *Bouquetin*, BUFF.  
*Hist. Nat. om. XII. pag. 67.*  
tab. 15. *Gemse Dierk. Men-  
gelw. I. D. I. ft. p. 5. n. 2.*  
Woond in Europa.

- Dama. 3. ———, die bruin rood is, met  
met naar vooren omgekrom-  
de hoornen. DAMA, *Dierk.*  
*Mengelw. I. D. I. ft. pag. 5. n. 3.*  
*Nat.*

*Nanguer*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. XII pag. 101.  
Woond in Afrika.

Kromhoorn.4. HARTEBOK, met byna gladde, naar  
(*Redunca*.) vooren gekromde hoornen,  
het ligchaam bleekros, *Nagar*,  
*BUFF. Hist. Nat.* tom. XII. p. 151. tab. 48. *Dierk.*  
*Mengelw.*, I.D. 1. ft. pag. 6.  
n. 7. Woond in Senegal.

Kemel Bok 5. ———, met een bult voor op  
(*Trago Camelus*.) de rug, een langehals, en  
staart. *Tragocamelus*, PARS,  
*Philosoph. transact.*, vol. 43.  
p.465. *Dirk. Mengelw.*, I.D. 1.  
stuk. p. 7. n. 5.  
Woond in Indien.

Tartarifche 6. ———, met geringde geele  
(*Scytica*.) doorzigtige hoornen, het lig-  
chaam bruin ros, de buik  
wit. *BUFF. Hist. Nat.* tom.  
XII. pag. 96. tab. 24.  
fig. 2. *Dierk. Mengelw.*,  
*Tar-*

*Tartierifche Bok*, LINN. *Syst.*  
XII. pag. 97. n. 11.  
Woond in Tartaryen, Mosco-  
vien.

Witgatje 7. HARTEBOK, met eenigzins platte ,  
(*Pygargus.*) liersgewyze , gerimpelde  
hoornen, roeftcoleurigzwart,  
de billen van agteren, de buik  
en een streep over het voor-  
hoofd, wit. *Tzeiran*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. XII. pag.  
99. pl. 23. fig. 6. (de hoo-  
ren), *Dierk Mengelw.*, I. D.  
I. stuk. pag. 8.  
Woond in Arabien.

Dorcas 8. —————, met hoornen, die heel  
(*Gazelle.*) en half geringd, en in de  
lengte gestreept zyn, een  
witte buik en billen. Hair  
bosjes aan de knien. *Gazelle*,  
BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII.  
pag. 97. tab. 25. *Dorcas*,  
*Dierk Mengelw.*, I. D. I. ft.  
pag. 9. tab. 9.  
Woond in Syrien.

HAR.

Kevela 9. HARTEBOK, met geringde hoornen, die aan de zyden plat zyn, het ligchaam rosbruin, een zwarte staart, en een zwarte streep aan de zyden, *Kevel*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII. pag. 98. tab. 38. *Dierk. Mengelw.* I. D. I. stuk. p. 10. n. 9. Woond in Senegal.

Os van Barbaryen (Bubalis.) 10. ———, met dikke geflingerde hoornen, het ligchaam grysachtig ros, de hals roeftverwig. *Bubale*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII. pag. 138. tab. 37, 38. *Dierk. Mengelw.* I. D. I. stuk. pag. 10. Woond in Barbaryen.

Bezoarbok (Besoartica.) 11. ———, met regte tot boven de helft gerimpelde hoornen, die boven de rimpels geknobbeld, en na den top glad zyn. *Pasan*, BUFF. *Hift. Nat.* tom. XII. pag. 101. fig. 3. de hoornen, *Dierk. Mengelw.*

*Mengelw. I. ft. D. I. pag. 12.*  
Woond in de Levant.

Jufferbokje. 12. HARTBOK, met regt opstaande  
(*Grimmia.*) hoornen, een hairig bultje  
dezelve\*. *La Grimme*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. XII. p. 144.  
PALL. *Miscell. Zool.* pag. 1.  
tab. 1. *Specil. Zool.* pag. 28.  
tab. 3. *Jufferbokje*, VOSM.  
*Beschryv. Moschius Grimmia*,  
(LINN.)

Woond in Indien.

[NB. Deze is dezelve welke pag. 71.  
gemeldt wordt.]

Geteekende 13. ———, met agteroverleggen-  
(*Scripta.*) de platte gezwenkte, eenigzins  
gekielde hoornen. Het lig-  
chaam bruin ros, met witte  
elkander kruizende streepen.  
*Guib*, BUFF. *Hist Nat.* tom.  
XII. pag. 143. tab. 42. en  
43. f. 3. hoorn. *Dierk. Men-  
gelw. I. D. I. ft. p. 13.*  
Woond in Senegal.

HAR-



Kaapfche E. 14. HARTEBOK, met regt opstaande  
land  
(*Oryx.*) dikke hoornen, die flangen  
trekkig gekield zyn\*. *Con-*  
*dou*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
pag. 167. tab. 49. f. 3. [de  
hoornen.

Woond aan de Kaap.

Koedoe 15. ———, met ronde gedraaide  
(*Strepsiceros.*) hoornen, die gekield zyn,  
een witte plek aan de oogen  
die voor den kop zaamen  
loopt \*. *Condoma*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. XII. p. 131.  
tab. 41. de hoornen.

Hartebok 16. ———, met groote naakte  
(*Rupicapra.*) van elkander wykende gerim-  
pelde hoornen, het ligchaam,  
bruin, de hals zwart\*. *Anti-*  
*lope*, BUFF. *Hift. Nat.* tom.  
XII. p. 102. tab. 37. [tge-  
raamte] tab. 38. [de hoor-  
nen] tom. XV. p. 57. tab. 5.  
[de afbeelding is flegt. *Dierk.*  
*Mengelw.* I. D. I. stuk. pag.

16. tab. 1, 2. met een zeer  
flegte afbeelding.

Woond in Bengale.

XXX. BOK. De hoornen hol, [plat gekield ge-  
(CAPRA.) zwenkt] recht opstaande ruw.

Agt onder voortanden.

Geen hondstanden.

[Een baard onder de keel.]

- Bok 1. BOK, met geboogen gekielde hoor-  
(*Hircus.*) nen, en een gebaarde keel\*.  
*Bouc*, BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
V. pag. 27. tab. 8, 9.  
b Bok van Angora.  
c Bok van Juda.

- Wilde Bok 2. —, die een baard heeft met hoor-  
(*Ibex.*) nen, die van boven knob-  
belagtig zyn, en na de rug  
hellen. *Boucquetain*, BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. XII. pag. 67.  
tab.

Woond in Europa.

BOK,

## ZOOGENDE DIEREN 81

Syrische Bok 3. Bok , met liggende hoornen, hangende ooren, de keel gebaad. *Mambrine* , BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. pag. 72.  
Woond in Syrien.

Gemse 4. — , met recht opstaande hoornen, die van boven krom zyn.  
(*Rupicapra.*)  
(NB. Deze is een Hartebok [zie pag. 74, n. 2.]  
Woond in Zwitserland.

Plathoorn 5. — , met platte kromme hoornen, die zeer klein zyn, en op 't hoofd leggen, de keel met een baard. BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. tab. 20.  
Woond in America.

Kromhoorn 6. — , met regt opstaande hoornen, die van boven krom zyn, deze schynt een *Mazame* van SEBA, te zyn.  
Woond in America.

Gazelle 7. Bok, met spilronde hoornen, die zeer langen regt zyn, en van onder geringd.

NB. Deze is de kaapfche Eland of 13. Hartebok.

Woond aan de Kaap.

Koedoe 8. —, met spilronde hoornen, die (*Cervicapra.*) half geringd zyn, gezwenkt, en gedraaid.

NB. Deze is de Koedoe, of 14de Hartebok.

Woond in Indien.

Bezoar Bok 9. Bok, met spilronde hoornen, die (*Bezoartica.*) geheel geringd zyn, de keel gebaad.

NB. Deze is de 1ode Hartebok.

Rheebok 10. Bok, met spilronde hoornen, die volkomen geringd zyn, (*Dorcas.*) krom en gedraaid.

NB. Deze is de 8fte Hartebok.

Woond in Africa.

Tartarifche 11. —, met spilronde, byna regte hoornen, die volkomen geringd

ringd, en aan de punt door-  
zichtig zyn, zonder baard.

NB. Deze is de 6de Hartebok.

Woond in Afia.

Ammon. 12. Bok, met kromme half maansge-  
wyze, van onder platte hoor-  
nen, een loffe kofsem,  
geen baard. *Mouflon*, BUFF.  
*Hift. Nat.* XI. pag. 149. tab.  
29.

NB. Dit is een Ram en geen Bok.

Woond in Siberien.

XXX. SCHAAP. De hoornen hol naar agter ge-  
(Ovis.) keerd, gezwenkt, ruig.  
Zeven onder voortanden.  
Geen snytanden.

Ram 1. SCHAAP, met platte maansgewyze  
(Aries.) hoornen \*. *Belier*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. V. pag. 1.  
tab. 1.

a gemeen Schaap.

b Engelsch Schaap met

F 4

een

een tot de knien toe hangende balzak.

c Veelhoornig Schaap.

d Afrikaansch gehaird Schaap.

e Breedstaartig Schaap.

(a) Woond in Europa, (b) in Engeland, (c) in Gothland, (d) in Africa, (e) in Arabien.

Van Guinea 2. SCHAAP, met hangende ooren, een (*Guineensis.*)

voor uitteekend agterhoofd, en losse hairige kofsem, *Belier des Indes*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XI. tab. 35.

Woond in Guinea.

Koedoe 3. —, met regte opstaande hoornen (*Strepsiceros.*) die gekield en gezwenkt zyn.

[Deze is de Koedoe of 14de Harteboek.]

Woond aan de Kaap.

XXXII. OS. Holle naar vooren geboogen hoornen, die maansgewyze, en glad zyn. Van

Van onder Zeven voortanden.  
Geen snytanden.

- Stier (Taurus.) 1. Os, met spilronde hoornen, naar buiten omgekromd, en hangende koffsem \*. *Taureau*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. IV. pag. 169. tab. 14.  
Woond in Europa.  
b *Urus*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XI. pag. 130.
- Bonafus 2. —, met naar elkander geboogen hoorens, en zeer lange maanen \*. *Bonafus*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XI. pag. 129.  
Woond in Afrika, Asia.
- Bifon 3. Os, met van elkander wykende hoorens, zeer langemaanen, en een bultige rug. *Bifon* BUFFON *ibid.*  
Deze is dezelve met de voorige.
- Ruige Koe. 4. Os, met Spilronde naar vooren gekroomde hoornen, een

hangend vel, de staart los-  
hairig.

Woond in Noord Afie.

Os van  
Barbaryen  
(*Bubalis.*)

5. Os, met agter overleggende krom-  
me van vooren platte hoor-  
nen. *Buffle*, BUFF. *Hift.*  
*Nat.* tom. XI. pag. 122.  
tab. 25.

Woond in Afien en Italiën.

b Buffel van Africa. [De-  
ze is de 9de Harteboek,  
die egter niet, of niet al-  
leen in Africa, maar ook  
in Afien woondt.]

Indiaanfche 6. Os, met hoornen, die kleiner  
(*Indicus.*)

zyn, dan de ooren, een  
bult op den rug geen maa-  
nen. ZEBU BUFF. *Hift.* *Nat.*  
tom. XI. tab. 42.

Woond in Indien.







## V I. G E H O E F D E.

*De Voortanden stomp, de Pooten geboeft.*

XXXIII. PAARD. Zes boven voortanden, die  
(EQUUS.) regt, en even wydig staan.  
Zes onder voortanden, die  
meer uitfteeken.

De hondftanden alleen ftan-  
de.

De pooten met een hooft.

Paard 1. PAARD, met een geheele hairige  
(*Caballus.*) ftart \*. *Cheval*, BUFF. *Hift.*  
*Nat.* tom. IV. p. 66. tab. I.  
Woond in Europa.

Ezel 2. —, met het eind der ftart hairig,  
(*Afinus.*) met een zwart kruis op de  
fchouders \*. *Ane*, BUFF.  
*Hift. Nat.* tom. IV. p. 145.  
tab. XI.  
Woond in Europa.

PAARD,

Zebra. 3. PAARD, dat wit is, met Bruine banden \*. *Zebra*, EDW. *Birds.* tab. 222. *Zebra*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. pag. 8. tab. 1.  
Woond in Zuid Africa.

XXXIV. RIVIERPAARD. De voortanden van (HIPPOPOTAMUS.) boven zes, by paaren van onder vier voor uitsteekende de middelste langer

De hondstanden schuinsch geknot.

De pooten, aan den rand genageld.

(*Amphibius.*) I. RIVIERPAARD, met vierhoevige pooten\*. *Hippopotame*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. XII. p. 17. tab. 3, 4.  
Woond in Africa.

XXXV. VARKEN. Vier boven voortanden, die naar elkander toestaan, zes on-

onder voortanden , die  
voor uitsteeken.

Twee korte boven snytan-  
den.

Een van onder die uitsteekt.

Een platte beweegbaare uit-  
steekende snuyt.

Varken.  
(*Scrofa*)

1. VARKEN, met de rug van vooren  
borstelig, de staart hairig \*.  
*Cochon*, BUFF. *Hist. Nat.*  
tom. V. pag. 45. tab. 14.  
b WildVarken, *ibid.* tab. 15.  
c Chineesche Varken, *i-*  
*bid.* pag. 52.

Woond in Europa.

Æthiopisch (A) ———, met een zeer groote,  
breede platte snuit, een klei-  
ne bek, zeer kleine digt by  
elkander staande oogen, met  
een traangroef, en twee  
kwabben onder dezelve \*.  
PALL. *Miscell. Zool.* pag. 16.  
tab. 3. *Spicil Zool*, I. D. I.  
stuk. tab. 1. VOSM. *Beschryv.*  
ALLAMAND; by BUFF. *Hist.*  
*Nat.*

*Nat.* tom. XV. p. 48. tab. 1.  
Woond aan de Kaap.

Guineefch 2. VARKEN, met de rug van agter,  
(*Porcus.*) de staart zoo lang als de pooten,  
*BUFF. Hist. Nat.* tom. XV. pag. 38. n. 11.  
Woond in Guinea.

Tajacu. 3. ———, zonder staart, met een  
mufcus bevattende holte op de rug\*. *Pecari*, *BUFF. Hist. Nat.* tom. X. pag. 9. tab. 34.  
Woond in Mexico, Panama, Brazil.

Watervarken 4. ———, zonder staart, met drie  
voorvingeren. Deze is een soort van *Cavia*, of Muis,  
(*Hydrochaeris.*) zie pag. 60. *Cabiai c. &c.*  
Woond in Suriname.


Babirouffa. 5. ———, de twee hondftanden zeer groot, naar het hoofd omgekromd\*. *Babirouffa*, *BUFF. Hist.*

*Hist. Nat.* tom. XII. pag.  
177. tab. 51.  
Woond in Borneo.

XXXVI. RHINOCEROS. Twee voortanden aan  
weder zyden, die stomp  
zyn, en zeer ver van  
elkander afstaan.  
Een ronde kegelagtige  
hoorn op de neus.

Rhinoceros 1. RHINOCEROS, met een hoorn op  
de neus \*. *Edw. Birds.* tab.  
221. fig. 2. *Buff. Hist.*  
*Nat.* vol. XI. pag. 70. tab.  
7. *Albin.* tab. *Musc.* IV.  
V. VI.

b Met twee hoorens \*.  
Woond in Africa.





## VII. WALVISSCHEN.

*Lugtgaaten boven op het hoofd. De borst  
en staart vinnen Horizontaal.*

XXXVII. EENHOORVISCH. Twee zees lange  
(MONODON.) regte gedraaide  
tanden, in de  
bovenkaak.  
Een water buis  
op het hoofd.

Zee Een- \* [EENHOORN, met een lange gedraaide  
hoorn. hoorn aan de opperkaak.  
Woond in Europa.

XXXVIII. WALVISCH. Hoornige bladen in ste-  
(BALAENA.) de van tanden.

Groenland- i. WALVISCH, met bochtige blaasgaa-  
fche ten op het midden van den  
kop

(*Mysticetus.*)

kop de rug zonder vinnen\*.

GRONOV. *Zooph.* 139.

b Noordkaper.

Woond in de Noordzee.

Vinvisch

(*Physeter.*)

2. WALVISCH, met twee blaasgaaten,

op het hoofd, een vetvin op

den rug. MARTEN SPITZS.

Woond in de Noordzee.

Koeienoog 3.

(*Bæops.*)

— — —, met twee blaasgaaten;

het agterste der rug met een

hoornig uitsteekzel.

Woond in de Noordzee.

Breedfmoel 4.

(*Misculus.*)

— — —, met twee blaasgaaten,

het onderste kaakbeen veel

breeder\*.

Woond in de zee by Schot-

land.

Vinvisch

(A)

— — —, met twee blaasgaaten,

en een knobbel op den rug.

Woond by Nieuw Engeland.

Knobbel-  
visch

(B)

WALVISCH, met twee blaasgaaten

en zes knobbels op den rug.

XXXIX. CACHELOT. Tanden in het onder-  
(PHYSETER.) kaak been.

Een blaasgat op het  
hoofd.

Catadon. 1. CACHELOT, zonder vin op den rug,  
met een buis in den snoet.  
Woond in de Noordzee.

Potvifch 2. ———, zonder vin op den rug,  
(*Macrocephalus.*) met een buis in den nek.  
Woond in de Noordzee.

Kleinoog 3. ———, met een lange graat op  
den rug, de bovenkaak lan-  
ger.  
Woond in de Noordzee.

Maftvifch 4. ———, met een zeer hooge uit-  
(*Tursio.*) steekende vin op den rug,  
de tanden van boven plat.

XL. DOLPHYN. Tanden in beide kaakbeende-  
(DELPHINUS.) ren, een buis op het hoofd.

Bruinvifch 1. DOLPHYN, met het lyf kegelrond,  
een



- (*Phocaena.*) een breede rug, en stompe bek.  
Woond in de Noordfche en Balthifche zee.
- Dolphyn 2. DOLPHYN, met een langwerpig rond lichaam, de fnuit fpits.  
(*Delphis.*) Woond in de Noordzee.
- Botskop. 3. ———, met een opgewipte fnoet, de tanden breed, en zwaardsgewyze.  
(*Orca.*) Woond in de Noordzee.

*Einde van het I. Deel's, Iste Stuk.*

D R U K F O U T E N, aldus te verbeteren.

Opdragt.  
bladz.

II regel. 20 kuudigheden *lees* kundigheden.

Voorrede  
bladz.

III — 9 znn. — zyn

X — 13 veelvormingen *lees* veelvormigen

XXXIV — 10 *oxalis fenfitiva mimofa lees oxalis fenfitiva.*

XXVII laafte reg. infect. tel *lees infect. bel.* (*mimofa.*)

XXXIII reg. 10 fcheeden *lees* fcheede.

XL — 4 *Sachys lees Stachys*

XLI — 8/ *asperine lees aparine*

ib. — 9 *afferi folia lees asperifolia*

XLVII — 19 verharing *lees* verharding

XLVIII (laafte) reg. *doe uit de woorden*: en die ontbonden.

LVII reg. I verfchil rang *lees* verfchil, rang fchikkingen

LXVII — 12 meterol *lees metereol* \*.

LXXIV laafte reg. winderingen *lees* winderigen.

# D R U K F O U T E N .

Bladz.

- LXXV — 10 Lineus lees *Linnaeus*.  
 ib. — 16 niet Upsal in lees niet in Upsal.  
 LXXVII — 14 Schilddraagende lees schild-draagende.  
 LXXXVII — 7 *Ngama* doe uit  
 XCV — 17 JULIANES, lees JULIAANS  
 8 reg. 18 *Fanus* lees *Faunus*  
 10 reg. 5 Cynomolgos lees Cynamolgos.  
 ib. reg. 14 DIANA lees *Diana*.  
 11 reg. 6 *Cipbus* lees *Cepbus*  
 ib. reg. 13 *tripida* lees *trepida*.  
 12 reg. 3 *Nimacus* lees *Nimacus*.  
 ib. reg. 10 Senica lees *Sinica*  
 14 reg. 3 *Jacokus* lees *Jacchus*.  
 14 reg. 11 *Mufius Aapje* lees *Muscus Aapje*.  
 16 reg. 21 chineeschje lees Cheneesche I.  
 17 reg. *Samine* lees *Saimira*  
 18 laatste reg. *Maucauas* lees *Maucaucas*  
 20 reg. 18 hantsgewyz lees hantsgewys  
 21 reg. 11 *Kirwonba* lees *Kiriwoula*  
 25 reg. *Lamatin* lees *Lamantin*.  
 27 reg. 16 SCHUBHAAGD. lees SCHUBMAAGDISCH.  
 28 reg. 1 SCHILVERK lees SCHILDVARKEN.  
 34 reg. 12 Advie lees *Adive*  
 35 reg. 4 *VOSMAER* beschr. voeg by, noch niet uitgegeven.  
 41 reg. 5 *Chunk* lees *Chink*  
 43 reg. 11 onder klein Ottertje te voegen (*Lutreola*)  
 46 reg. 16 schoft lees schaft  
 50 reg. 21 *Bolen* lees *Polen*  
 60 reg. 21 *Monax* lees *Monax*  
 61 reg. 24 vingerige lees vingeren  
 67 reg. 17 *fuiſſe* lees *ecureuil fuiſſe*  
 71 reg. 16 geslagt, agter te voegen XXIX.  
 72 reg. 18 schilrond lees spilrond  
 73 reg. 5 plaatte lees platte  
 76 reg. 2 *Tartierische* lees *Tartarische*  
 78 reg. 6 een hairig bultje lees tusschen dezelve  
 ——— 12 *Moschius* lees *Moschus*.  
 79 reg. 4 *Condou* lees *Coudou*.  
 80 reg. 6 gekield gezwenkt lees gekieldt, gezwenkt,  
 ib. reg. 7 recht opstaande lees recht op staande,  
 ib. reg. 20 reg. agter tab. te voegen XV.  
 85 laatste reg. gekroomde lees gekromde  
 86 reg. 10 ZEBBA lees *Zebu*  
 99 reg. 5 de rug van agter, lees de rug van agter hairig  
 92 reg. 6 Twee zees lees twee zeer.  
 ib. reg. 12 [Een hoorn, het haakje [weg te doen.

KORTBEGRIP  
VAN HET ZAMENSTEL DER  
N A T U U R,

VAN DEN HEER

C. LINNAEUS,

MET ZEER VEELE ZOORTEN  
VERMEERDERT DOOR

P. BODDAERT,

*Med. Doct., Oudraad der Stad VLISSINGEN,  
Lid van den Keizerlyke Academie der Natuuron-  
derzoekeren, van de HOLLANDSCHE  
Maatschappij der Wetenschappen te HAAR-  
LEM, en van het ZEEUWSCHE Ge-  
noodschap der Wetenschappen te  
VLISSINGEN.*

E E R S T E D E E L.

T W E E D E S T U K.

---

---

T e U T R E C H T,

By J. VAN SCHOONHOVEN, EN COMP.

M D C C L X X I I I.



# VOORREDE.

Beschouwden wy in het vorige Stuk, de Dieren, die met ons op aerde leeven, zagen wy hunne wonderbaare verscheidenheid in het uiterlyk zamenstel; zoo toonde ons hunne gedaante, dat het innerlyk werktuigelyk gestel nader by dat van den Mensch kwam, dan dat van eenige andere Dieren; schoon sommige hunner zig van de aarde verbeffen, en in de lugt zweeven, laat dit gestel niet toe, dat zy zich hoog in de lugt begeeven; of van het eene Land naar het ander vliegen; de Vledermuizen, Vliegende Eekhoornen &c. vliegen slegts tot eene geringe hoogte (a), of vanden eenen boom tot den anderen. De Vogelen in tegendeel vliegen hooger dan de Wolken, want zy verdwynen uit ons gezicht, en de gezichtkunde leerd, dat een voorwerp, dat door het daglicht verlicht word, eerst op den afstand van 3436 maalen zyn middellyn voor ons gezicht verdwynt, indien men nade vlugt van een Arend op vyf voeten stelt, verdwynt hy eerst voor ons oog op den afstand van 17080 voeten, of 5726 roeden (b).

Zy vliegen met een verbaazende snelheid, een Rendier, een Eland kunnen veertig mylen op eendag afleggen, en een Engelschman TORNER genaamd, heeft in elf uren twee en dertig minuten, twee en zeventig mylen afgelegd, en in dien tyd 21 maal een Paard, verandert; zoo dat de beste Paarden maar vier mylen in een uur kunnen afleggen, en dus maar dertig mylen op een dag; maar een Vogel, een Arend by voorbeeld, of Kuikendief welke vier voeten vlugts heeft, legt

1500

(a) Zie Dierk. Mengelw. 2. Stuk.

(b) BUFF. Hist. Nat. Ois. tom. I. pag. 13.

1500 voeten af in een minuut, en dus twintig mylen in een uur; en kan dus in tien uren vlugts 200 mylen afleggen, onze Zwaluwen, en andere trekvogels kunnen dus in minder dan 7 of 8 dagen van hier, tot onder de linie vliegen, en ADANSON heeft Zwaluwen aan de kust van Senegal gezien, op den 9 October, dus 8 daagen naar hun vertrek (c). Alles loopt tot deze snelheid in den Vogel zaamen. De pluimen zyn zeer ligt, en hebben een groote oppervlakte, de gedaante der vleugelen, die van boven bol en van onder hol zyn, hunne vastheid, groote uitgestrektheid, en de kracht der spieren die hen doet beweegen, eindelyk de ligtheid van het ligchaam, waar van zelv de vaste deelen ligter zyn, dan die der viervoetigen, en de vlakke beenderen zyn dunner, het geraamte van een Pelicaan schoon zeer groot woeg, maar drie en twintig oncen.

Het tweede dat de Vogelen van de viervoetigen onderscheid, is de stem, geen viervoetig Dier is 'er bekendt, dat eenige woorden of gezang leeren kan; de meeste viervoetigen zyn zeer stil, en hun stem die zy niet dikwyls laten hooren, is onaangenaam. De Vogelen integendeel hebben zagtheid, aangenaamheid en melodie in hunne stem, 'er zyn zommige, welker stem onverdragelyk is, maar deze zyn weinige, en de stem der Vogelen is, zoo veel te sterker naar maate hun ligchaam kleiner is, een Paauw. welke het honderste gedeelte niet uitmaakt van Os, laat zich op grooter afstand hooren; de stem van een Nagtegaal, loopt zoo veel ruimte door, als van een mensch. De stem der viervoetigen kan geen kwartier ver gehoord worden, en word noch door het dikste, en dus het bekwaamste deel van den dampkring gemaakt, daar wy die der Vogelen van hoog in de Lucht  
hoor-

(c) ADANSON. *Voyage au Senegal.*

## V O G R R E E D E.

hooren, schoon zy zelve 3436 maalen hun eigen middelzyn van ons af zyn.

Wat de zagtheid en aangenaamheid van de stem der vogelen betreft, die is hen natuurlyk. En het is aanmerkelyk, dat in alle bevolkte en beschaafde Landen, de meeste vogelen eene aangenaame stem hebben, daar in de uitzgestrekte woestynen van Afrika en America, alwaar slegts wilden woonen, de Vogels alleen schreeuwen en 'er weinige een aangenaame zang hebben. Moet men dit aan de Lugtstreek toeschryven? De Lugtstreek verandert, beken ik het uiterlyk aanzien der Vogelen; en teekend met harde en sterke merken. De viervoetige Dieren, welker vacht met afsteekende verwen, ronde vlakken of lange banden verciert is, behooren alle in warmer gewesten te huis; en alle de Vogelen hebben gloeiende verwen, edoch alle hebben zy eene onaangename stem.

Onder de Vogelen zingen de mannetjes het meest, en wel tegens den broeytyd, het is dus eene aangenaame uitdrukking van hunne begeertens. De Nagtegaal zingt het best, wanneer het wyfje het nestje maakt, endeze zang die jaarlyks ophoud, en vernieuwd word, en maar twee of drie maanden duurt, toont eene werktuigelyke overeenkomst tusschen de werktuigen der voorteeeling en de stem, ziet men in den mensch niet, dat de stem voller word in de mannelyke jaaren? in de viervoetigen word zy dan schrikbaarend.

En dewyl de Voorteeeling in de Vogelen; maar alleen op zommige tyden van het jaar plaats heeft, zoo volgt dat in de andere tyden dit overtollige vocht, de vaste deelen meer stevigheid byzet, in den mensch en in de viervoetige Dieren is de levensdoring evenredig aan de groeiing, gelyk de Heer BUFFON bewezen heeft en zy zyn slegts ter voorteeeling bekwaam, nadat zy het grootste deel van hunne groeiing door zyn. In d. Vo-

## V O O R R E E D E .

gels geschiedt dit schieliker, een pas uit het ey gekomen Vogel kan staan, en loopen, en binnen eene maand of zes weken, na zyne uitkipping vliegen. Een Haan van vier maanden kan treden, schoon hy binnen 't jaar eerst zynen vollen wasdom heeft, en het leeven van een mensch of vier voetig dier is, zes of zeven maalen zynen tyd van groeiing, doch by de Vogelen is dit veel langer, ik heb zelv een Cacatoe gezien die vyftig jaaren oud was, en een Papegaay van zeventig: Dit is waarschynlyk aan het zamenstel der beenderen toe te schryven, want hoe harder en vaster de beenderen worden, hoe nader het leven ten einde loopt.

Een ander onderscheid noch tusschen de Vogelen, en de vier voetige Dieren is, die zucht van veelen om hun geboorteplaats voor een zekeren eyd, en op eenen bepaalden tyd te verlaaten, gelyk men in de Trekvogelen ziet: De viervoetigen integendeel, blyven altoos aan hunne geboorteplaats verbonden, en indien de noodzakeheid vereischt dezelve te vervoeren, kwynen zy. Niemand heeft oir een Laplandsch Rendier, in de gematigde Luchtstreek kunnen in het leeven houden, nooit heeft men het Guineesch Reetje, in onze gewesten kunnen opkweeken; De Europische Honden in warmer gewesten overgebracht, worden kaal en stom, De Leeuwen en Tygersteelen in onze Landen niet voort, het geen een zonderlinge blyk der Godlyke voorzienigheid is. De Struisvogel, Casoaris, enz. Schoon hier niet voortteelende, leeven in kouder gewesten, dan hunne woonplaatsen, egter zeer gezond; zommige, en veele zelv teelen hier voort, gelyk de Paauwen, Faifanten, Poulipintades, Canaries, enz., welke als inboorlingen van Europa kunnen gerekend worden.

Het voornaamste onderscheid tusschen de Vogelen en viervoetigen, dat der voortteeling; namentlyk, zal ik hier niet aanroeren als reeds menigmaalen behandelt zynde, Schoon



# V O O R R E E D E.

Schoon dus de Vogelen en viervoetige Dieren zoo aanmerkelijk onderscheiden zyn, wilde echter de Goddelyke wysheid, dat het groote tafreel der Natuur eene eenstemmigheid hebben zoude, en alle deszelvs Groepen zoude verbonden zyn, door natuurlyke, zoo wel als zedelyke overeenkomsten; dus zien wy dat 'er onder de viervoetigen en de Vogelen vleescheetende geslagten zyn, en andere die van vrugten leven. De vleescheetende Vogelen hebben gelyk de verscheurende Dieren korte ingewanden, en de blinde darm is zeer klein, in de graaneetende is de krop overeenkomstig met de pens der herkaauwende, en hebben twee blinde Darmen. En dewyl de aard en zeden veel van de levenswyze afhangen, kan men ook in dezen de Vogelen met de viervoetige Dieren vergelyken. De Arend edelmoedig en trotsch is de Leeuw, de onverzadelyke, wreede Gier is de Tyger, de buizert Raav en Kuikendief is de Wolf, de Hyaena de Chacal, de Valken, Havikken, en andere Jagtvogels zyn de Honden, Vossen, Oncas, en Lossen; de Uilen, die niet dan des nagts jacht maken, zyn de Katten, de Reigers, Vischvangers enz. zyn de Bevers en Otters, de Spechten, de Miereneeters; de Paauwen, Hoenders, Kalkoenen, zyn de herkaauwende Dieren. De Vogels schynen eene byzondere voorraad van voedsel te hebben, zy eten het geen de viervoetigen verwerpen, gekorven, tweeslachtigen, kruipende, vrugten, graanen, kruiden, zaaden, wortelen, zyn hun voedsel. Zy hebben byna geen smaak, of ten minsten een veel minder dan de viervoetigen.

En even als men vliegende viervoetigen ziet, zyn'er Vogelen, die niet vliegen kunnen, gelyk de Casoaris, Struisvogel, Walgvoegel, Thoujou, en gelyk de Zeehond, Zeekoe enz. zwemmende viervoetigen zyn, vind men zwemmende Vogelen, gelyk de zee Papegayen,

## V O O R R E E D E.

yen, de Eenden, en de geheele bende der Watervogelen.

Dus de overeenkomst, en het verschil der Vogelen kortelyk beschouwd hebbende, ga ik tot de Vogelen zelv over.

Het ligchaam word verdeelt in het Hoofd, het ligchaam, in de leeden.

Het hoofd verdeelt men in het voorhoofd, de kruin en het agterhoofd; het voorhoofd is zomtyds gekuifd gelyk in de gekuifde Vliegenvanger, of de kruin is met een kuif voorzien, gelyk in de Hop, de Platgekuifde Vliegenvanger [Tyran], de Rotschaan de Kroonvogel, de Duif van Banda, of er hangt een kuif van het agterhoofd, gelyk in de Cacatoe, zommige Reigers, de Savacou, zommige hebben een hoorn in de plaats van een kuif, gelyk de Poulepintade, de Casoar, de Steenpaauwies. Van vooren eindigt dit hoofd in een harde hoornagtige bek, die krom is in de roofvogels, na boven geboogen, in de Sneppen, Kluitkegelagtig in de graaneetende, en aan de punt breeder in de Lepelaars.

Deze bek bestaat uit twee kaakbeenderen, dezemaaken de gaaping van den bek, welke in de Zwaluwen en Geitenmelkers zoo aanmerkelyk is.

De bals is in alle Vogelen spilrond, zeer lang in den Struisvogel, Kraanen, Reigers, zeer kort in de Baardvogel; het ligchaam is in allen eirond, met een lange wat platagtige rug, de buik ronder, welke in een stuit eindigt.

De Leden zyn de vleugels en pooten. De vleugels zyn platte drieboekige ligchaamen, en bestaan uit beenderen, spieren, dekvederen en roeipennen, zommige hebben maar het begin van vleugels gelyk de Pengoins, zommige Papegaayduikers, zommige in tegendeel zyn

zeer

# V O O R R E E D E.

zeer lang, gelyk in de Zwaluwen, Fregatvogel, A-  
renden, Gieren enz. Andere hebben wel vleugelen;  
doch de kortheid der staart en de zwaarte van het lig-  
chaam belet hen te vliegen gelyk de Struisvogel, Casoa-  
ris, Walgvogel; Deze vleugels zetten de vogelen als  
wajers uit, wanneer zy zich in de lucht heffen; Hier  
was het de plaats om dat verwonderlyk toefiel van de  
vlugt der vogelen te onderzoeken, maar de ingewikkeld-  
heid der stoffe, welke niet zonder berekening, en af-  
beeldingen kan voortgesteld worden; verbiedt my  
zulks.

De eerste stuurvederen, zyn 10 in getal waar van  
1—4 de vingeren, en 5—10 de agterleeden, de  
tweede rei zyn 10—20 of 28. De pooten bestaan  
uit de Dy, de scheen de vingeren en de nagels.

De Dyen zyn bloot in de Steltloopers, in de mee-  
ste Vogelen, staan zy in het evenwigt van het ligchaam;  
doch in zommige watervogelen staan zy zoo vernaar ag-  
ter, dat het ligchaam byna loodrecht staat, in de Pen-  
goins de zee Cacatoc, en andere; zommige hebben  
gelyk de Fuit geceleurde kniebanden. De scheenen zyn  
in de meeste naakt, doch in de meeste Roofvogelen ge-  
vedert.

De Vingeren zyn gemeenlyk vier, in de meeste drie  
voor en een agtervinger, in sommige twee voor en twee  
agtervingers, in zommige Zwaluwen staan alle de vier  
vingeren naar vooren, de Struisvogel heeft maart twee  
vingers, zommige Vogelen gelyk de Korhoenders, drie,  
zonder agtervinger. Deze vingers zyn in meeste Vo-  
gelen van elkander gescheiden; doch in de watervogelen,  
door een vlies verbonden, andere hebben dezelve wel los,  
dog met een vlies omzoomdt, deze noemt men gelobde  
pooten; zommige hebben kromme scherpe nagels, ge-  
lyk de Roofvogels, in de Lecuwrikken is de agter-  
ste nagel langer dan de vinger.

## V O O R R E E D E.

*Behalven deze Vingeren hebben zommige spooren gelyk in de Haanen, Faifanten, Chineefche Paauwen.*

*De staart bestaat uit XII. stuurvederen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5. 4. 3. 2. 1. in de Hoenders zyn 18. en de Spechten 10, deze stuurvederen zyner zeer lang in de Coliou en zommige Scharlaars, Westindifche Raven, het Weeuwte van Angola enz. en maaken den staart of gelyk, of gevorkt; in zommige zyn zy zeer kort, als in de Struisvogel, Walgvogel, Cafaaris, in de Haanen staan zy regt op, en hangen vlak neer in de Poelepeintades.*

*Behalven deze deelen, welke aan alle Vogelen gemeen zyn, hebben sommige ook wapenen, de meeste hebben den bek en pooten om zich te verdedigen, gelyk in de Roofvogelen, de behoornde Poelepeintade verweert zich met den hoornagtigen uitwas, welke zy op het hoofd heeft. De Phaifanten, Paauwen en Berkhoenderen, met hunne spooren; de Struisvogelen, bruine Chirurgyens, gedoornde Plevieren hebben scherpe doornen aan de vleugelen.*

*De meeste Vogelen houden zich by een Wyfje, doch zommige, gelyk de Hoenders, Eenden, Muffchen hebben 'er verscheiden. De nesten welke zy ter uitbroeding van de jongen maaken, zyn van verschillende Aart en stoffe. Zommige hangen aan takken van boomen, gelyk die der Bananasvogel, Geelvogel, zommige nesten dryven, gelyk die van zommige Ysvogelen, zommige bestaan uit takken, andere uit Kley enz. In deze broeyen zy hunne eyeren, welke verschillen in grootte, gedaante, couleur en getal, die van de Struisvogels zyn groot, eyrond, geelachtig, en maar een te gelyk, de Uilen leggen bolronde eyeren twee of drie te gelyk, de Zeepapegayen twee, de Meeuw drie, de Zwaluw van vyf tot agt, doch de Eenden, en Hoenders meer.*

*Het*

## V O O R R E E D E.

Het zoude hier de plaats zyn om van de broeding het maakzel van het Ei, en de vorming van het kuiken te spreken; maar dewyl dit my te ver heenen zoude leiden: wyze ik den lezer na die schoone Verhandeling van den Heer HALLER over de Vorming van het Kuiken in het Ey, door die geleerden ontleedkundigen in het Fransch beschreeven.

Zommige Vogels blyven in hunne geboorteplaats, andere vertrekken jaarlyks naar andere gewesten. Dus ziet men dat alle de dunbekkige Vogelen van het musschen zoort, zoodra de gekorvenen, die hen tot spyze dienen ophouden, naar warmer gewesten vertrekken, en de Steltloopers insgelyks, door dien het ys hen verbiedt de Kikvorsschen Haagdischen enz. uit het water te haalen.

— Onder deze Trekvogelen bevinden zich de Zwaluwen, de Heer ADANSON, zag gelyk ik te vooren meldde, de Zwaluwen den 9 October in Senegal aankomen; de Heer KLEIN, en andere Natuurkenners, zeggen, dat zy gezien hebben, dat de Zwaluwen zich des winters onder water onthouden, en in een warm kagchel vertrek gebracht, allengskens weder beginnen te berleeven. Dit schynen twee getuigenissen, die vlak tegen elkander stryden; doch de Heer de BUFFON lost dit op, door te stellen; doch onze huis Zwaluwen Trekvogelen zyn, en dat de Zwaluwen, welk de Heer KLEIN en andere, in het water by kluwens aan elkander hangende vonden, eene andere soort is (d).

De spyzen der Vogelen zyn ook zeer verschillende zommige eeten vleesch gelyk de Arenden, Valken, Gieren, Uilen zommigen visch, gelyk de Eenden, en Ysvogelen en zommige Steltloopers, andere gekorven gelyk de dunbekkige Musschen, Vinken, andere rupzen, gelyk de Spechten, zommige Viinders gelyk

(d) BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* pag. XVI. der Voorrede ed. in groot 4to.

# V O O R R E E D E.

lyk de Koekkoek andere Horzels, gelyk de Ossenpikers, de Strandlooper eet schulpdieren, de Krabben-eeter heeft Krabben tot zyne spys.

Andere voeden zich uit de gewassen, gelyk de graan eetende Vogelen.

Deze benden die zeer talryk is, is door verscheiden rangschickers op verschillende wyze verdeelt. De voornaamste dezzer zyn de Heeren KLEIN, MOEHRING, BRISSON, LINNAEUS, en BRUNNICHE.

De Heer KLEIN gaf in het jaar 1750 zyne Prodrumus avium in het licht, welk te Lubeck in 4to met acht koperen platen gedrukt wierd, en verdeelt dezelve in VIII. rangen.

De I. Rang, behelst de Vogelen met twee vingeren, zonder agtervinger, de Struisvogel.

De II. Rang behelst Vogelen met drie Vingeren, zonder agtervinger. Deze hebben den bek hoog en dun (b) of gekield, met eene kromme punt, of (c) regt, of (d) eene groote kop en korte bals, of (e) een lange regte bek, van binnen gegroefd, of (f) een bek, die aan haar agterend tanden heeft. Dus zes geslagten.

De III. Rang. met vier vingeren, twee voor en twee agtervingeren, eu deze hebben, of (a) een dikke haaksgewyze bek, of (b) eene rechte, hoekige, wigsgewyze, of (c) een elsgewyze of (d) onregelmaatige voeten, of (e) eene zeer korte bek en sterk gepluimde kop, (f) een zeer dunne holle bek.

De IV. Rang, met drie voor en een agtervinger, de bek (a) hoeksgewyze, (b) mesgewyze krom, en aan haar begin hairig (c) de staart lang en de vugels kort, (d) een platte bek (e). De bek stompachtig, het onderkaakbeen regt, het  
boven-

# V O O R R E E D E.

bovenste langer en krom, (f) de bek dun, de agter nagel zeer lang (g), de bek als vooren, doch de nagels alle even groot, (h) de bek kort, aan haar begin breed, en zamengedrukt, (i) een korte hoekige snydende bek (k). Een kegelagtige bek (l), een regte rolronde lange bek (m). Een kegelagtige smalle bek (n) een sterke zaamengedrukte bek (o), een regte bek de kaakbeenderen gelyk (p); een zeisgewyze bek (q) een korte sterke kromme bek (r) een bek als vooren, doch de pooten kort en de vleugelen lang (s), een korte bek, de middelste vinger niet gekarteld (t), een regte bek (u). een verlengde elsgewyze bek.

De V. Rang, vier vingerige pooten, de agterste vinger enkel, de drie voorste door een vlies verbonden, (a) een breede bek (b) de bek kegelagtig, fcherp of ftomp

De VI. Rang, vier vingeren alles met een vlies verbonden (a) het opperkaakbeen breed en plat, het onderfte naar boven verwulfdt.

De VII. Rang, drie gevleesde vingeren, geen agtervinger, (a) het ligchaam eirond.

De VIII. Rang, vier gewehde vingeren (a) de bek recht.

De Heer MOEHRING, gaf in het jaar 1752 zyn werk *Avium Genera* genaemdt in het licht, het geen te Breemen in 8vo gedrukt is, en naderhand door den Heer NOZEMAN, eender geleerdste Vogelkenners van ons Vaderland vertaaldt, en door den kundigen Heer VOSMAER met aanmerkingen verrykt is; de Heer MOEHRING onderscheidt de Vogelen in.

I. Vlies-

## V O O R R E E D E.

- I. Vliespooten, deze hebben in den eersten rang de Exters in de tweede de Muffichen.
- II. Velpooten, deze bevattende Roofvogelen en Hoenderen.
- III. Kortvlerken.
- IV. De Watervogelen; deze bevat vyf rangen, de tandbekken, de platbekken, de Engbekken, de Duikers en Snippen.

In het jaar 1760 en vervolgenos gaf de Heer BRISSON zyn groot Vogel werk uit, bestaande in VI. Deelen in 4to met 261 Afbeeldingen, in welke vyf hondert en zestig Vogelen afgebeeldt zyn, in welke er vier hondert gevonden worden, welke nooit te vooren afgebeeldt waaren.

De Heer BRISSON verdeelt de Vogelen in twee benden, I. met gespleeten, II. met gevliesde Vingeren. — Deze twee benden bevatten zes en twing rangen.

- I. Die drie voor, en een agtervinger hebben, het het bovenkaakbeen aan den punt dik, en wat krom, de neusgaaten half met een vlies gedekt, de Duiven.
- II. De bek kegelachtig krom.
- III. De bek kort en krom.
- IV. De bek eene verlengdde kegel (a), met de vederen van den kop naar voor, de Raav enz. (b) met die vederen naar agter, de Geelvogel Paradysvogel.
- V. De bek recht, aan wederzyden uitgerandt, de de Klauwier.
- VI. De bek recht, de kaakbeenderen niet uitgerand, de Ossenpikker, en Spreeuw.

VII.



# V O O R R E E D E.

- VII. De bek *dun*, *wat geboogen*, de Hop.
- VIII. De bek *zeer klein*, *aan haar begin plat*, *aan de punt krom*, de *guaping zeer groot*, de *Zwaluw*, Geitenmelker.
- IX. De bek *een verlengdde kegel* (a), *beide kaakbeenderen recht*, de *Moffchen*, *Knueiën* (b), *het bovenkaak krom*, de *Roodborstjes* (c), *beide elkander kruiffende*, de *Kruisvink*.
- X. De bek *elsgewyze* (a) *met bloote neusgaaten*, de *Leeuwrik*, *Vygeneeter*, enz. (b) *de neusgaaten gedekt*. De *Meezen*.
- XI. De bek *wigsgewyze*, de *Graauwſpecht*.
- XII. De bek *draadsgewyze* (a) *krom*, in de *Boomkruipertjes*, (b) *regt* in de *Bloemzuigers*.
- XIII. *Twee voor en twee agter vingeren*, (a) *de bek lang en regt*; *met eene lange tong* de *Draayhals*, *Specht*, (b) *de bek matig boogsgewyze en aan de zyden zaamengedrukt*, de *Koekkoek en Baerdvogel*. (d) *De bek lang, zoo breed als het hoofd*, en *gekarteld*. De *Toucan*.
- XVI. *Drie voor en eene agtervinger*, (a) *eene korte aan de punt zaamengedrukte bek*, de *Rotsbaen*, *Manakin*, (b) *een kegelachtige gekartelde bek*, de *Momot*, (c) *de bek lang en recht*, in de *Ysvogel*, (d) *de bek krom en ſcherp*, in de *Byeneeter*, (e) *de bek dik en zeiffen gewyze*.
- XV. *Kleine vleugels, waar mede zy niet vliegen konnen*, (a) *met twee vingeren*, de *Struisvogel*, (b) *drie en geen agtervinger* de *Cafoar*, *Thoujou*, (c) *vier vingers drie voor en een agtervinger*.
- XVI. *Geen agter vinger en groote vleugels*. (a) *De bek als een kromme kegel*, in de *Trapgans*.  
(b)

## V O O R R E E D E.

(b) *Een zeer rechte lange bek, die aan de punt dikker is, de Krabbeneeter.* (c) *De bek korter, regt, en aan de punt dikker, de Plevier.*

- XVII. *Drie voor- en eene agtervinger, de vleugeks bekwaam tot vliegen.* (a) *Met een rechte bek aan de punt dikker, de Kievit.* (b) *De bek byna recht, wat naar boven geboogen, de Strandruiter.* (c) *Van boven rond aan de punt zamengedrukt, het Waterhoentje,* (d) *bek zamengedrukt, als ook het ligchaam; de Ral* (e) *de bek dun, het Kemphaantje, de Snep,* (f) *de bek naar beneden geboogen; de Ibis,* (g) *de bek regt plat en van vooren breed; de Lepelaer,* (h) *de bek dik en lang, de Reigers,* (i) *de bek dik en kort lepelsgewyze; (l) de bek kort en regt, de Kroonvogel; (m) de bek kegelachtig krom, de Kamchy* (n) *zylings zamengedrukt, het voorhoofd kaal, de Porphyrio.*
- XVIII. *Drie voor- en een agter vinger, alle gewebd, of met een vlies omgeeven.* (a) *Met enkele vliezen de Waterhoenderen.* (b) *Met uitgesneden vliezen, de Koeten.*
- XIX. *De vingers half gevlied, de pooten buiten het evenwigt, de Duikers.*
- XX. *De pooten geheel gevlied, zonder achtervinger buiten het evenwicht, (a) de bek recht en scherp, de Zaagbek, (b) dwarsch gestreept, de Groenlandsche Papegaay, en Zee Papegay.*
- XXI. *Drie gevliesde voorvingers en een agter vinger (a) de bek regt, met eene kromme punt. De Pengoin.*

XXII.

## V O O R R E E D E.

- XXII. Drie voorvingeren met geheele vliezen verbonden, geen agtervinger, de pooten in het evenwicht, en korter dan het ligchaam, gelyk de Albatros.
- XXIII. Vier vingers, waar van de drie eerste gevlied met geheele vliezen, de agterste los, de pooten in het evenwigt, korter dan ligchaam, de bek niet gekarteld (a) de punt haaksgewyze, de Onweersvogel, Meeuw, (b) de bekrecht, aan de zyden plat de Stern en Watersnyder.
- XXIV. Viervingeren, de drie voorste met geheele vliezen, de agterste los, de pooten in het evenwigt, korter dan het lichaam, de bek getand, (a) bek rolrondachtig de punt van het opperkaakbeen haaksgewyze, gelyk de Duiker (b) de bek van boven verheven van onder platachtig, de Eend, Gans.
- XXV. Viervingeren, met geheele vliezen verbonden, de pooten in het evengewicht, korter dan het ligchaam (a) met een scherpe bek den langstaart (b), de punt van den bek krom, enz.
- XXVI. Viervingeren, de drie voorste met geheele vliezen, de agterste los, de beenen in evenwicht, langer dan het ligchaam (a), de bek getand, de Flamingo (b) de bek zonder tanden, de Kluit.

De Heer LINNAEUS verdeeld in zyne laatste uitgave van het zamenstel der Natuur de vogelen in zes benden, welke ik hier niet zal aanhalen, als het onderwerp van dit stukje uitmakende.

De Heer BRUNNICHE in zyn *Elementa Zoologica* behoud dezelve benden als de Ridder LINNAEUS; doch verschilt zeer veel in de schikking der geslagten.

Edoch dewyl de beschryvingen, nooit zulke volmaakte denkbeelden der zaken geven konnen, dan uitvoerige afbeeldingen hebben, de Natuurkenners zich toegelegd, om naauwkeurige afbeeldingen van de Vogelen te geven.

Iste. Deel II. Stuk.

\*\*

On-

## V O O R R E E D E.

Onder deeze munten die van de Heeren EDWARDS, CATESBY, BRISSON, D'AUBERTON, FRISCH en PENNANT uit.

Het werk van den Heer ELEAZAR ALBIN, zag eerst in het jaar 1740 het licht, in drie deelen in 4to, maar de onnatuueelyke coloreering derzelve doet het in de oogden der Natuurkenneren minder agten.

De Heer EDWARDS begon in het jaar 1740 zyne History Natural of birds uittegeven, met schoone naar het leven gecoleurde afbeeldingen. Dit werk in vier deelen in 4to bestaande, werd eenige jaaren daar na van zyne gleanings of natural History gevolgt, in drie deelen, welke te zamen behalven de viervoetigen, en insecten 315 soorten van vogelen vertoonen.

De Heer BRISSON gaf naderhand zyne Ornithologia, of vogelkunde, met verscheide nooit te vooren uitgegeven afbeeldingen van vogelen; doch zonder coleuren; eindelyk de Heeren BUFFON en D'AUBERTON dat schoone werk de algemeene en byzondere natuurlyke Historie, schryvende, gaf de jonge Heer D'AUBERTON, onder het opzicht van den Heer BUFFON de afbeeldingen der vogelen, met coleuren uit en kleinfolio, om tot de natuurlyke historie der vogelen van den laatste genoemden Heer te dienen, waarvan reeds twee deelen in het licht zyn, deze verzameling bevat reeds zes honderd bladen, waarin meer dan acht honderd vogelen afgebeeld zyn, de Heer CATESBY had reeds de Americaansche Vogelen, in zyne natural history of Carolina uitgegeven met schoone afbeeldingen; dit werk zoo ver de Vogelen aangaat, is naderhand met dat van den Heer EDWARDS, in de Neurenburgsche verzameling gebragt en door de Heer SELIGMAN in V. deelen infolio uitgegeven in het Hoogduitsch, en word thans in het Hollandsch vertaald, door den Heer Sepp, boekverkoper te Amsterdam onzen landgenooten medegedeeld; alle deze werken heeft de Heer LINNAEUS zyn zamenstel van Vogelkunde opgemaakt; doch het werk van den Heer  
D'AU-

## V O O R R E E D E.

D'AUBENTON *fcheen zyn Ed. doe noch niet gezien te hebben*

*Ik heb in dit kort begrip, niet alleen alle de vogelen, welke in de gemelde verzameling zyn, 'er by gevoegd, als ook die welke de kundige Heer VOSMAER in zyne beschryving van vreemde Dieren gegeven heeft, en die ik in de verzamelingen der liefhebberen hebbe gevonden; en dus twee honderd vogelen meer dan de Heer LINNAEUS aangetekend; maar ik heb ook alle de aambalingen van dezelve Heer met de schryvers zelfs vergeleken, hier door zullen myne omschryvingen dikwerf eenigzints met de Latynsche uitgaaf verschillen, het geen ik nodig acht den lezer vooraf te berichten; ondertusschen is het verre van myn oogmerk, het werk van den Heer Houttuyn te willen onderkruipen, ik geef dit werk slechts als een handboek voor yder bende van Dieren, om het in het maken van verzamelingen te kunnen gebruiken, al het overige van het gezegde van den Heer Houttuyn zoude ik kunnen wederleggen; maar zal alleen kortelyk ter myner verdediging aanmerken, vooreerst, dat ik het werk zelf niet gecorrigeerd heb, als onder het drukken niet in de stad geweest zynde.*

*Ten tweeden op het berigt van zyn ontfangen briefje, wyze ik zyn Ed. na de Philosophia botanica van LINN. p. 278 n. 336 genere convenientes easdem possident vires.*

*Laurus cinnamomum, malabathrum, Cassia, Camphora, Sassafras.*

*En pag. 285 zegt LINNAEUS Aromaticæ odore & gustus fere conveniunt.*

*Cinnamomum; Laurus, Sassafras, Camphora, macis Cardamomum Caryophyllus &c.*

*En pag. 282 Lactescentes plantæ communiter venenatæ, minus autem semiflosculosæ.*

*En pag. 283 Lactescentes vix venenatæ sunt ut prenanthes Chondrilla . . . . . Lactuca. Het zy men hier de Lactuca voor Endivie of Latuw neeme.*

*Om rent zyn Ed: mineralogische Aanmerkingen zal*

## V O O R R E E D E.

ik alleen zeggen, dat de Heer Houttuin een greote dienst aan alle de liefhebbers der Scheikunde, en Mineralogie zal doen, met te bepaalen, wat eigentlyk de kalkis, en of zy tot het Dieren, of Delfbaar ryk behoort, dat is of zy eene Dierlyke of Delfstof zy?

Ik heb dit alleen ter myner verdediging willen stellen, al het verdere in Ed. Voorrede laat ik aan zyn plaats, en zal het zelve met stilzwygen voorbygaan; en om alle onvriendelykheid van myne zyde te myden, gelieve de lezer, bl. 284 de woorden van by gebrek van na te zien, uit te doen.


Onder de door my vermeerderde vogels, zyn er waar-schynelyk, verscheidenheden van kunne, of plumaadje voor byzondere soorten te boek gesteld, maar dit zal ligtelyk verschooning vinden, wanneer men nagaat, vooreerst hoe veel het mannetje van het wyfje in veelen verschild, hoe zeer de vogelen verandereu in het ruyen, en hoe weinig wy weten van de huishouding der uitlandscbe vogelen.

De volgende bende der dieren van beiderley leven by de liefhebbers der Dierkunde; in grooter getal gevonden wordende, zullen hun Ed. my verpligten indien zy my eenige nieuwe soorten konnen aan de hand geven; de verzamelingen van de Heeren Burmannus, van der Meulen, en de Heer Juliaans alhier, nevens myne eigen, hebben my reeds een goeden voorraad verschaft, van welke ik een dankbaar gebruik hoop te maken.

Verder laat ik dit werk ter beoordeeling van ieder kundig liefhebber der natuurlyke historie; overtuigd, dat dwalen menschelyk is; en het toneel der geschaapen wezens zoo uitgebreid, dat het de palen van het menschelyk begrip en kennis verder te boven gaat, vinden myne geringe pogingen indezen eenige goodkeurig, zal ik met lust, dit werk, in myne ledige uuren voortzetten; en geen moeite aan het zelve sparen.

P. BODDAERT.

II. BEN.



I I . B E N D E .

V O G E L E N .

I. ROOFVOGELEN,

DE BEK KROM AAN WEDERZYDEN  
MET EEN HOEK UITSTEEKENDE.



XLI. GIER. De *bek* recht, met eene omgekromde punt.

Het *Hoofd* kaal, van vooren met eene naakte huid.

De *tong* gespleeten.

Condoor  
(*Gryphus.*)

I. **G**IER, met een knobel op den kruin, zoo lang als het hoofd, de keel naakt. *Condor*, BUFF. *Hist.*

*Iste. Deel. IIde. Stuk. H*

*Nat.*

*Nat. des Ois.* tom. I. pag. 143.  
Woond in Chili, Peru, Vrankryk, (BUFFON.)

Harpey 2. GIER, met een gedekt hoofd, dat  
(*Harpyja.*) met lange vederen gekuifd is.  
NB. Deze behoord tot de Arenden.  
Woond in Mexico, Brasil.

Koning van 3. GIER, met kwabbige neusgaten,  
de wouwen. naakte kruin en hals \*. EDW.  
(*Papa.*) *Hist. of Birds.* II. tab. 4.  
BRISS. *Ornith.* I. p. 470. tab. 36. BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* I. (tab. 428. *color.*) tab. 6.  
Woond in America.

Zwarte 4. GIER, met een bultig hoofd, en  
(*Monachus.*) zwart ligchaam. EDW. 290.  
Woond in Arabien.

Menschen- 5. GIER, die boven gryns is, met zwarte  
eeter te slagpennen, en eenen witten bek. CATESB. *Carol.* I. tab. 6. BUFF. *Ois.* p. 137. tab. col. 187.  
(*Aura*) Woond in America.

Baard



Baard Gier 6. GIER, die witagtig is, met eenen  
 (*Barbatus.*) bruinen rug, eene gebaardde  
 keel, rooden bek, en eene  
 zwarte streep op het hoofd.  
 EDW. *Birds.* 106.  
 Woond in Africa.

Percnopte- 7. GIER, met zwarte flagpennen, die  
 rus aan den buiten rand grys zyn,  
 (*Arendgier.*) behalven de buitenste. BUFF.  
*Hist. Nat.* tab. 426.  
 Woond in Zuid Europa.

Zwarte GierA. GIER, die bruin is, met eenen wit-  
 ten halsband, en geele poo-  
 ten. BUFF. *Ois.* tab. 425.

Witstaart 8. GIER, met een geelwas, en gee-  
 (*Albicilla.*) le pooten, witte hairvede-  
 ren, met zwarte puntjes.  
 Woond in Europa.

XLII. V A L K. Een kromme bek, aan het hoofd  
 (FALCO.) met was voorzien.  
 Het *Hoofd* dicht gepluimd.  
 De *Tong* gespleeten.  
 a. met geel was.  
 H 2 VALK,

Gekroonde 1. VALK, met roestcoleurig was,  
 (*Coronatus.*) gepluimde pooten, die wit  
 en zwart gestipt zyn, de zy-  
 den met zwart gestreept.  
*Gekroonde Arend.* EDW.  
*Birds.* III. p. 31. tab. 224.

Zwarte 2. VALK, met geel was, half ge-  
 Arend pluimde voeten, zwartagtig  
 (*Melanætus.*) roeste couleurig ligchaam, met  
 geele streepen \*. *Aigle Com-*  
*mun.* BUFF. *Hist. Nat.* tom.  
 I. pag. 68. tab. 409.  
 Woond in Europa.

Witkop 3. VALK, met geel was, half ge-  
 (*Leucocephalus.*) pluimde voeten, een bruin  
 (*lus.*) ligchaam, met een wit hoofd  
 en staart. *Pygargue,* BUFF.  
*Ois.* I. p. 78. tab. 411.  
 Woond in America in Eu-  
 ropa.

Zee Arend 4. VALK, met geel was, half ge-  
 (*Osifraga.*) pluimde voeten, roestco-  
 leurig ligchaam, de staart  
 vederen van binnen wit \*.

Or-

*Orfraye*, BUFF. *Ois.* tom.  
I. p. 88. tab. 112. 415.  
Woond in in Europa.

Groote 5. VALK, met geel was, roestagtig  
Arend. geele pooten, roest coleurig  
(*Chrysaetos.*) bruin ligchaam, eenen zwart-  
ten staart, die aan haar begin  
gegolfd is \*. *Grand Aigle*,  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. tab,  
410.  
Woond in Europa.

Gemeene 6. VALK, met geel was, gepluim-  
Arend de roestbruine pooten, een  
(*Fulvus.*) bruinen rug, een witten band  
over den staart. EDW. *Birds*  
I. tab. 1. *Aigle Commun.*  
BUFF. *Hist Nat.* tab. 419.  
Woond in Europa.

Boeren 7. VALK, met geel was, en poo-  
Arend ten, asgraauw ligchaam, met  
(*Rusticolus.*) wit gegolfd, en eenen witten  
halsband.  
Woond in Zweeden.

Tunetaan- 8. VALK, met geel was en poo-  
 sche ten, een blaauwagtig lig-  
 (*Barbarus.*) chaam, dat met bruyn gevlacht  
 is, een effen borst en geban-  
 deerden staart.  
 Woond in Barbaryen.

Blaauwagti- 9. VALK, met geel was, winkbraau-  
 ge wen, pooten en buik, de  
 (*Coerulefcens.*) wangen in eenen witten om-  
 trek. EDW. *Birds.* 108. tab.  
 108.  
 Woond in Afien.

St. Martins' 10. VALK, met wit was, rosfe  
 Vogel pooten, grys blaauw lig-  
 (*Cyaneus.*) chaam, een boog over de  
 winkbraauwen, die na de  
 keel loopt. *The blue Hawke.*  
 EDW. *Glean.* I. pag. 33. tab.  
 215. *Oiseau Sint Martin.*  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p.  
 165. tab. 459.

Steenvalk 11. VALK, met geel was en poo-  
 (*Pygargus.*) ten, een aschgrauw lig-  
 chaam, de buik bleek, met  
 rosfe

rosse in de lengte loopende  
streepen, de oogkring wit.  
*Rochier*, BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* I. pag. 227. tab. 447.  
Woond in Europa,

NB. De door LINNAEUS aangehaalde  
plaats van EDWARDS, komt hier  
in het geheel niet te pas.

Wouw  
(*Milvus.*)

12. VALK, met geel was, een ge-  
spleeten staart, roest coleu-  
rig ligchaam, en witte kop\*.  
*Milan*, BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
I. p. 154. tab. 422.

[b. zwarte wouw met een  
geelen staart. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* I. p. 139. tab.  
472.

Woond in Europa.

Valk  
(*Gentilis.*)

13. VALK, met geel was en poo-  
ten, het ligchaam afchgrauw  
met bruine vlakken, de staart  
met vier zwartagtige ban-  
den\*. *Faucon*, *Hist. Nat.*  
tom. I. p. 197. tab. 470. 421.  
Woond in Europa.

Boomvalk 14. VALK, met geel was en pooten, een bruinen rug, witten hals, bleeken buik, met lange bruine streepen \*. *Soubuse*, BUFFON. *Hist. des Ois.* I. tab. 443.  
Woond in Europa.

Buiferd. 13. VALK, met geel was, bruin lichaam, bleeken buik, met bruine vlakken. *Buse*, BUFF. *Hist. Nat.* tom. I. pag. 161. tab. 419.  
Woond in Europa.

Steenfmet. 16. VALK, met geel was, een rood  
zer geelen rug, met zwart gestipt,  
(*Tinunculus.*) de borst met bruine streepen,  
de staart rond. *Cresserelle*,  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p.  
224. tab. 401. 471.  
Woond in Europa.

Blaaskop 17. VALK, met geel was en pooten, een bruinagtig wit lichaam,  
(*Sufflator.*)

chaam, en beenagtige oogdekken.

Woond in Suriname.

Spotter 18. VALK, met geel was en pootten, witte wenkbrauwen, bruin ligchaam, dat met wit gevlakt is, eene zwartering om den witten kruyn.  
(*Cachinnans.*)  
Woond in Zuid America.

Van Hud- 19. VALK, met geel was en pootten, een bruinen rug, witte winkbrauwen, een blauwen band op de vleugels. EDW. *Birds.* tom. 3. tab. 107. pag. 107.  
fons baay  
(*Hudsonis.*)  
Woond in Hudfons baay,

Americaan- 20. VALK, met geel was, een bruin rooden kop, en buik, blaauwagtige vleugels. CATESB. *Carol.* I. tab. 5. *Aesalon*, BRISS. *Ornith.* I. p. 386. tab. 32. fig. 1.  
sche Sperwer  
(*Sparverius.*)

Duiven ee- 21. VALK, met geel was en pootten,  
H 5

ter  
(*Columbarius*.)

ten, een bruin lichaam, dat van onder bleek is, een bruynen staart, met vier witte banden. CATESB. I, pag. 3. tab. 3.  
Woond in America.

Gestreepte 22. VALK, met geel was, pooten en  
(*Supercilio-*  
*fus*.)

winkbraauwen, een bruyen ligchaam met bleek gewolkt, de slagpennen roest coleurig met zwart gebandeerd.  
Woond in Suriname.

Kobez 23. VALK, met geel was, pooten  
(*Vespertinus*.)

en winkbraauwen, de stuyt en dyen roestcoleurig, [het ligchaam bruyen blaauw, de buik witagtig blaauw.]  
Woond in Ingrien.

Zwemmer 24. VALK, met geel was, de pooten en bek blaauw, het ligchaam van onder met lange zwarte vlakken. Lanier, BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p. 192.  
Woond in Europa.

VALK,



Vorkftaart. 25. VALK, met donker was, en gele pooten, het ligchaam van boven bruyn, van onder witagtig, eenen zeer langen gevorkten ftiaart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* I. p. 174. CATESB. *Carol.* I. tab. 1.  
Woond in America.

Vifcharend 26. VALK, met blaauw was, en pooten, het ligchaam van boven bruin, van onder wit, de kop witagtig. *Balbufard.* BUFF. *Hift. Nat. Ois.* tom. I. pag. 81. tab. 414.  
Woond in Europa.

Giervalk 27. VALK, met blaauw was, een bruyn (gevlakt) ligchaam van onder met afchgraauwe ftreepen, de zyden der ftiaart wit. *Gerfaut.* BUFF. *Hift. Nat. Ois.* I. tab. 210, 462, 446.  
Woond in Europa.

Wespen bui-28. VALK, met zwart was, half gepluim-

- zerd  
 (*Apivoras.*)
- pluimde geele pooten, eenen  
 afchgrauwen kop, en band  
 op den staart, die aan de  
 punt wit is. *Bondrée, BUFF.*  
*Hift. Nat. Ois. I. pag. 163,*  
*tab. 420*  
 Woond in Europa.
- Elzen Bui- 29. VALK, met groen was, het lig-  
 zerd  
 (*Aerugino-*  
*sus*)
- chaam roestverwig, de kruin,  
 de keel, en de schouders  
 bleek \*. *Busard, BUFF. Hift.*  
*Nat. Ois. I. tom. I. p. 172.*  
*tab. 424.*  
 Woond in Europa.
- Havik 30. VALK, met zwart was, en gee-  
 (*Palumba-*  
*rius.*)
- le pooten, het ligchaam  
 bruyn, de stuurvederen met  
 bleeke banden, de wenk-  
 braauwen wit. *Autour, BUFF.*  
*Hift. Nat. Ois. tom. I. p.*  
*182. tab. 461. 418.*  
 Woond in Europa.
- Sperwer. 31. VALK, met groen was, en gee-  
 (*Nifus.*)
- le pooten, een witten met  
 grys

grys gegolfden buik, den  
staart met zwarte banden.

*Epervier*, BUFF. *Hist. Nat.*

*Ois* I. pag. 178. tab. 466.

467. 412.

Woond in Europa.

Kleine 32. VALK, met bruin was, en gee-  
le pooten, het ligchaam van  
onder wit, de ftuurpennen  
bruin met zwart gebandeerd;

*Emerillon*. BUFF. *Hist. Nat.*

*Ois*. I. pag. 228. tab. 462.

*Briſſ. Ornith.* I. pag. 315.

tab. 30. fig. 1.

Woond in Europa.

XLIII. U I L. De *bek* krom zonder waſch.

(STRIX.) De *neusgaten* met nederleggen-  
de vederen gedekt.

Het *Hoofd* groot, met groote  
ooren, en oogen.

a. gehoornde Uilen.

Schuifuit 1. U I L, met een ros ligchaam\*. *Grand*

(*Bubo*.) *Duc*, BUFF. *Hist. Nat. Ois*:

I.

I. tom. I. pag. 435.

b. EDW. *Glean.* I. tab.

227.

Woond in Europa.

Noordsche 2. UIL, met hoorens, en een witagtig ligchaam.  
(*Scandica*);

Woond in Lapland.

Americaan- 3. UIL, met hoorens, het ligchaam  
fche van boven roestverwig van  
onder afchgrauw, de vleu-  
gels met vyf witte stippen.

CATESB. *Carol.* I. pag. 7.  
tab. 7.

Woond in America.

KleineSchui- 4. UIL, met zes oorvederen\*. Mo-  
fuit *yen Duc*, BUFFON, *Hist.*  
(*Otus.*) *Nat. Ois.* I. pag. 272. tab.

29.

Woond in Europa.

Tartarische (A)UIL, met ooren, een afchgrauw  
ligchaam, dat met bruin ge-  
golfdis, van onder witagtig,  
de schouders zwart. PALL.

*Reiz.*

*Reiz.* tom. I. pag. 456.  
Woond aan de Wolga en Sa-  
mara.

Rans Uil 6. UIL, met ooren van eene veder.  
(*Scops.*) *Petit Duc*, BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* tom. I. pag. 281. tab.  
436.  
b Zonder hoorens.

Witte 6, UIL, met eenen gladden kop, wit-  
(*Nyctea.*) agtig ligchaam, met van el-  
kander staande maansgewy-  
se bruine vlakken. EDW.  
*Birds* II. tab. 61. *Harfang*,  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. pag.  
308. tab. 458.  
Woond in Noorwegen.

GrooteNagt 7. UIL, met een ongehoornd hoofd,  
Uil roest coleurig lichaam, zwar-  
(*Aluco.*) te oogkringen, de voorste  
voorpennen gekarteld. *Hu-*  
*lotte*, BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
I. pag. 285. tab. 441.  
Woond in Europa.

UIL,

Kerk Uil 8. UIL, zonder hoornen, met geele oogen, een geel ligchaam, met witte stipjes, van onder witagtig, met zwarte stipjes \*. *Effraye*, BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom. I. pag. 291. tab. 440.

Woond in Europa.

Kras Uil, 9. UIL, zonder hoornen, met blauwe oogen, een roeft coleurig licghaam, de derde ftuurpen langer \*. *Chatbuant*, BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* I. pag. 281. tab. 437.

Woond in Europa.

Steen Uil, 10. UIL, zonder hoornen, het ligchaam van boven bruin, met wit gevlaakt, de ftart met witte banden. *Chouette* BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* tom. I. pag. 296. tab. 438.

Woond in Europa.

Caparochi (B) UIL, zonder hoornen, die van boven bruin is, met witte stippen, den,

de buik wit met bruine banden, de wangen wit met zwart geboord. *Sparrow Hawk*. EDW. *Birds*. II. tab. 62. BUFF. *Hist. Nat. des Ois*. I. p. 306.  
Woond in Europa.

Rosse van Cayenne (C)UIL, zonder hoornen, met een rosgeele bek, het geheele lichaam geelagtig ros, met zwarte golfjes, *Chatuant de Cayenne*. BUFF. *Hist. Nat. Ois*. I. pag. 311. tab. 442.  
Woond in Cayenne.

Lyk Uil (Funerea.) II. UIL, zonder hoornen, met een bruin ligchaam, en geele oogen. BUFF. *Hist. Nat. des Ois*. I. pag. 296. BRISS. *Ornith*. I. pag. 518. tab. 37. f. 2.  
Woond in Europa en America.

Havik Uil (D)UIL, zonder hoornen, eene kleine zwarte vlak agter de oogen, een geelagtig ligchaam,

dat van onder bleeker is.  
 PALL. *Reiz.* I. pag 455.  
 Woondaan de Kaspische Zee.

Langstaart (E)UIL, zonder hoornen, met zwarte oogkringen, roeft coleurig ligchaam, van onder wit met zwarte streepjes, een zeer lange staart. PALL. *Reiz.* I. p. 455.

b. bruine met witte vlakken, en een zeer lange staart, en geele oogkringen. BUFFON, *Hist. Nat. Ois.* I. tab. 463.

Woond in Siberien.

Van St. Do-(F)UIL, zonder hoornen, met eene mingo  
 groote bek roeft coleurige vlakt ligchaam, de borst weinig, en de buik niet gevlakt. *Chouette de St. Domingue.* BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* I. tom. I. pag. 313.

Woond in St. Domingo.

Kat Uiltje 12. UIL, zonder, hoornen de slagpen-  
 nen



(*Pasferina.*)

nen met vyf reyen witte vlakken. *The little owl.* EDW. *Glean.* I. tab. 228. *Cheveche.* BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p. 300. tab. 439.

Woond in Europa, doch is zeer zeldzaam.

XLIV. KLAUWIER. De *Bek* regt van boven

(LANIUS.)

verheven rond, van onder zoo dik als hoog, het opperkaakbeen aan de punt uitgerand, de punt krom.

Vorkstaart. I. KLAUWIER, met eene gevorkte  
(*Forficatus.*)

staart, eene opstaande kuif, het ligchaam groenagtig zwart. *Gobemouche* Hupé. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 189. BRIS S. *Ornith.* tom. II. pag. 388. tab. 37. fig. 4.

NB. Deze is een vliegevangter. Woond in Madagascar.

Fingah. 2. KLAUWIER, met een gevorkte  
 (*Cærulefcens.*) staart, het ligchaam blaauw  
 agtig zwart, en de buik wit.  
 BUFF. *Hift. Nat. des Ois.* I.  
 pag. 244. EDW. *Birds.* II.  
 pag. 56. tab. 56.  
 Woond in Bengalen.

Gekuifde 3. KLAUWIER, met een wigsgewyze  
 (*Cristatus.*) staart, het hoofd gekuifd,  
 het ligchaam rosachtig van  
 onder geelros, met bruinge-  
 golfd. EDW. *Birds.* II. 54.  
 pag. 54.  
 Woond in Bengale.

Van Canada 4. KLAUWIER, met eene wigsgewyze  
 (*Canadensis.*) staart een gekuifd hoofd, een  
 ros ligchaam, dat van onder  
 wit is. BUFF. *Hift. Nat. des*  
*Ois.* I. pag. 250. tab. 475. f. 2.

Langstaart. 5. KLAUWIER, met een wigsgewyze  
 staart, die zeer lang en  
 blaauwagtig is, de kop ge-  
 gekuifd.

Woond in Senegal.

KLAU-

Louizaan- 6. KLAUWIER, met een wigsgewyze  
 sche staart, afchgrauw ligchaam,  
 (*Ludovicianus.*) zwarte roeyvederen, die  
 aan hun begin, en ftuurve-  
 deren die aan hunnen tip  
 zwart zyn. BUFF. *Ornith.*  
 II. pag. 162. tab. 15. f. 2.  
 Woond in Louizanien.

(*Nengeta.*) 7. KLAUWIER, met een wigsgewyze  
 staart, met eene witte punt,  
 een afchgrauw ligchaam, dat  
 van onder witagtig is. EDW.  
*Glean.* II. tab. 318.  
 Woond in Brasil.

Krombek 8. KLAUWIER, met een wigsgewyze  
 (*Curviro-* staart, een wit ligchaam,  
*stris.*) zwarten rug, vyfflag pennen,  
 met eene witte vlak. *Vanga*  
 BUFFON. *Hift. Nat.* tom. I.  
 pag. 247. tab. 228. BRISS.  
*Ornith.* II. pag. 191. tab. 19.  
 f. 1.  
 Woond in Madagascar.

Rouwdrager 5. KLAUWIER, met eene wigsgewyze  
 I 3 staart,

# 118 ROOFVOGELN.

(*Collaris.*) staart, een zwart ligchaam, van onder wit, de slagpenpen aan 't begin wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. pag. 237. tab. 477.  
Woond aan de Kaap.

Witte (A) KLAUWIER, die geheel wit is, met zwarte slagpennen \*.  
Woond in West Indien.

Luconsche 10. KLAUWIER, met eene wigsgewyze (*Luconensis.*) staart, eene zwarte vlak aan de ooren, roffe slagpennen die aan den tip wit zyn. BRISS. *Ornith.* II. pag. 166. tab. 18. fig. V.  
Woond in het Eiland Luçon.

Wagter 11. KLAUWIER, met een wigsgewyze (*Excubitor.*) staart, die aan de zyden wit is, een graauwen rug, zwarte vlerken met een witte vlak \*. *Piegrieche grise.* BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. tom. I. pag. 134. tab. 445.  
Woond in Europa.

KLAU-

Schat Exter 12. KLAUWIER, met eenen byna wigs-  
 (Collurio.) gewyze staart, gryzen rug,  
 de middelste roeipennen een  
 kleurig, de bek lood coleurig.

NB. Deze is een byzoort der voorige.  
 Woond in Europa.

Zwartoor (B) KLAUWIER, met een gryzen rug,  
 een lange zwarte vlak agter  
 de oogen. *Piegriecherouffe*.  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p.  
 139. tab. f. 1.

b. Met een roode borst.

BUFF. *ibid.* tab. 32. 1.

Woond in Europa.

Tyran 13. KLAUWIER, die afchgrauw is,  
 (*Tyrannus*) van onder wit, met een zwarte  
 kruin, en een lang roffe  
 streep. CATESB. *Carol.* I.  
 tab. 55.

Woond in America.

Schach. 14. KLAUWIER, die geelagtig is, met  
 een zwart voorhoofd, en  
 vleugels.

Woond in China.

- Tyran van 15. KLAUWIER, die zwart is, van onder geel, de kruin met eene geele streep, een witte band aan de oogen. *Tyran de Brasil.* BUFF. *Hist Nat.* tab. 212. Woond in Brasil.
- NB. Deze is een Vliegevangener.

- Gestreepte 16. KLAUWIER, met eene ronde staart. *(Doliatus.)* een wit ligchaam met zwart gegolfd. EDW. *Glean.* I. p. 35. tab. 226. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. pag. 238. tab. 297. fig. 2. het wyfje. BRISS. *Ornith.* II. pag. 187. tab. 29. fig. 3. Woond in Cayenne.

- Zwart Kop 17. KLAUWIER, die ros is, van onder wit, met een zwartagtig groen hoofd. *Schetbé.* BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom. I, pag. 248. n. 7. tab. 298. I. BRISS. *Ornith.* II. pag. 185. tab. 17. fig. 2. Woond in Senegal.

Geelkruin 18. KLAUWIER, die zwart is, van onder rood, met eene geele kruin en Dyen. *Gonolec*, BUFFON. *Hist. Nat. des Ois*, I. pag. 249. tab. 56.  
Woond in Senegal.

Geelbuik 19. KLAUWIER, die is bruin met eene (*Sulphuratus*,) zwarte kop, en eene witte band om dezelve. *Becarde a Ventre Jaune*. BUFF. *Hist. Nat. Ois*. I. pag. 247. tab. 296. BRISS. *Ornith.* II. tab. 14. fig. 1. 2.  
Woond in Cayenne.

Afchgrauwe 20. KLAUWIER, die graauw is, van onder witagtig, de kruin, en (*Senegallus*,) band om de oogen zwart; zwarte stuurvederen, die aan de punt witzyn. BRISS. *Orn.* II. pag. 167. tab. 17. fig. 1.  
Woond in Senegal.

Van Madagafcar 21. KLAUWIER, die afchgrauw is, van onder witagtig, met zwarte oogstreepen, en roffe stuur

- ensis.*)                      vederen. BRISSON. *Ornith.* II.  
pag. 264. tab. 16. fig. 1. 2.  
NB. Dezelve met den hals van voren  
zwart. BUFFON. *Hist. Nat. des*  
*Ois.* tab. 299. fig. 1. 2.  
Woond in Madagascar.
- Bruine van 23. KLAUWIER, die grys is, van on-  
Bengale                      der wit, met roode koonen,  
(*Emeria.*)                      en fluit. EDW. *Birds.* IV.  
tab. 190. *Rougequeue.* BUFF.  
*Ois.* pag. 243.  
Woond in Bengale.
- Spotter                      24. KLAUWIER, met eene ronde staart,  
(*Focofus.*)                      een grys ligchaam, het on-  
derste ooglid puper, de aars  
bloed rood.  
Woond in China.
- Schraaper 25. KLAUWIER, die de rug grys heeft,  
(*Infauftus.*)                      de stuurvederen ros, de  
twee middelste aschgrauw,  
met een zwarte band, de  
staart rond.  
Woond in de Boffchen.



Witstreep 26. KLAUWIER, die grys is, van onder  
 (Faustus.) roestcoleurig, met een wit  
 streepje agter de oogen.  
 Woond in China.

Zwartkap (C) KLAUWIER, die staalblauw is, met  
 een zwart hoofd, en stuur-  
 vederen, de roeipennen  
 zwart, doch de buitenste wit.  
 BUFF. *Hist. Nat. des Ois.*  
 I. pag. 246. tab. 377.  
 NB. Dezelve dog zonder witte roei-  
 pen. *idem.* tab. 404.  
 Woond in Cayenne.

Groenc (D) KLAUWIER, die groen is, met een  
 witte hals, kop, borst en buik,  
 de zylingfche stuurvederen  
 zwart. *Tbcha- Chert- bé.*  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* I. p.  
 248. tab. 374.

Blaauwe (E) KLAUWIER, die van boven blaauw  
 is, en van onder wit. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* I. pag. 237.  
 tab. 298. fig. 1.  
 Woond in Indien.

KLAU-

Wit Buik (F) KLAUWIER, die zwart is, met de  
 buik wit. BUFF. *Hist. Nat.  
 des Ois.* I. pag. 437. tab. 9.  
 fig. 1. *Angraien.*  
 Woond in Madagafcar.

Cha-bert (G) KLAUWIER, die donker blaauw is,  
 van onder wit. BUFF. *Hist.  
 Nat. des Ois.* I. tab. 38. f.  
 2. *Cha-bert.*  
 Woond in de Manilles.



## II. D U N B E K K E N.

*De Bek zamengedrukt van boven gekield\*.*

XLV. PAPEGAY De *Bek* krom en uitgerand,  
 (PSITTACUS) de onderkaak naar boven  
 ge-

\* IK heb deze benaaming (schoon ook oneigen) beter ge-  
 agt, dan die van *Exterbenden* (PICAE), welken de Heer LIN-  
 NAEUS gebruikt, wyl de meeste weinig naar *Exters* gelyken,  
 en zy alle den bek zaamen gedrukt hebben.

geboogen, de *Neusgaaten*  
aan den grond van den bek.  
De *tong* vleesagtig rond.  
Twee vóór en twee agter  
vingers.  
a. Langstaartige.

West Indi- 1. PAPEGAY, met eene lange staart,  
sche Rave die rood is, de roeipennen  
(*Macao.*) van boven blaauw, van on-  
der ros, de koonen naakt,  
en rimpelig. EDW. *Birds.*  
IV. p. 158. BUFF. *Hist. Nat.*  
tab. 12.  
Woond in Zuid America.

GroeneW.I.2. *Langstaartige* PAPEGAY, die groen  
Rave is, met blaauwe vlerken,  
(*Militaris.*) naakte koonen, met gepluim-  
de streepen.  
Woond in . . . . .

Blaauwe Ara 3. *Langstaartige* PAPEGAY, die van bo-  
(*Ararauna.*) ven blaauw, en van onder  
geel is, met naakte koonen,  
met gepluimde streepen \*.  
EDW. *Birds.* IV. 159. BUFF.  
*Hist.*

*Hist. Nat.* tab. 36.

Woond in Zuid America.

Mafcarin 5. *Langstaartige* PAPEGAY, die bruin  
(*Obscurus.*) is, met roode naakte wan-  
gen, het hoofd graauw, en  
zwart, de staart graauw.  
BUFF. *Hist. Nat. des Ois.*  
tab. 35.

Woond in Africa.

Edele 6 *Langstaartige* PAPEGAY, met naakte  
(*Nobilis.*) koonen, en roode schouders.  
Woond in Asia.

Groene van 7. *Langstaartige groene* PAPEGAY, met  
Brafil naakte koonen, blaauw en  
(*Severus.*) groenen stuurpennen, die van  
onder purper zyn. EDW.  
*Glean.* tab. 229. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* I. tab. 383.

Roodborst (A) *Langstaartige* PAPEGAY, die groen  
(*Hæmatodes.*) is met eene rode borst, en  
blauwe kaaken. LINN. *mant.*  
*alt.* p. 524. EDW. *Glean.* I.  
tab. 232.

Lang-

(b.) Langstaartige Parkieten.

Woond in Oostindien.

Van Gingi 8. *Langstaartige* PAPEGAY, die groen  
(*Eupatria.*) is, met roode schouders.

BRISS. *Ornith.* IV. pag. 343.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*

tab. 239.

Woond in Grugo.

Japanfche 9. *Langstaartige* PAPEGAY, die groen  
(*Japonicus.*) is, van onder en aan de zy

lingfche ftuurpennen rood,  
de roeipennen blaauw.

Woond in Japan.

Ambonfche 10. *Langstaartige roode* PAPEGAY, met  
(*Amboinensis.*) eene blaauwe rug, de vleu-

gels met eene groene vlak.

BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* I.

tab. 240. BRISS. *Ornith.* IV.

pag. 378. tab. 28. fig. 2.

Woond in Amboine.

Blaauwkop 11. *Langstaartige groene* PAPEGAY, met  
blaau-

(*Cyanocephalos.*)

blauwe kop en keel. BUFF.  
*Hist. Nat. des. Ois.* . . . tab.  
192 BRISS. *Ornith.* tom. IV.  
p. 359. tab. 19. fig. 4.  
Woond in Oostindien.

Van Borneo 12. *Langstaartige roode* PAPEGAY, met  
(*Borneus.*)

groene tippen aan de stuur  
en roeipennen, een blauwe  
vlak op de vleugels, en brui-  
ne oogkringen. EDW. *Birds.*  
IV. tab. 173.

Woond in Borneo.

Geele Parkiet 13. *Langstaartige geele* PAPEGAY, met  
van Angola  
(*Solstitialis.*)

groene dekvederen, roode  
oogkringen, de buitenste  
slagpennen blaauw.

Woond in Guinea en Ango-  
la.

Van Carolina 14. *Langstaartige groene* PAPEGAY, met  
(*Carolinensis.*)

eene geele kop, hals en koo-  
nen. CATESB. *Carol.* I. tab. 4.

Woond in Carolina en Vir-  
ginia.

*Lang-*

Alexanders 14. *Langstaartige PAPEGAY*, die groen  
 Papegay is, met eene roode halsband,  
 (*Alexandri.*) en borst, Ring Parkiet. EDW.  
*Glean.* III. tab. 292. fig. 1.  
 BUFFON. *Ois. Hist. Nat.* pag.  
 215.  
 Woond in China, Bengale.

Geelwang 15. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met  
 Parkiet roffe wangen, de stuur en  
 (*Pertinax.*) roeipennen grys. EDW. *Glean.*  
 I. tab. 234. *Yellow Faced*  
 Parkiet. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 528.  
 Woond in America.

Roode 16. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met  
 blaauwkop een rood voorhoofd, blaauw  
 Parkiet agterhoofd, en roeipennen.  
 (*Canicularis.*) EDW. *Birds.* IV. tab. 176.  
 Woond in America.

Bruinwang 17. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met  
 Parkiet eene blaauwe kruin en stuur-  
 (*Aeruginosus*) vederen. EDW. *Birds* IV.  
 tab. 177.  
 Woond in America.

*Iste. Deel. IIde Stuk. K Lang-*

RosbekPar- 18. *Langstaartige groene PAPEGAY*, met  
kiet roode bek, en pooten, de  
(*Rufirostris.*) stuurvederen aan de tippen  
blauw, de oogkringen vleesch  
colour. EDW. *Birds*. IV. p.  
175.  
Woond in America.

Bonte Par- 19. *Langstaartige geelen groene PAPEGAY*,  
kiet het agterhoofd, keel en borst  
(*Ornatus.*) rood, de kruin en ooren  
blauw, de oogkringen graauw  
EDW. *Birds* IV. pag. 174.  
tab. 174.  
b. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
tab. 61.  
Woond in Asia.

Parkiet van 20. *Half Langstaartige groene PAPEGAY*,  
Cayenne de dekvederen der blaauwe  
(*Agilis.*) slagpennen oranje, de staart  
van onder rood, de oogkrin-  
gen graauw. EDW. *Birds* IV.  
168.  
Woond in America.

Gevlakte (B) *Langstaartige geele PAPEGAY* \*, met  
groene



- Parkiet groene vlakken op den rug en vleugels, de dekvederen groen, de slagpennen violet, de staart groen, de buitenste vederen violet. BUFF. *Hist. Nat.* tab. 525.  
Woond in Cayenne.
- Roodkop (C) *Langstaartige groene* PAPEGAY, die Parkiet van onder geel is, de kop paarfch, het voorhoofd en de wangen rood, de keelzwart, eene vlak op de vlerken. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 264.  
Woond in Gingi.
- Geelkop (D) *Langstaartige groene* PAPEGAY, met Parkiet eene geele kop, rood voorhoofd en wangen, de rand der vleugelen geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 499.  
Woond in Carolina.
- Witkop (E) *Langstaartige* PAPEGAY, die groen Parkiet. is, van onder rozen rood, de kop wit met een zwarten

band over het voorhoofd,  
twee zwarte vlakken aan de  
keel, een geele band over de  
vleugels. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* I. 517.

Woond in Pondichery.

**Bruinftaart (F) Langftaartige PAPEGAY**, die groen  
**Parkiet** is met een roestwervige buik  
en ftart. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 85.

Woond aan de ftart Magel-  
lanes.

**WitoogPar- (G) Langftaartige groene PAPEGAY**, met  
**kiet** witte oogkringen, de schou-  
ders carmyn rood. BUFFON.  
*Ois. Hist. Nat.* p. 407.

Woond in Gujana.

**Blaauwftaart(H) Langftaartige groene PAPEGAY**, die  
**Parkiet** de ftart blaauw heeft, de bin-  
nenfte ftuurvederen geel,  
de middelste wit, ende bui-  
tenste blaauw BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 359.

Woond in Cayenne.

*Lang-*

Geteekende (I) *Langstaartige groene PAPEGAY*, die  
 Parkiet de vleugels van onder geel  
 heeft, de hals met roode  
 vlakken. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* p. 187.  
 Woond in Gujana.

Gefchilder. (K) *Langstaartige groene PAPEGAY*, de  
 de Parkiet hals bruin, de randen der hals  
 vederen oranje, een oranje  
 vlak onder de oogen, het  
 voorhoofd, en de wangen  
 donker violet, de stuurve-  
 deren blaauw, de buik en  
 staart rood bruin. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 144.  
 Woond in Cayenne.

Arlequin (L) *Langstaartige roode PAPEGAY*, het  
 agterhoofd, het bovenste  
 der rug, een band onder de  
 oogen naar den rug, het on-  
 derlyf en de stuurpennen  
 blaauw, de roeipennen geel.  
 BUFF. *Hist. Nat.* tab. 143.  
 Woond in Oost Indien.

c. Kort staarten met een  
gelyke staart.

\* *Cacatous.*

Gekroonde 21. *Kortstaartige* PAPEGAY, met een roo-  
(*Coronatus.*) de kuif met blaauwe tippen,  
Woond in Surinamen.

GeelkuifCa-22. *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is  
catoe met een geele kuif \*. EDW.  
(*Cristatus.*) *Birds.* IV. 160. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 14.  
Woond in China.

Witkuif (M) *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is  
met eene witte kuif. BUFFON.  
*Hist. Nat. Ois.* 163.  
Woond in de Moluccos.

Roodkuif (N) *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is,  
de kuif van onder rood \*,  
BUFF. *Ois.* 498.  
Woond . . . . .

Roodbek (O) *Kortstaartige* PAPEGAY, die wit is,  
de bek en stuit rood. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* tom. 491.  
Woond

Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

b. Kleine BRISS. *Ornith.*  
IV. p. 212.

Roodvlerk 23. *Kortstaartige* PAPEGAY, die vuil wit  
(*Erythroleucus.*) is, de stuit vleugels en staart  
rood. BRISS. *Ornith.* IV.  
p. 214.  
Woond . . . . .

Blaauwe 24. *Kortstaartige* PAPEGAY, die gryis is  
(*Eritbacus.*) met witte oogkringen, en  
roode staart. BUFF. *Ois.* tab.  
311.  
Woond in Jamaica.  
\*\* *Loeries.*

Snapper 25. *Kortstaartige* PAPEGAY, die rood is,  
(*Garrulus.*) met graauwe oogkringen,  
de kaaken en vleugels groen,  
de stuurvederen aan de be-  
nedenstn helft blaauw. EDW.  
*Birds.* IV. tab. 172.

b. roode met groene, en  
zwarte vleugels, de  
K 4                      stuur-

stuurvederen geel, de  
onderste half groen.

- c. roode met groene vleu-  
gels, en zwarte roey-  
vederen, de staart, groen  
van onder geel, eene  
geele vlak op de rug.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.*

215.

Woond in de Moluccos.

Juffertje 26. Kortstaartige PAPEGAY, die rood  
(*Domicella.*)

is, de kruin violet, de vleu-  
gels groen, de schouders en  
knieën blaauw. EDW. *Birds.*

IV. 171. *Hist. Nat. Ois.*

119.

Woond in Oostindien.

- d. De kruin zwart het ag-  
terhoofd blaauw, de ag-  
terste dekvederen rood,  
met groene randen.

BUFF. *Hist. Nat. tab.*

84.

Lorre 27. Kortstaartige PAPEGAY, die purper  
(*Lory.*)

is, met eene violette kruin,

de

de borst staart en knieën  
blauw\*. *Edw. Brides. IV. 170.*  
Woond in Oostindien.

Bewaasfem- (P) *Kortstaartige* PAPEGAY, die rood is,  
de schouders, en roeipennen  
blauw, de rug en buik, als  
met eene blauwe waasssem  
gedekt.

VOSM, *Beschryv.*

Fraaye (Q) *Langstaartige* roode PAPEGAY, de  
schouders, buik, en roeipen-  
nen blauw. *BUFF. Hist. Nat.*  
tab. 518.

Woond in Amboine.

NB. Deze komt zoo na aan de bewaas-  
femde, dat zy misschien slechts  
eene byzoort is.

Blaauwstuit (R) *Langstaartige* PAPEGAY, die rood  
is, met een blauwe stuit,  
en vlak boven de vleugels,  
de stuurvederen zwart. *BUFF.*  
*Hist. Nat. Ois. 519.*

Woond in China.

\*\*\* *Papegayen.*

- Blaauwkop 28. *Kortstaartige* PAPEGAY, die blaauw  
(*Coerueo Cephalon.*) is, met een groene buik,  
stuit en staart, de kruingeel,  
de stuur en roeipennen rood.  
BRISS. *Ornith.* IV. p. 317.  
Woond in Gujana.
- Zwarte 29. *Langstaartige* PAPEGAY, die zwart  
(*Niger*) is, met een blaauwagtig  
zwart ligchaam, de bek en  
oogkringen witagtig EDW.  
*Birds.* I. tab. 5. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* tab. 502.  
Woond in Madagascar.
- Witkop 30. *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is,  
(*Leucocephalus.*) met blauwe slagvederen, een  
wit voorhoofd. EDW. *Birds.*  
IV. 166.  
(b.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
tab. 335.  
Woond in Martinique. b en  
in Senegal.
- Veelverwige 31. *Kortstaardige* PAPEGAY, die groen  
(*Lucionensis.*) is, met een blaauw agter-  
hoofd en stuit, de vleugels  
met



met zwart, blaauw, en rood  
getekend. BRISSON. *Ornith.*  
IV. pag. 295. tab. 22. f. 2.  
Woond op het eiland Luçon.

Bonte Amazoon  
(*Aestivus.*) 31. *Kortstaartige* PAPEGAY, die groenis,  
met geel gevlacht, een blaauw  
voorhoofd, bloedroode  
schouders, en roode oog-  
kringen. EDW. *Birds.* IV.  
162. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
tab. 120.  
Woond in de West Indien.

Amazoon  
(*Amazonius.*) 33. *Kortstaardige* PAPEGAY, die groen-  
achtig is, met een geel voor-  
hoofd, en oranje koonen\*.  
BRIS S. *Ornith.* IV. p. 257.  
Woond in Surinamen.

Paradys  
Papegay  
(*Paradisi.*) 34. *Kortstaardige* PAPEGAY, de keel,  
buik, en stuurvederen rood.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 336.  
Woond op het eiland Cuba.

Aurora (S) *Kortstaartige* PAPEGAY, de schoft  
en randen der vleugelen  
rood.

rood. LINN. *Mantiff. alt.* pag. 524. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 13.

Woond in America.

Gerande (T) *Langstaartige groene PAPEGAY*, met eene blaauwe kruin, en vleugels, welkers veeren geel gerand zyn. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 287.

Woond op het Eiland LUGON,

Aardige (Festivus.) 35. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met een purper voorhoofd, de wenkbrauwen en keel blaauw, de rug bloedrood. Woond in Indien.

Brafiliaan- fche (Traschen- sis.) 36. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met een rood aangezicht de, flagpennen blaauw, de oogkringen afchgrauw. EDW. *Birds* 161. tab. 161.

Woond in Brafilien.

Roodvlak- 37. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met rood

kige  
(*Autumnalis*) een rood voorhoofd, en eene  
roode vlak op de vleugels,  
de kruin en voorste roeipen-  
pen blaauw. EDW. *Brids* IV.  
tab. 164.  
Woond in Amerika.

Havik Pape- 38. *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met  
gay  
(*Accipitri-*  
*nus*) eene graauwe kop, de borst  
en hals met violet gevlacht,  
de ftuur en roeiveeren aan  
de tippen blaauw. EDW. *Brids*  
IV. tab. 165. BUFF. *Ois.* tab.  
526.  
Woond in Cayenne.

Roodgatje 39. *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met  
(*Menstruus.*) een blaauwagtig hoofd, en  
het onderfte der rug rood.  
EDW. *Glean.* III. tab. 314.  
BUFF. *Ois.* tab. 384.  
Woond in Suriname.

Vuyle 40. *Kortstaartige bruinagtige* PAPEGAY,  
(*Sordidus.*) met een blaauwe keel, de  
ftaart, en vleugels groen,  
de bek en onderrug rood.  
ED-

EDWARD. *Birds*. IV. 167.  
Woond in Mexico.

**Bruine** (U) *Kortstaartige* PAPEGAY, die bruin is, van onder violet, de stuurpennen, en slagpennen blaauw, de stuit scharlaken rood. EDW. *Glean*. III. tab. 315. BUFF. *Ois*. tab. 408.  
Woond in Cayenne.

**Zwartkop** 41. *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, van onder geel met een zwarte kruin, witte borst, en vleeschroode oogkringen. EDW. *Birds* IV. tab. 167. BUFF. *Ois*. 526.  
Woond in Cayenne.

**Geelstuit** (V) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, het aangezicht blaauw, de roeivederen blaauw, de middelste met een roode vlak, de borst bleek rood, met groen gewolkt, de staart geel.

geel. BUFFON. *Ois.* 360.

Woond in de Havana.

Bloedvlak (W) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, het bovenste der vleugels rood, de slagpennen aan het uiterste geel in, 't midden rood daarna blaauw, de punten groen. BUFFON. *Hist. Nat.* p. 212.

Woond in Cayenne.

Chineefche (X) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, met blaauwe en roode vlakken op de borst, de randen der vleugelen blaauw, de ftuur en roeipennen van onder zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 514.

Woond in China.

Roodkeel (X)\* *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met een wit voorhoofd, roode keel blaauwe ftuurvederen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 549.

Woond in Martinique.

*Kort-*

**Roodbuik** (X)\*\* *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, het hoofd en wangen blaauw, de buik rood, de roeivederen blaauw, de fluur-  
vederen rood, van onder geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 548.

Woond in Martinique.

\*\*\*\* Parkieten.

**Geelkeel** 42 *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met eene roode keel.

Woond in Indien.

**Bonte** (Y) *Kortstaartige* PAPEGAY, uit rood en zwart gemengeld. EDW. *Brids* IV. 163.

Woond . . . . .

**Vuilkleurige** (Z) *Langstaartige* PARKIET, met een blaauw voorhoofd, rood achterhoofd, en borst, eene blaauwe vlak agter de oogen, het lyf groen en geel. EDW. *Birds* 174.

**Blaauwkaak** (Aa) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is,

is, het voorhoofd, de keelen wangen blaauw, de slagvederen blaauw, de drie binnenste van boven rood, de hals van vooren oranje. EDW. *Glean.* I. pag. 43. tab. 230.  
Woond : . . . . .

Oranje Bek (Ba) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen is, de slagpennen en randen der vleugelen blaauw, de zyden rood, het bovenkaak been oranje. EDWARD. *Glean.* I. pag. 44. tab. 231.  
Woond in . . . . .

Parkiet van 43. *Kortstaartige* PAPEGAY, die Senegal van onder geel is, met een (Senegallens.) aschgrauw hoofd. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 288.  
Woond in Senegal.

Geelkeel. (Ca) *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met een geele keel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 190. 1.  
Woond in America.

Goudvlerk 44. *Kortstaartige groene PAPEGAY*, de vleugels met eene oranje en blaauwe vlak, de oogkringen wit. EDW. *Glean.* II. tab. 293.

Woond in Indien.

Roodborst 45. *Kortstaartige PAPEGAY*, die groen is, met een roode borst en (Galgalus.) stuit, de kruin blaauw, [de bovenrug met eene geele band.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 190 2.

Woond in Peru.

Guineefche 46. *Kortstaartige PAPEGAY*, die groen is, met een rood voorhoofd, Mos de staart oranje, met eene (Pullarius.) zwarte band, de oogkringen graauw. EDW. *Glean.* I. tab. 237. fig. 1.

Woond in Guinea.

Brafiliaan- 47. *Kortstaartige PAPEGAY*, die geelag- fche Mos tig groen is, met eene blaau- (Paserinus.) we vlek op de vleugels, die van onder blaauw zyn. ED-

WARDS



WARDS *glean.* II. pag. 51. tab.

235.

Woond in America.

Blaauwrand (Da) *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met

blauwe slagpennen, de bui-

tenste groen. BUFFON. *Hist.*

*Nat. Ois.* 455.

Woond aan de Kaap.

Blaauwe (Ea) *Langstaartige* PAPEGAY, die schoon

blauw is van onder wit. BUFF.

*Hist. Nat. Ois.* 455. 2.

Woond in Peru.

Graauwrand (Fa) *Kortstaartige* PAPEGAY, die groen

is, met een rood voorhoofd

en stuit, een blauwe vlak on-

der de oogen, de buitenste

slagpennen graauw. BUFFON.

*Hist. Nat. Ois.* 520. 1 (het

manneltje) 2 (het wyfje.)

Woond in de Philipynsche

Eilanden.

St. Thomas (Ga) *Kortstaartige groene* PAPEGAY, met

Parkiet eene geele kruin. BUFFON.

L 2

*Hist.*

*Hist. Nat. des Ois.* 456. 1.  
Woond op het Eiland St.  
*Thomas.*

Wit oog (Ha) *Kortstaartige groene PAPEGAY*, met  
eene geele stuit, en vlak op  
de vleugels. *BUFF. Hist. Nat.*  
*Ois.* 456. 2.  
Woond in Cayenne.

Groen Par- (Ja) *Kortstaartige groene PAPEGAY* \*, met  
kietje eene roode kop en wangen,  
de benedenrug zeegroen.  
*BUFF. Hist. Nat. Ois.* 60.  
Woond in Guinea.

**XLVI. TOUCAN.** De *Bek* zeer groot, ledig van  
binnen verheven, zaagsge-  
wyze uitgesneden.

Aan de punt krom.

De *Neusgaaten* agter den grond  
van den bek.

De *tong* vederig.

Groene 1. **TOUCAN**, die groen is, met eene  
(*Viridis.*) geele buik, en roode stuit\*.

**EDW.**

EDW. *glean.* III. tab. 329.

BRISS. *Ornith.* IV. p. 423.  
tab. 33.

Woond in Cayenne.

Peperreeter 2. TOUCAN, die groen is, vanvooren  
(*Piperivoo-* zwart, de dekvederen der  
*rus.*) stuurpennen, en de dyen

rood \*. EDWARDS *glean.* III.  
tab. 330.

Woond in Cayenne.

Aracari 3. TOUCAN, die groen is, met eene  
(*Aracari.*) roode band om den buik,  
de dekvederen der staart en  
stuit rood, de buik geel.

BRISS. *Ornith.* IV. p. 426.  
tab. 33. fig. 2.

Woond in Zuid America,

Visheeter 4. TOUCAN, die zwartagtig is, met  
(*Piscivorus.*) eene roode band om den buik,  
de dekvederen der staart  
wit. EDW. *Birds.* I. pag. 64.  
tab. 64.

Woond in Zuid America.

Toucan 5. TOUCAN, die zwartagtig is, met  
(*Tucanus.*) eene geele band, stuit en  
dekvederen der staart. EDW.  
*glean.* I. tab. 238.  
Woond in Zuid America.

Zwarte 6. TOUCAN, die zwartagtig is, met  
(*Picatus.*) eene geele borst, de dekve-  
deren der staart, endeszelfs  
punten rood, de stuit zwart.  
BRISS. *Ornith.* IV. 408.  
Woond in Zuid America.

Geelborst. 7. TOUCAN, die zwartagtig is, de  
(*Dicolorus.*) buik, staart, dekvederen  
rood, de keel geel. EDW.  
*glean.* III. 329. \*.  
Woond in Cayenne.

Toco (A) TOUCAN, die zwart is, met een  
blaauwe kring om de oogen,  
de oogplaats rood, de keel  
geelachtig wit, de dekvede-  
ren der staart wit. BUFFON.  
*Hist. Nat. Ois.* 81.

Zwarthals (B) TOUCAN, die groen is, het hoofd,  
hals

hals en keel zwart, de buik geel, met eene roode band, de dekvederen der staart rood. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 166.

Woond in Brasilien.

Withals (C) TOUCAN, die zwart is, met eene driehoekige vlak om de oogen, de hals wit, met een roode band, de stuit rood, de staarts dekvederen geel. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 262. Woond in Cayenne.

Geelhals (D) TOUCAN, die zwart is, de vleugels groen, de keel geel, de borst rood, als ook de staart, de dekvederen der staart geel. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 307. Woond in Brasilien.

Roodbuik (E) TOUCAN, die zwart is, van onder groen, met eenen rooden halsband, eene geele keel, met roode vlakken en zwarte ban-

den, de buik rood. BRISS.  
*Ornith.* IV. p. 421.  
 Woond in Mexico.

Schoone (F) TOUCAN, die groen is, met rood  
 en blaauw geschakeerd. BRISS.  
*Ornith.* IV. pag. 423.  
 Woond in America.

Geele (G) TOUCAN, die geel is, met eene  
 zwarte band, aan weerzy-  
 den van den bek, tot aan de  
 borst, de staartvederen zwart  
 en wit gemengeldt. BRISS.  
*Ornith.* IV. pag. 432.  
 Woond in America.

Blaauwe (H) TOUCAN, die uit blaauw en asch-  
 graauw gemengeld is, het  
 bovenkaakbeen geel, het on-  
 derste purper zwart. BRISS.  
*Ornith.* IV. pag. 433.  
 Woond in Mexico.

Momot 8. TOUCAN, met drie vingeren aan de  
 pooten, de twee middelste  
 (Momota.) stuurvederen zonder vederen

aan het midden. Edw. *Glean.*  
III. tab. 328.

Woond in Brasiliën.

XLVII. JAGERVOGEL. De *Bek* verheven rond,  
(BUCEROS)

van boven gekield,  
krom, groot, zaagsge-  
wyzegetand. Het voor-  
hoofd naakt en been-  
agtig gebult.

De *Neusgaaten* agter  
den grond der *bek*.

De tong scherp en kort.

Drie vingers aan de voe-  
ten.

Calao  
(*Bicornis.*)

1. JAGERVOGEL, met een beenig plat  
voorhoofd, dat van vooren  
twee hoorns heeft \*. Edw.  
*Glean.* II. tab. 281. D.

Woond in China en Straat-  
Sunda.

Indiaansche  
water-raaf  
(*Hydrocorax.*)

2. JAGERVOGEL, met eene beenige  
plaat, die van vooren zon-  
der punt is, de buik geel.

L 5

ros.

ros. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 283.

Woond in de Moluccos.

Neushoorn 3. JAGERVOGEL, met een hoorn van  
(*Rhinoceros.*)

het kaakbeen na vooren omkromd \*.

EDW. *Glean.* II, 281.

B. ALLAMAND. *oscon.*

Woond in Indien.

Langbek 4. JAGERVOGEL, met een glad voor-  
(*Nasutus.*)

hoofd, de stuurvederen aan het boven en onder eind wit.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 260.

Woond in Senegal.

XLVIII. OSSENPIKKER. De *Bek* regt, byna  
(BUPHAGA.) vierhoekig.

De kaakbeenderen ge-

bult, en na vooren

noch bultiger. Het

bovenste kaakebeen

aan wederzyden hoe-

kig.

De *Neusgaaten* door-

loopende,

Os.



Africaansche I. OSSENPIKKER, met een bruin lig-  
 (Africanus.) haam van onder geel. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 293.  
 Woond in Senegal.

XLIX. TEEKEETER. De *Bek* zamen gedrukt,  
 (CROTOPHAGA.) half eirond geboogen,  
 van boven gekieldt, het  
 boven kaakbeen aan we-  
 derzyden hoekig.

Viervinge- 1. TEEKEETER, zwart, derandender  
 rige vleugelen groen, de oogkrin-  
 (Ani.) gen karmynrood \*. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 102. 1. *Bout*  
*de Petun.*  
 Woond in Africa en America.

Drievinge- 2. TEEKEETER, die zwart is, met ee-  
 rige ne groene weerschyn. BUFF.  
 (Ambulato- *Hist. Nat. Ois.* 102. 2. *Bout*  
 ria.) *de Petun.*  
 Woond in America.

L. RAAF. Den *Bek* verheven rond, en gekield.  
(CORVUS.) De *Neusgaaten* met neerleggende hairtjes bedekt.

De *Tong* kraakbeenig gespleeten.

Kaapsche  
Kaauw  
(*Hottintotus.*)

1. RAAVE, die zwart is, met eene groene weerschyn, een effen staart, en zeer lange knevelbaarden. BUFF. *Hist Nat. Ois.* 226.  
Woond aan de Caap.

Raave  
(*Corax.*)

2. RAAVE die zwart is, de rug met eene blaauwe weerschyn, de staart byna rood \*. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 495.  
Woond in Europa.

Kraay  
(*Corone.*)

3. RAAVE, die blaauwagtig zwart is, de staart rond, de stuurvederen gescheiden \*. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 483.  
Woond in Europa.

Roek  
(*Fragilegus.*)

4. RAAVE, die zwart is, met een grys voorhoofd, de staart rond-ach-

achtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
484. *Le Freux.*  
Woond in Europa.

Bontekraay 5. RAAVE, die afchgraauw is, met ee-  
(*Cornix.*) ne zwarte kop, vleugels en  
staart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
76. *Cornille Mantelée.*  
Woond in Europa.

Kaauw 6. RAAVE, die bruin is, met een grys  
(*Monedula.*) agterhoofd, het voorhoofd,  
de vleugels, en staart zwart\*.  
*Albin Ois. I. tab. 14.*  
Woond in Europa.

Meerkol 7. RAAVE, met de dekvederen der flag-  
(*Glandarius.*) pennen blaauw, met witte  
en zwarte dwarsstreepjes, het  
ligchaam roestkoleurig ge-  
mengeld\*. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois. 481. SEPP. Inlandsf. Ve-*  
*gel. I.*  
Woond in Europa.

Kuifkaay 8. RAAVE, die blaauw is met zwaarte  
(*Cristatus.*) streepjes op de dekvederen,  
en

en eene zwarte halsband.  
 EDWARDS. *glean.* I. tab. 239.  
 BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 529.  
 Woond in Noord Amerika.

Zwartkeel 9. RAAVE die violet is, van onder wit,  
 (*Cyanus.*) de keel en het voorhoofd  
 zwart, de staart aan de punt  
 wit. BRISS. *Ornith.* II. pag.  
 52. tab. 4. fig. 1.  
 Woond in Cayenne.

Nootkraa- 10. RAAVE, die bruin is, met witte  
 ker stippen, eene zwarte staart  
 (*Cargata-* en vleugels, de stuurvederen  
*tes.*) aan de punt wit, de mid-  
 delste als afgesleeten \*. EDW:  
*glean.* I. 240. BUFF. *Hift?*  
*Nat. Ois.* 50.  
 Woond in Europa.

Balecasser 11. RAAVE, die groenachtig zwart is,  
 (*Balicassus.*) met eene gevorkte staart.  
 ERISS. *Ornith.* II. pag. 31.  
 tak. 2. fig. 1.  
 Woond in de Philipynsche  
 Eilanden.

RAAVE,

Africaanfchei<sup>2</sup>. RAAVE, die violet zwart is, met  
(*Afer.*) eene wigvormige staart.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 5.

22. BRISS. *Ornith.* II. pag.  
40. tab. 3. fig. 2.

Woond in Africa, Senegal.

Exter 13. RAAVE, die wit en zwart is, met  
(*Pica.*) eene wigsgewyze staart \*.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 488.

Woond in Europa.

Senegalsche 13. RAAVE, die violet zwart is, met  
(*Senegallens.*) eene wigsgewyze staart, en  
zwarte pooten. BRISS. *Or-*  
*nith.* II. pag. 40. tab. 3. f. 2.

Woond in Senegal.

Kortstaart 14. RAAVE, die groen is, de vleuge-  
(*Brachyru-*  
*rus.*) len met eene witte vlak, en  
van onder en de streepen van  
het hoofd geel. EDW. *glean.*

III. tab. 324. BUFF. *Hist.*

*Nat. des Ois.* 258. *Merle de*  
*Bengale.*

Woond in Ceylon, Benga-  
len enz.

Deze

NB. Deze behoort tot de *Maerlaers*:

Canadische 13. RAAVE, die bruin is, met een  
(*Canadensis*;) geelagtig voorhoofd, van onder en aan de tippen der

stuurpennen wit. *BRISS. Ornith.* II. pag. 54. tab. 4. f. 2.

Woond in Canada.

(b) RAAVE die blaauw is, met eene zwarte kop, en stuurvederen, die aan de tippen wit zyn, de hals van agter, borst en buik wit. *BUFF. Hist. Nat. Ois.* 373.

Woond in Cayenne.

Withals (A) RAAVE, die zwart is, met een witte hals en borst. *BUFF. Hist. Nat. der Ois.* 327.

Woond in Senegal.

Cierlyke (B) RAAVE, die bruin is, met eene  
Gaay witte keel van onder, ende kruin van het hoofd geel de wenkbraauwen streep wit.

*BUFF. Hist. Nat. Ois.* 249.

Woond in Cayenne.

RAAVE,

Pruinvlerk (B\*) RAAVE, die zwart is, met rood  
 coleurige stuur-en roeipen-  
 nen. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 538.  
 Woond in Senegal.

Driecoleu- (C) RAAVE, die groen is, van onder  
 rige vuil oranje, de roeipennen  
 en stuurvederen zwart, het  
 voorhoofd grys, met zwarte  
 hairtjes. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 521.  
 Woond in Cayenne.

Grolle (D) RAAVE, die donker afchgrauw is,  
 met een purpere kop en vleu-  
 gels, de stuurvederen purper  
 en groen. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 523.  
 Woond . . . . .

Bergraav 14. RAAVE, die zwartagtig is, met ee-  
 (Pynocorax.) ne geele bek, en zwarte  
 pooten. BRISS. *Ornith.* III.  
 tab. 1. fig. 2.  
 Woond op de Zwitserfche  
 bergen.

Berg Kaauw 15. RAAVE, die violet zwart is, met  
(*Graculus.*) geele bek en pooten. AL-

BIN. *Ois.* I. tab. 24.

Woond op de Zwitferfche  
Bergen.

Eenzaame 16. RAAVE, die groenagtig is, met  
(*Heremita.*) een geelagtig hoofd, roode

bek en pooten. ALBIN. *Ois.*

III. tab. 16. pag. 16.

Woond op de Zwitferfche  
Bergen.

LI. SCHARLAER. De *Bek* zonder hairtjes, met  
(CORACIAS.) eene kromme punt.

De tong kraakbeenig, ge-  
fpleeten.

Duitfche 1. SCHARLAER, die blaauw is, met ee-  
Papegaay ne roode rug en zwarte roei-  
(*Garrulus.*) pennen \*. EDW. *Birds.* III.

109. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*  
486.

Woond in Europa.

Indiaanfche 2. SCHARLAER, die blaauw is, van  
VOO-



(*Indicus.*)                   vooren bleek ros, met eene  
groene kruin. EDW. *glean.*  
III. 326.  
Woond in Indien.

Caffer                   3. SCHARLAER, die blaauw is met de  
(*Caffra.*)                   buitenste rand der slagpen-  
nen geel. J. BURMAN. *Afbeeld.*  
*van Kaapsche Dieren.*  
Woond in Ethiopien.

Oosterfche   4. SCHARLAER, die groen is, met ee-  
(*Orientalis.*)               ne blaauwe gestreepte keel,  
de ftuurvederen zwart aan de  
tippen. BRISS. *Ornith.* 2. p.  
75. tab. 7. fig. 2.  
Woond in Ooft Indien.

Bengaalfcheg. SCHARLAER, die rosagtig is, van  
(*Bengalen-*                   onder blaauwagtig, de hals  
*fis.*)                       van onder met bleek violet  
gestreept, de ftart geheel.  
BUFF. *Hift. Nat. des Ois.* 285.

Gestaarte   6. SCHARLAER, die rosagtig is, van  
(*Caudatus.*)               onder aanden hals, met bleek  
violet gestreept, de uiterfte

stuurvederen zeer lang. BUFF.

*Hist. Nat. Ois.* 88.

Woond in Angola.

Witkop (A) SCHARLAER, die ros van onder  
blauw, het voorhoofd, wan-  
gen en keel wit, de middel-  
ste stuurvederen groen, de  
buitenste zwart en zeer lang,  
de pooten geel met witte  
vlakken. BUFF. *Hist. Nat.*  
*des Ois.* 326.

Woond in Senegal.

Blaauwstaart (B) SCHARLAER, die rood is, de staart  
blauw, aan de tippen pur-  
per en zwart. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 501.

Woond in Madagafcar.

LII. GEELVOGEL. De *Bek* kegelagtig, recht,  
(ORIOIUS.) en zeer scherp, het boven-  
ste kaakbeen wat langer.  
De tong puntig en dubbeld.  
De vingers 3. 1.

Wielewaal 1. GEELVOGEL, die geelis, met zwarte

te

(*Galbula.*) te bek, streepen en leden, de buitenste stuurvederen van agter geel\*. EDW. *Ois.* 26. *Loriot.*

Woond in Europa, en in Oost-Indien.

Chineefche 2. GEELVOGEL, die geel is, met zwarte vleugels die aan de tippen geel zyn, een zwarte band op het agter hoofd\*. BRISS. *Ornith.* II. pag. 326. tab. 33. fig. 1. *Loriot.* BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 570. *Couliavan.*

Woond in China.

Zwartkop 3. GEELVOGEL, met een zwart hoofd, flagpennen, en de tippen der middelste stuurvederen zwart. EDW. *Birds* II. 77. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 79. *Loriot.*

Woond in Bengale.

Americaan- 4. GEELVOGEL, die hoog geel is, het sche Specht . hoofd, de keel, de rug, de

M 3 roei

- (*Icterus.*) roei en stuurpennen zwart, met eene witte vlak op de vleugels, BRISS. *Ornitb.* II, pag. 86. tab. 8. fig. 1. CATESB. *Carol.* III. tab. 5. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 532. Woond in America.
- Roodvlek 5. Zwarte GEELVOGEL, met de dekvederen der vleugelen rood, (*Phoeniceus.*) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 402. Woond in Louifania.
- Roodgatje 6. Zwarte GEELVOGEL, met eene roode staart. (*Haemor-* BUFFON. *Hist. Nat,*  
*rhorus.*) *des Ois,* 482.  
Woond in Brasil,
- Jupajuba 7. Zwarte GEELVOGEL, het agterfte der (*Persicus.*) rug, de vlak der vleugelen, en het agterfte der stuurvederen geel. EDW. *glean.* III, pag. 234. tab. 319. BUFF, *Hist. Nat. Ois.* tab. 184.
- Mexicaan- 8. Zwarte GEELVOGEL, van onder, sche benevens het hoofd geel.  
BRISS,

(*Mexicanus.*) BRISS. *Ornith.* II. pag. 105.  
Woond in Mexico.

Roodbuik 9. *Zwarte* GEELVOGEL, met gryze ban-  
(*Guianensis.*) den aan de vederen, de borst  
en hals van onder rood.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 236.  
fig. 2.  
Woond in Guiana.

Baltimore 10. GEELVOGEL, die zwart is, van on-  
(*Baltimore.*) der ende de band over de vleu-  
gelen geel. CATESB. *Carol.*  
I. pag. 48. tab. 48. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* tab. 5. fig. 2.  
*Carouge de St. Domingue.*  
Woond in Noord America.

Bastaard 11. *Zwarte* GEELVOGEL, van onder  
Geelvogel geel, met een witte band  
(*Spurius.*) over de vleugels. CATESB.  
*Carolin.* I. tab. 49. BUFFON.  
*Hist. Nat. Ois.* 506. fig. 1.  
Woond in Canada.

Driekleu- (A) *Bruine* GEELVOGEL, met een gee-  
rige le borst en buik, het hoofd  
M 4 met

met geel gestippeld, een witte band over de vleugels. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 506. 2. Woond in Canada.

Bonana 12. *Goudgeele* GEELVOGEL, het hoofd  
(*Bonana.*) en borst castanie bruin, de rug, stuur- en roeipennen zwart. BRISS. *Ornith.* II. pag. 115. tab. 12. fig. 2. Woond in Zuid America.

Kleine van 13. *Goudgeele* GEELVOGEL, met de keel,  
Peru staart en vleugels zwart. EDW. *glean.* II. tab. 243.  
(*Mexicanus.*) Woond in Mexico, Jamaica, Peru.

Van St. Do- 14. *Zwarte* GEELVOGEL, met het ag-  
mingo terlyf, de dekvederen, en  
(*Dominica-* de vlak der vleugels geel.  
*mus.*) BRISS. *Ornith.* II. pag. 121, tab. 12. fig. 3. Woond in St. Domingo,

Van Cayen- 15. *Zwarte* GEELVOGEL, met eene gee-  
ne le vlak op de vleugels. ED-  
WARDS.

- (*Coguenensis.*)      WARDS. *glean.* II. tab. 322.  
 Woond in Cayenne.
- Geelkop      16. GEELVOGEL, die zwart is, met  
 (*Ícterocephalus.*)      een geele kop en hals. EDW.  
*Glean.* I. 323. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 343.  
 Woond in Cayenne.
- Gespikkelde 17. Gryze GEELVOGEL, met zwartge-  
 (*Melanocholus.*)      spikkeld, en eene band aan  
 de oogen. EDW. *Birds.* II.  
 85. *Schomburger.*  
 Woond in Mexico.
- Kaapsche      18. *Bruine Olyfcoleurige* GEELVOGEL,  
 (*Capensis.*)      die van onder geel is, een  
 geele vlak op de vleugels.]  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 236. I.  
 Woond aan de Kaap.
- Goudvogel 19. GEELVOGEL, die goudgeel is,  
 (*Aureus.*)      met een zwarte keel, dek-  
 vederen en staart. EDW.  
*Birds.* III. tab. 112.  
 Woond in Oost-Indien.

Goudkop 20. *Zwarte* GEELVOGEL, met de dek-  
(*Chrysocephalus*.) vederen van vleugels en  
staart en de kruin geel.

BRISS. *Ornith. append.* pag.  
38. tab. 2. fig. 2.

Woond in America.

Gekapte (B) GEELVOGEL, met een zwart voor-  
hoofd, kruin en hals van  
vooren, het agterhoofd ca-  
staniebruin, de dekvederen  
zwart met geelgerand. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 375.  
Woond in Senegal.

Groene (C) GEELVOGEL, die groen is, van  
onder rosbruin, de stuurve-  
deren van onder geel, de  
bekrood. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 328.  
Woond in Cayenne.

Citroenvo- (D) GEELVOGEL, met een kleine af-  
gel hangendekuij, het ligchaam  
zwart, de beneden rug ca-  
neel couleur, de staart geel,  
de twee middelste stuurve-  
deren



deren zwart. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 344. PALLAS. *Specil. fasc.* VI. pag. 1. tab. 1. Woond in Cayenne.

LIII. MINO \*. De *Bek* mesgewyze, verheven (GRACULA.) rond, aan het grondstuk byna naakt.

De *Tong* vleeschagtig, geheel, puntig.

Drie voor-en een agtervinger.

Mino 1. MINO, die violet zwart is, met eene vlak op de vleugels, eene geele band op het agterhoofd \*. EDWARDS. *Birds.* I. 17. tab. 17. BUFF. *Hist Nat. Ois.* 268. *Mainate.* Woond in Asien.

MI-

\* DIT geslacht, by LINNAEUS, *Gracula* genoemd, noemt Doctor HOUTTUYN *Kaauwtjes*, doch de *Kauw* een soort van *Raaf* zynde, (zie bl. 15. n. 6.) heb ik dezelve liever den nieuwen naam van *Mino* gegeven, het bevat meest *Schaerlaers*.

- Kaale (Calva.) 2. MINO, die aschgrauw is, met het hoofd aan wederzyden naakt. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 200. *Merle Chauve.*  
Woond in de Philippynsche Eilanden.
- Stinkende (Foetida.) 3. MINO, die zwart is, de buitenste roeipennen blaauw, eene naakte band om den hals.  
Woond in America.
- Barita (Banita.) 4. MINO, die grysachtig is, met blaauwe schouders, de buitenste roeipennen. BRISS. *Ornith.* II. pag. 103. tab. 10. f. 1.  
Woond in America.
- Kuif Meerelg. (Cristatella.) 5. MINO, die zwart is, de voorste roeipennen aan hun begin, en de stuurvederen aan hun eind wit, de bek geel. EDW. *Birds.* 19. tab. 19.  
Woond in China.
- Kleine Exter. 6. MINO, die zwart blaauw is, de van Bengale buik, een vlak op de vleugels,

(*Sularis.*) gels, en de zydelingsche  
 stuurpennen wit. EDWARDS.  
*Birds.* III. 181. tab. 181.

Purpere 7. MINO, die violet zwart is, met ee-  
 Maerlaer ne ronde staart. CAT. *Carol.*  
 (*Quiscal.*) I. pag. 12. tab. 12.  
 Woond in America.

Egyptische 8. MINO, die zee groen is, de buik  
 Raaf roestcoleurig, de pooten  
 (*Atthis.*) bloedrood. *Hasfelq. Reiz.* II.  
 deel. bl. 39.  
 Woond in Egypten.

LIV. PARADYSVOGEL, De *Bek* gedekt door  
 (PARADISEA.) de dikke veertjes van  
 het hoofd.  
 De *zypennen* zeer lang.  
 De twee bovenste  
 stuurvederen naakt,  
 en van een byzonder  
 maakzel.

Gemeene 1. PARADYSVOGEL, met de roeipennen  
 (*Apoda.*) langer dan het ligchaam, de  
 mid-

middelste stuurvederen borstelhairig \*. *EDW. Birds. III. 160. Hist. Nat. Ois. 254.*  
Woond in Moluccos.

Koninglyke 2. PARADYSVOGEL, met de twee middelste stuurvederen als draaden, aan het eind maansgewyze gevedert. *EDW. Birds. III. BUFF. Hist. Nat. Ois. 496.*

Woond in Amboine.

Donkere 3. PARADYSVOGEL, met eene naakte driehoekige vlak, de kop en hals bruin. *BUFFON Hist. Nat. Ois. 219.*

Woond in de Philippynsche Eilanden.

NB. Deze is een Maerlaer, en heeft niets van een Paradysvogel.

LV. COUROUCOU. De *Bek* korter dan het hoofd, (TROGON) mesgewyze krom, de kaakbeenderen getand.

Cor.

Twee voor en twee agter-  
vingeren.

Gestreepte 1. COUROUCOU, die afchgraauw is, de  
(*Strigilatus.*) vletgels met witte streepen.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 452.  
Woond in Cayenne.

Curucui 2. COUROUCOU, die goud groen is,  
(*Curucui.*) van onder geel, de keel  
zwart, [de borst blaauw.]  
EDW. *Glean.* III. tab. 331.  
Woond in Mexico, Brazil,  
Peru.

Groene 3. COUROUCOU, die goudgroen is, van  
(*Viridis.*) onder geel, de keel zwart.  
BUFF. *Hist. Nat Ois.* 195.  
Woond in Cayenne.

LVI. BAARDVOGEL. De *Bek* als de rug van  
(*Bucco.*) een Mes zylingfch zaa-  
mgedrukt, aan de  
punt, die krom is, uit-  
gerandt.

De

De gaping tot onder de  
oogen loopende.

De *Neusgaaten* met twee  
hairtjes gedekt.

Twee *voor-* en twee *ag-*  
*ter* vingeren.

Kaapfche i. BAARDVOGEL, die ros is, met ee-  
(*Capensis.*) ne geele hals - en eene zwar-  
te borst band. *BUFF. Hist. Nat. Ois.* 395.  
Woond in Ooft en West In-  
dien.

Cierlyke (A) BAARDVOGEL, die groenis, met een  
rood hoofd en keel, blaau-  
we wangen, en hals band,  
goudgeele hals, rozen roode  
borst, oranje buik, de zyden  
wit groen en bruin gevlaakt,  
de bek blaauw, met geel  
gerand. *BUFF. Hist. Nat. Ois.* 330.  
Woond in Maynas.

Roodhoofd (B) BAARDVOGEL, die groen is, het  
hoofd rood, de wangen geel,  
als

als ook de keel, een rozen  
coleure halsband, de buik  
grauw met zwart gevlacht.

Buff. *Hist. Nat Ois.* 331.

Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Zwarte (C) BAARDVOGEL, die zwart is, de  
kruyn en keel rood, de borst  
geelwit, de dekvederen der  
roeypennen gevlacht. BUFF.  
*Hist. Nat. des Ois.* 206. 1.

Bruine (D) BAARDVOGEL, die de kruin en  
keel rood heeft, het lighaam  
bruin, de borst geel, met  
zwart gevlacht. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 206. fig. 2.

LVII. KOEKKOEK. De *Bek* spilrondagtig, krom,

(CUCULUS.) [eenigzins mesgewyze.]

De *Neusgaaten*, met uitstee-  
kende randen.

De *tong* plat, pylsgewyze,  
geheel.

*Iste Deel IIdo Stuk.*

N

Twee

Twee voor- en twee agter-  
vingers.

Zingende 1. KOEKKOEK, met eene ronde staart,  
(*Cangrus.*) die zwartagtig is, met wit  
gestippeld \*.  
Woond in Europa.

Ooft-Indi- 2. KOEKKOEK, met eene ronde staart,  
sche het ligchaam zwartagtig  
(*Orientalis.*) groen; de bek bruyn. BUFF.  
*Hist. Nat. des Ois.* 274. 1.  
Woond in Ooft-Indien.

Gevlakte 3. KOEKKOEK, met eene ronde staart,  
(*Mindanen- het ligchaam goudgroen,  
sis.*) met bruyn en wit gevlakt,  
van onder wit en zwart ge-  
golfd. BUFF. *Ois.* 277.  
Woond in Mindanao.

Langbek 4. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze  
(*Vetula.*) staart, het ligchaam bruyn-  
agtig, van onder tegelrood,  
hairtjes aan de oogen.  
BRISS. *Ornith.* IV. pag. 116,  
tab. 17. fig. 2.  
Woond in Jamaica.

Spaan-



Spaansche 5. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze  
 (*Glandarius*.) staart, het hoofd met eene  
 kleine kuif, en eene zwarte  
 band aan de oogen. EDW. II.  
 tab. 57.  
 Woond in Afrika.

Senegalsche 6. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze  
 (*Senegallensis*.) staart, een grys ligchaam,  
 van onder wit, de kruin en  
 stuurvederen zwart. BRISS.  
*Ornith.* IV. pag. 120. tab.  
 8. fig. 1.  
 Woond in Senegal.

Bonte 7. KOEKKOEK, met eene wigsgewyze  
 (*Honoratus*.) staart, het ligchaam zwart-  
 achtig, met wit gevlaakt,  
 van onder wit en aschgrauw  
 gegolfd. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 294.  
 Woond in Malabar.

Gestippelde 8. KOEKKOEK, met eene wigvormige  
 (*Punctatus*.) staart, een zwartagtig lig-  
 chaam, ros gestippeldt, van  
 onder ros met zwarte stree-  
 pen,

pen, de stuurvederen ros gebandeert. *BRISS. Ornith. IV. p. 134. tab. 10. fig. 2.*  
Woond in Oost-Indien.

Gestreepte 9. **KOEKKOEK**, met eene wigvormige  
(*Naevius.*) staart, het ligchaam bruyn en roestverwig gestreept: de keel van onder met bruynestreepen, de stuurvederen, met roffe tippen. *BRISS. Ornith. IV. p. 128. tab. 9. f. 1.*  
Woond in Cayenne.

West-Indi- 10. **KOEKKOEK**, met eene wigvormi-  
sche ge staart, het ligchaam van  
(*Americanus.*) boven aschgrauw, van onder wit, het onderste kaakbeen geel. *CAT. Carol. I. 9. tab. 9.*  
Woond in Carolina.

Snepkoek- 11. **KOEKKOEK**, met een wigvormige  
koek ge staart, het ligchaam grys en  
(*Scolopaceus.*) bruin gewolkt. *EDW. Birds. II. pag. 59. tab. 59.*  
Woond in Bengale.

Zwar.

Zwarte  
(Niger.) 12. KOEKKOEK, met eene wigsgewy-  
ze staart, het ligchaam glanzig zwart, de bek geel. EDW.  
*Birds.* II. tab. 58.  
Woond in Bengale.

Van St. Domingo  
(Dominica-  
nus.) 13. KOEKKOEK, met eene wigsgewy-  
ze staart, het ligchaam grys  
bruyn, van onder witagtig,  
de drie zylyngsche ftuurve-  
ren met witte tippen. BRISS.  
*Ornith.* IV. pag. 110. tab. 9.  
fig. 26.  
Woond in St. Domingo.

Van Cayenne  
(Cayanus.) 14. KOEKKOEK, met eene wigvormi-  
ge staart, het ligchaam pur-  
per Castanje bruyn, alle de  
ftuurvederen aan de punt  
wit. BRISS. *Ornith.* IV. p.  
122. tab. 8. fig. 2. BUFFON.  
*Hift. Nat. Ois.* 211.  
b. dito kleine. BRISS. *Or-  
nith.* IV. pag. 124. tab.  
16. fig. 2.  
Woond in Cayenne.

Kaapfche (A) KOEKKOEK, die oranje kleurig ros is, de rug olyfcoleur, de buik wit, de roeipennen donker bruyn, de ftuurvederen aan de punt wit. BUFF, *Hift. Nat. des Ois.* 390.  
Woond aan de Caap.

Zwarte (B) KOEKKOEK, die zwart is, van onder graauw, de fchouders en randen der dekvederen wit, de bek rood. BUFFON, *Hift. Nat. des Ois.* 512.  
Woond in Cayenne.

Toulou. (C) KOEKKOEK, die ros is, de borst bleek rood, de buik en ftuurvederen zwart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 265. 1.  
Woond in Madagafcar.

Blaauwe 15. KOEKKOEK, met eene ronde ftart, (Caeruleus.) en blaauw ligchaam. BUFF, *Hift. Nat. Ois.* 295. 1.  
Woond in Madagafcar.

Chineefche 16. KOEKKOEK, met eene wigvormige

- (*Chinensis.*) ge korte staart, het ligchaam blaauw van onder wit, de punten met een witte vlak. BRISS. *Ornith.* IV. pag. 157. tab. fig. 2.  
Woond in China.
- Touraco 17. KOEKKOEK, met eene gelyke staart, (Perfa.) het hoofd gekuifd, het ligchaam groen, de roeipennen bloedrood. EDWARDS. *Birds.* I. pag. 7. tab. 7.  
Woond in Guinea.
- Brafiliaan· 18. KOEKKOEK, met eene gelyke staart, fche een gekuifd hoofd, een rood (Brafiliensis.) ligchaam, en geele ftuurvederen. SEBA *Schatk.* I. tab. 66. fig. 2.  
Woond in Brafil.
- Gekuifde 19. KOEKKOEK, met eene ronde staart, (Cristatus.) een gekuifd hoofd, het ligchaam blinkende afchgrauw groen. BRISS. *Ornith.* IV. pag. 149. tab. 12. fig. 2.  
Woond in Madagafcar.

VanCoro- 20. KOEKKOEK, met eene wigvormi-  
 mandel ge staart, het ligchaam *zwar-*  
 (Coroman- *agtig groen*, [de vleugels *ros*]  
*us*.) van onder wit, eene witte  
 halsband [en een witte vlak  
 onder de oogen.] BUFFON,  
*Hist. Nat. Ois.* 274.  
 Woond in Coromandel.

Gehoornde 21. KOEKKOEK, met eene wigvormige  
 (Cornutus.) staart, eene dubbele kuif,  
 en roestcoleurig ligchaam.  
 WILLUGBHY. *Ornith.* tab. 38.  
 Woond in Brasil.

Siamsche 22. KOEKKOEK, met twee zeer lange  
 (Paradisea.) stuurvederen, die aande punt  
 verbreedden, het hoofd ge-  
 kuifd, het ligchaam groen.  
 BRISS. *Ornith.* IV. p. 151.  
 tab. 14. fig. 1.  
 Woond in Siam.

LXVII DRAAYHALS. De *Bek* spilrond en  
 (YUNX.) puntig,

De

De *Neusgaaten* hol, en naakt.

De *Tong* spilrond, wormsgewyze zeer lang, en puntig uitloopende.

Twee *Voor-* en twee *agter-vingers*.

Draayhals 1. DRAAYHALS, die bruyn grys is, met wit en zwart gevlaakt, de *stuurvederen* met zwarte gegolfde banden, BRISS. *Ornith.* IV. pag. 2. tab. 1. fig 1.  
Woond in Europa.

LIX. SPECHT. De *Bek* heel hoekig regt met eene wigsgewyze punt.  
(PICUS.) De *Neusgaaten* met borstel hairen gedekt.  
De *Tong* rolrond, wormsgewyze zeer lang puntig, aan de punt met *agter* overleggende haairtjes.  
Twee *voor-* en twee *agter-vingers*.

[De fluurpennen puntig uitloopende.]

[De kruyn of het agterhoofd rood.]

Zwarte  
(*Martius.*) 1. SPECHT, die zwart is, met eene roode kruyn \*. ALBIN, *Ois.* II. pag. 26. tab. 27.  
Woond in Europa.

Witbek  
(*Principalis.*) 2. SPECHT, die zwart is, met eene roode kuif, aan wederzyden eene witte hals streep, de twee rei roeipennen wit \*. CATESB. *Carol.* I. 1. p. 16. tab. 16.  
Woond in Noord-America.

Gedekte  
(*Pileatus* .) 3. SPECHT, die zwart is, met eene roode kuif, de zyden van het hoofd ende vleugels met wit gevlokt. CATESB. *Carol.* I. p. 17. tab. 17.  
Woond in Virginien.

Gebandeer- 4. SPECHT, die zwart is, met eene roode



- de  
(*Lineatus.*) roode kuif, eene witte band  
aan weerzyden van den hals  
tot het midden vanden rug.  
BRISS. *Ornith.* IV. p. 31. tab.  
1. fig. 2.  
Woond in Cayenne.
- Zwaluw 5. SPECHT, die zwart is, met een  
specht rood agterhoofd, de schou-  
(*Hirundina-* ders wit gestipt. ALBIN. *Ois.*  
*ceus.*) III. tab. 23.  
Woond in Noord America.
- Muschspecht 6. SPECHT, die olyf groenachtig geel  
(*Pasferinus.*) is, van onder met bruin en  
wit gestreept, de kruin rood.  
BRISS. *Ornith.* IV. pag. 72.  
tab. 4. fig. 2.  
Woond in St. Domingo.
- Roodkop 7. SPECHT, die het hoofd-geheel rood  
(*Erythrocephalus.*) heeft, de staart en vleugels  
zwart, de binnenste roei-  
pennen wit. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 117. CATESB. *Carol.* I.  
tab. 20.  
Woond in Noord America.  
SPECHT,

- Oranje Specht (Aurantius.) 8. SPECHT, die van boven oranje is, de nek, stuit en stuurpennen zwart. BRISS. *Ornith.* IV. 78. tab. 6. fig. 1.  
Woond aan de Caap.
- Goudspecht (Auratus.) 9. SPECHT, die grys en zwart gestreept is, de borst en keel zwart, de bek rood, de stuit wit. CATESB. *Carol.* I. pag. 18. tab. 18.  
Woond in Canada.
- Van Carolina (Carolinus.) 10. SPECHT, met eene roode kruyn en nek, de rug met zwarte banden, de middelste stuurvederen wit, met zwart gestipt.
- Gegolfde 11. Geel roode SPECHT, met zwart gegolfd, en bloedroode wangen. EDW. *Glean.* IV. tab. 33<sup>1</sup>.  
Woond in Suriname.
- Groene (Viridis.) 12. SPECHT, die groen is, met eene roode kruin, [geele hals en stuit.]

stuit.] BUFFON: *Hist. Nat.*  
*Ois.* 371.

Bengaalsche 13. SPECHT, die groen is, met eene  
(*Bengalen-*  
*sis.*) roode kuif, eene zwarte nek  
van vooren en van onder  
wit met zwart gevlaakt. EDW.  
*Birds.* IV. 182.  
Woond in Bengale.

Halfbek 14. SPECHT, met de boven kaak kor-  
(*Semiro-*  
*stris.*) ter.  
Woond in Indien.

Ruige 15. SPECHT, met de rug overlangs ruig,  
(*Pubescens.*) de buitenste stuurvederen  
zwart, met vier witte vlak-  
ken. CATESB. *Carol.* I. p.  
21. tab. 21.  
Woond in Virginien.

Hairige 16. SPECHT, met de rug overlangs  
(*Villosus.*) hairig, de buitenste stuurve-  
deren wit. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 345. 1.  
Woond in Canada.

SPECHT,

- Groote (Major.) 17. SPECHT, die wit en zwart bont is, de stuit, en het agterhoofd rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 196. Woond in Europa.
- Middelbaane (Medius.) 18. SPECHT, die wit en zwart bont is, de kruyn en beneden rug rood. PENNANT. *Zool. Britt.* tab. E. Woond in Europa.
- Kleine (Minor.) 19. SPECHT, die wit en zwart bont is, met eene roode kruyn, de beneden rug bruinrood. ALBIN. *Ois.* I. pag. 27. tab. 20. Woond in Europa.
- Bonte (Varius.) 20. SPECHT, die wit en zwart bont is, met eene roode kruyn, de benedenrug wit, met bruyn gestreept. CAT. *Carol.* I. pag. 21. tab. 21. Woond in de Bahama Eilanden.
- Drievinge- 21. SPECHT, die een geele of roode kruyn

rige  
(*Tridactylus.*) kruyn heeft, wit en zwart bont is, met drie vingeren. EDW. *Birds.* III. tab. 114. Woond in Europa en America.

Geelrug (A) SPECHT, met eene roode kruyn en hals, geele rug, en roeipennen, de vleugels groen met geel gestipt, de buik wit met zwart gegolfd, de stuurpennen zwart, de wangen, en het voorhoofd bruyn. BUFFON. *Hist. Nat. des Ois.* 345. Woond in Senegal.

Goertan (B) SPECHT, die olyfgroen is, met een roode kruyn, en beneden rug van onder wit. BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* 320. Woond in Senegal.

Gestreepte (C) SPECHT, die zwart is, met geelagtig groen gestreept, de kruin en beneden rug bloedrood,

rood, de buik geel. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 281.  
 Woond in St. Domingo.

Geele (D) SPECHT, die geelis, gekuifd, met  
 eene roode streep, aan den  
 bek, de dekvederen der roei-  
 pennen zwart, de roeipen-  
 nen bruyn, de stuurpennen  
 zwart. BUFF. *Hist. Nat. des*  
*Ois.* 509.  
 Woond in Cayenne.

Fraaye (E) SPECHT, die bruyn rood is, met  
 eene geele kuif en beneden  
 rug, de rug en vleugels met  
 witte maantjes, de wangen  
 rood, de stuurvederen zwart.  
 BUFFON. *Hist. Nat Ois.* 524.  
 Woond in Cayenne.

LX. GRAAUWSPECHT. De *Bek* elsgewyze spil  
 (SITRA.) rond recht, verlengd,  
 en zeer geheel.  
 Het bovendeele wat lan-  
 ger;

ger : met een zaamgedrukte punt.

De *Tong* uitgerand, en ingefcheurd.

De *Neusgaaten* met hairtjes gedekt.

De *Pooten* met drie voor en eene agtervinger.

Europifche 1. GRAAUWSPECHT, met zwarte ftuurvederen, de vier zydelingfche aan de punt wit. BRISS. *Ornith.* III. pag. 588. tab. 29. fig. 3. *Torchepot.*

b. GRAAUWSPECHT, met een zwart hoofd. CATESB. *Carol.* I. tab. 22. Woond in Europa en America.

Van Canada 2. GRAAUWSPECHT, met witte wenkbraauwen, [*het ligthaam afchgraaaw, en van onder ros.*] BRISS. *Ornith.* III. pag. 593. tab. 29. fig. 4.

Woond in Canada.

Iste. Deels. IIde Stuk. O

GRAAUW:

Van Jamaica 3. GRAAUWSPECHT, met eene zwarte  
 (*Jamaicensis.*) kruyn. SLOANE *Voyag.* II.  
 pag. 300. tab. 259. fig. 1.  
 Woond in Jamaica.

LXI. TOMTIT. (\*) De *Bek* elsgewyze wat plat,  
 (TODUS.) stomp, recht, aan het  
 grondstuk met hairtjes.  
 De *pooten* met drie voor en  
 eene agter vinger.

Groene 1. TOMTIT, die groen is, met eene  
 (*Viridis.*) roode borst. EDWARDS *Birds.*  
 III. 121. tab. 121. fig. 2.  
 Woond in America.

Afchgrauwe 2. TOMTIT, die afchgrauw is, en  
 (*Cinereus.*) van onder geel. EDW. *glean.*  
 II. tab. 262. fig. 1.  
 Woond in Suriname.

YS.

(\*) GEEN Hollandfche Naam voor dit geflagt (dat zeer  
 na aan de *Vliegevangens* grenst, vindende, heb ik de Ame-  
 ricaanfche Landnaam behouden). De Heer BRISSON noemt  
 het in Franfch *Todier*.



LXII. YSVOGEL. De *bek* driehoekig, lang,  
(ALCEDO.) recht, en dik.

De *tong* vleeschig, zeer kort,  
plat en scherp.

De *pooten* met drie voor- en  
een agtervinger in de  
meeste.

Gekuifde 1. YSVOGEL, met eene korte staart,  
(*Cristata.*) gekuifd hoofd, blaauw lig-  
chaam, roffe buik, de kuif  
met zwart gegolfd. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois. 77. Martin-  
pecheur.*

Indiaanfche 2. YSVOGEL, met eene korte staart,  
(*Inda.*) van bovengroen, van onder  
ros, met eene gewolkte hals-  
band [*de vleugels met witte  
stippen, en een roffe band om  
de oogen.*] EDW. *glean. III.*  
335.  
Woond in West-Indien.

Inlandsche 3. YSVOGEL, met eene korte staart,  
(*Ispida.*) van boven blaauw, van on-  
O 2 der

der geel ros, met een roffe  
bekstreep \*. EDW. *Birds.* I.  
tab. 11.

Woond in Europa.

Purperhoofd 4. YsVOGEL, met eene korte staart,  
(*Erethaca.*) eene blaauwe rug, geele  
buik, het hoofd en stuit pur-  
per, de keel en hals wit. AL-  
BIN. *Ois.* III. p. 28. tab. 29.

[ b. YsVOGEL, met eene  
korte staart die blaauw is,  
van onder geel, het hoofd  
en stuit purperagtig castanie  
bruin. LINN. *mant. alt.* pag.  
524. VOSMAER. *beschrjv.* IV.  
van de Vogels.

Woond in Oost-Indien.

Van Madag- 5. YsVOGEL, met eene wat korte staart,  
gascar. het lichaam ros, de keel  
(*Madaga- geel, de roeipennen zwartag-  
scarcensis.*) tig. BRISS. *Ornith.* IV. pag.  
508. tab. 38. fig. 1.

Woond in Madagascar.

Groene (Supercilio-  
sa.) 6. YsVOGEL, met eene wat korte staart,  
van onder wit, met eene  
groene band en geele wink-  
braauwen. EDW. *Glean.* III.  
tab. 245.  
Woond in America.

Roode (A) YsVOGEL, met eene korte staart,  
het ligchaam rood, van onder  
geel bruyn, de kop en slag-  
pennen groen, de keel wit \*.  
VosM. *beschryv.* tab. III.  
Woond in America.

NB. Deze heeft twee voor en twee  
agtervingers.

Groenkuif (B) YsVOGEL, met eene korte staart,  
blauw ligchaam, groene  
kruyn, oranje buik, witte  
keel, en zwarte slagpennen.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 356.  
Woond in Senegal.

Alcyon (Alcyon.) 7. Langstaartige YsVOGEL, met eene  
kuif, het ligchaam blauwag-  
tig, de borst roestcoleurig, ee-  
ne witte vlak agter en voor de

oogen \*. CATESB. *Carol.* I.  
tab. 69.

(b) gekuifde van St. Domin-  
go. EDW. *birds.* III. tab.

115.

Woond in America.

Gekraagde 8. YsVOGEL, met eene lange staart,  
(*Torquata.*) grys blaauw, met eene witte halsband, de staart en vleugels met wit gevlaakt.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 284.  
Woond in Mexico.

Kaapfche 9. YsVOGEL, met eene lange staart,  
(*Capensis.*) afchgrauw blaauw, van onder geelros, de borst bleek rood, de bek rood. BRISS. *Ornith.* IV. pag. 488. tab. 36 fig. 3.  
Woond aan de Kaap.

Senegalfche 10. YsVOGEL, met eene lange staart,  
(*Senegallensis.*) het ligchaam blaauw, van onder wit, het hoofd grys, de dekvederen der vleugelen  
zwart,

zwart. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 334.  
Woond in Senegal.

Witkop. (C) YsVOGEL, met eene lange staart, het hoofd met eene blaauwe weerfchyn, de buik oranje, het ligchaam donker blaauw, de dekvederen zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 356.  
Woond in Senegal.

Turkfche 11. YsVOGEL, met eene lange staart, die benevens de rug, en (Smyrnenfis.) vleugels groen is. EDW. *Birds.* I. p. 8. tab. 8.  
Woond in Afia en Africa.

Bonte Vis- 12. YsVOGEL, met eene lange staart, fcher die wit en zwart is. BUFF. (Rudis.) *Hist. Nat. des Ois.* 62. EDW. 9. tab. 9.

Van de Ber- (D) Langstaartige YsVOGEL, die de bices kop goudgroen, de kin zwart, de keel wit, de borst en buik okerverwig, het lyf vermiljoen,

joen, met eene goudglans, de vleugels goudgroen, de eerste slagpen zwart, en de stuurvederen groen rood, blaauw en zwart heeft \*.

VOSM. *beschryv.*

Woond in de Berbices.

Godinnetje 13. YsVOGEL, met twee zeer lange stuurvederen, die in het midden dun zyn, het ligchaam zwart blaauw, de vleugels groen \*. BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* 116.

Woond in Suriname.

Fraaye 14. YsVOGEL, met twee zeer lange stuurvederen, het ligchaam goudgroen, twee voor en twee agtervingeren. EDW. *Birds.* I. pag. 10. tab. 10. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 271. *Jacamar.*

Woond in Cayenne en Suriname.

Jacamare 15. YsVOGEL, met eene wigvormige staart

(*Galbula.*)

staart, het ligchaam goud-  
groen, van onder ros, de  
pooten met twee voor- en  
twee agtervingeren. EDW.  
*glean.* II. tab. 334. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 238.  
Woond in Brasfil en Cayenne.

LXIII. BYENEETER. De *bek* krom, plat, ge-  
(MEROPS.) kield, [en puntig.]

De *tong* aan den punt ge-  
spleeten.

De vingers 3. — 1.

Byeneete,  
(*Apiaster.*)

1. BYENEETER, met eene roestcoleuri-  
ge rug, de buik en staart zee-  
groen, de keel geel, de twee  
stuurvederen zeer lang \*.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 314.

Woond in het Oosten [en  
in Senegal.]

Groene  
(*Virens.*)

2. BYENEETER, die groen is, met ee-  
ne zwarte borstband, de  
staart en keel blaauw, en

O 5

twee

twee lange stuurvederen.  
EDW. *Birds*. IV. 183.

Blaauwbuik (A) BYENEETER, die bruyn is, de  
buik blaauw, de vleugelszee  
groen, met twee lange stuur-  
vederen. BUFF, *Hist. Nat.*  
*des Ois*. 252.

Woond in Isle de France.

Geelkop 3. BYENEETER, die geelachtig is, met  
(*Congener.*) eene groene stuit, de roeipen-  
nen aan de punt rood, ende  
stuurvederen aan hun begin  
geel. WILLUGBH. *Ornith*. 103.  
Woond in Zuid Europa.

Van Mada- 4. BYENEETER, die groen is, met ee-  
gascar ne witte streep, boven en  
(*Supercilio-* onder de oogen, de keel geel-  
*fus.*) agtig en twee lange stuurve-  
deren. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois*. 259.

Woond in Madagascar,

Philippyn- 5. BYENEETER, die groen is, van on-  
sche der geelagtig, de stuit rood,  
de



(Philippi-  
nis.)

de staart gelyk. [een zwarte  
vlak aan de oogen.] BUFFON.  
*Hist. Nat. Ois.* 57.

Woond in de Philippynsche  
Eilanden,

Afchgrau- 6. BYENEETER, die rood en geel bont  
we  
(*Cinereus.*)

is, van onder geelagtig rood,  
de twee staarvederen zeer  
lang, en rood. SEBA, *Schatk.*  
I. pag. 50. tab. 31. f. 10.  
Woond in America.

Kaffer  
(*Cafer.*)

7 BYENEETER, die grys is, met een  
geele benedenrug, en zeer  
lange staart\*. BURMAN. *Kaap-  
sche Vogelen.*

Kleine

(B) BYENEETER, die groen is, met  
eene geele keel, ligt bruine  
buik, de roei en slagpennen  
rood, met zwarte tippen.  
BUFF, *Hist. Nat. Ois.* 318.  
Woond in Senegal.

Groote

(C) BYENEETER, die ligt olyf groen  
is, met cenige roode staar  
roei-

roeipennen. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 454.

Woond in Cayenne,

LXIV. HOP. De *bek* krom, verheven, wat plat,  
(UPUPA.) en niet scherp.

De *Tong* stomp, geheel, driehoek  
en kort.

De vingers. 3—1.

Hop 1. HOP, met eene gevlaakte kuif \*,  
(EPOPS.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 52.

Woond in Europa en in  
Oost-Indien.

Ongekuifde 2. HOP, met zes stuurvederen, de  
(PROMEROPS.) middelste de langste [van bo-  
ven bruyn, van onder wit.]

BRISS. *Ornith.* II. pag. 461.  
tab. 43. fig. 2.

Woond aan de Caap.

GekuildePa-3. HOP. met twee zeer lange stuurve-  
radysvogel

(PARADISEA.) 40. tab. 30. fig. 5.

Woond in Aflen.

BOOM-

LXV. BOOMKRUIPERTJE. De *bek* dun, krom,  
(CERTHIA.) fcherp, wat drie-  
hoekig.

De *tong* fcherp.

De Vingers 3 — 1.

Gemeene 1. BOOMKRUIPERTJE, dat grysis, van  
(*Familiaris.*) onder wit, met twee bruine  
roepennen, met witte vlak-  
ken, tien stuurvederen. AL-  
BIN. *Ois.* III. tab. 25.

Woond in Europa.

Muurkruiper 2. BOOMKRUIPERTJE, dat afchgrauw  
(*Muraria.*) is, met eenē roode vlak op  
de vleugels. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 372.

Woond in Zuid Europa.

Klein 3. BOOMKRUIPERTJE, dat grysis, van  
(*Puffilla*) onder wit, met witte wenk-  
brauwen, de stuurvederen  
bruyn, aan de tippen wit.  
EDW. *Birds.* I. tab. 26.

Woond in Ooft-Indien.

(*Capensis.*) 4. BOOMKRUIPERTJE, dat grysis, met  
zwart-

zwartagtige stuurvederen,  
de buitenste naar buiten,  
met wit gezoomd. BRISS.  
*Ornith.* III. pag. 618. tab. 31.  
fig. 1.

Olyfcoleu- 5. BOOMKRUIPERTJE, dat olyfcoleurig  
rige is, van onder grys, met wit-  
(*Olivacea.*) achtige oogkringen. BRISS.  
*Ornith.* III. pag. 625. tab.  
33. fig. 1. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 575. 1.  
Woond in Madagafcar.

Gryze 6. BOOMKRUIPERTJE, dat olyfcoleurig  
(*Curucaria.*) is, van onder geel, de stuur-  
vederen alle even groot.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 576. 1.  
Woond in de Philippynsche  
Eilanden en Ceilon.

Twyffelag- (A) BOOMKRUIPERTJE, dat olyfco-  
tige leurig is, van onder wit, de  
borst met zwarte vlakken,  
de stuurvederen puntig uit-  
loopende \*.  
Woond in Europa.

Dit

NB. Dit zeldzaam soort had de borst gevlacht, als een Lyfter, de ftuurvederen puntig als de Spechten, de bek en houding als de Boomkruipers.

Purperkeel 7. BOOMKRUIPERTJE, dat gryis is, van  
(*Fugularis.*) onder geel, de keel violet,  
de twee buitenfte ftuurvederen aan de punt geel. BUFF.  
*Hift. Nat. Ois.* 776. 3.  
Woond in de Philippynfche  
Eilanden.

Blaauwe 8. BOOMKRUIPERTJE, dat blaauw is,  
(*Coerulea.*) met een zwarte oogband,  
keel, roey, en ftuurvederen\*.  
EDW. *Birds.* I. tab. 21.  
Woond in Indien.

Van Cayenne 9. BOOMKRUIPERTJE, dat glanzig groen  
is, van onder wit geftreept,  
(*Cayana.*) de ftuurvederen groen, de  
binnenfte van boven zwart.  
BRISS. *Ornith.* III. pag. 636.  
tab. 23. fig. 2.  
Woond in Cayenne.

BOOM-

- Staalband (Chalybea.) 10. BOOMKRUIPERTJE, dat glanzig groen is, met eene roode borst, een staalkleurige band van vooren. EDW. *Glean.* II. 265. fig. 1. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 246. fig. 3.  
Woond in Indiën.
- Afrikaan- sche (Africana) 11. BOOMKRUIPERTJE, dat groen is, met eene witte buik, roode borst en blaauwe stuit. EDW. *Glean.* III. tab. 347. fig. 1.  
Woond aan de Kaap.
- Spiza (Spiza.) 12. BOOMKRUIPERTJE, dat groen is, met een zwart hoofd, en slagpennen. EDW. *Birds.* I. tab. 25. f. 1. 2.  
Woond in Braziliën en Surinamen enz.
- NB. Dit is geen Boomkruiper, maar een vliegevangster.
- Purpere (Purpurea.) 12. BOOMKRUIPERTJE, dat van boven purper, van onder vermilioen is, het hoofd, de keel, en stuit violet. BRISS. *Ornith.* III.

III. pag. 655. tab. 31. f. 2. 3.

Senegalsche 14. BOOMKRUIPERTJE, dat zwartagtig  
(*Senegallensis*.) violet is, de kruin en keel  
goudgroen, de borst carmyn-  
rood. BRISS. *Orinth.* III. p.  
660. tab. 34. f. 2.  
Woond in Senegal.

Groenkeel 15. BOOMKRUIPERTJE, dat zwartagtig  
(*Gutturalis*.) is, met eene glanzig groene  
en purpere borst. BRISS. *Or-  
nith.* III. pag. 658. tab. 33.  
fig. 3.  
Woond in Brasil.

Blaauwkeel (B) BOOMKRUIPERTJE, dat groen is,  
de keel glanzig blaauw en  
purper, de borst carmyn-  
rood, de buik geel, de stuur-  
vederen ligt bruyn. BUFF.  
*Hist. Nat.* 246. I.  
Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Americaan- 16. BOOMKRUIPERTJE, dat geel is,  
sche van boven olyfgroen, de  
*Iste. Deel. IIde Stuk.* P vleit-

(Pinus.)

vleugels met twee witte banden. EDWARDS. *glean.* II. tab. 277. fig. 2.

Woond in Noord America.

NB. Dit is geen Boomkruiper.

Afchgrauwe (C) BOOMKRUIPERTJE, dat van boven afchgrauw is, van onder

geel, de keel violet, de dekvederen blaauwagtig, de slagpennen bruyn. BUFFON. *Hift. Nat. des Ois.* 576. 2.

Woond in de Philippynsche Eilanden.

Driekleurige (D) BOOMKRUIPERTJE, dat groen is, van onder geel, de borsten

keel violet. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 576. 4.

Woond in de Philippynsche Eilanden.

Roode (Bruentata.) 17. BOOMKRUIPERTJE, dat zwartagtig blaauw is, met eene roode

kruin, hals, rug en stuit. EDW. *Birds.* II. tab. 81.

Woond in Bengale.

BOOM.



**Geele** 18. BOOMKRUIPERTJE, dat zwart is,  
*(Flaveola.)* van onder geel, witagtige  
 wenkbraauwen, de buitenfte  
 ftuurvederen aan de punt  
 wit heeft. EDW. *Birds.* III.  
 Woond in America.

**Fraaye** 19. BOOMKRUIPERTJE, dat de twee  
*(Pulchella.)* middelste ftuurvederen, het  
 ligchaam groen, en de borft  
 rood. SEBA *Schatk.* II. tab.  
 7. fig. 2.  
 Woond in Senegal.

**Beroemde** 20. BOOMKRUIPERTJE, dat de twee  
*(Famofa.)* middelste ftuurvederen zeer  
 lang heeft, het ligchaam  
 glanzig groen, de oxels geel,  
 en eene zwarte oogftreep.  
 BUFF. *Hift. Nat. Ois.* tab. 83.  
 fig. 1.  
 Woond aan de Caap.

**Philippynfch** 21. BOOMKRUIPERTJE, met twee zeer  
*(Philippina.)* lange middel ftuurvederen,  
 het ligchaam grys-groen, van  
 onder witagtig geel BRISS. *Orn.*

III. pag. 613. tab. 30. fig. 2.

Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Violette 22. BOOMKRUIPERTJE, met twee lan-  
(*Violacea.*) ge stuurvederen, het lig-  
chaam blinkend violet, borst  
en buik geel. BRISS. *Ornith.*  
III. pag. 623. tab. 33. f. 6.  
Woond in Ceylon.

Blaauwe 23. BOOMKRUIPERTJE, dat blaauw is,  
(*Cyanea.*) met eene swarte oogstreep,  
schouders, vleugels, en staart.  
EDW. *glean.* III. pag. 114.  
tab. 264. f. i. BUFF.  
Woond in Brasil, Cayenne,  
de Caap.

Ceylonfche 24. BOOMKRUIPERTJE, met een groen  
(*Zeilonica.*) hoofd, roestcoleurigen rug,  
geele buik, blaauwe keel,  
en stuit. BRISS. *Ornith.* III.  
pag. 623. tab. 34. f. 4.  
Woond in Ceilon.

Koperborst. 25. BOOMKRUIPERTJE, dat blaauw is,  
met

je  
(*Lotenia*.)

met eene goudroode band,  
en zwarte oogstreep. BRISS.  
*Ornith.* III. pag. 641. tab.  
33. f. 45.  
Woond in Ceylon.

Violetvlak (E) BOOMKRUIPERTJE, dat glanzig  
groen is, met eene violette  
vlak op de vleugels en borst,  
de buik zwart in het man-  
netje, wit in het wyfje. BUFF.  
*Hist. Nat. des Ois.* tab. 575.  
f. 2. 3.

Woond in Madagascar.

LXVI. BLOEMZUIGERTJE. De *bek* elsgewyze  
van voren pypag-  
tig langer dan het  
hoofd. Het boven  
kaakbeen het on-  
derste influitende.  
De tongdraadagtig  
met twee zamen-  
loopende draaden,  
[De pooten zeer

P 3

kort]

kort] 3. voor en  
1 agtervinger.

Van Mexico 1. BLOEMZUIGERTJE, met eene kromme bek, dat rood is, met blaauwe vleugelen, het hoofd gekuifd, de middelste stuurvederen zeer lang. SEBA *Schatk.* I. pag. 97. tab. 61. f. 4.  
Woond in Mexico.

Roode Lang-2. BLOEMZUIGERTJE, met eenen kromme staart, dat rood is, met een bruin hoofd, een gouden keel en groene stuit, de middelste stuurvederen zeer lang. EDW. *Birds.* I. tab. 32. f. 2.  
Woond in Zuid America,

Bruin 3. BLOEMZUIGERTJE, met eene kromme bek, dat glanzig bruin is, met zeer lange stuurvederen, de buik roodagtig, de winkbrauwen wit. BRISS. *Ornith.* III. tab. 35. f. 5.  
BLOEM-

Honingdief-4. BLOEMZUIGERTJE, met eene krom-  
 je me bek, dat groenachtig is,  
 (*Polytmus.*) met lange ftuurvederen, de  
 kruyn en ftuurvederen bruin.  
 EDW. *Birds.* I. tab. 34.  
 Woond in America.

Schaerftaert 5. BLOEMZUIGERTJE, dat groen is,  
 (*Fortifica-* de zylyngsche zeer lang, de  
*tus.*) kruyn en ftuurvederen  
 blaauw. EDW. *Birds.* I. tab.  
 33. fig. 33.  
 Woond in Jamaica.

Witftaart 6. BLOEMZUIGERTJE, met een krom-  
 (*Leucurus.*) me bek, dat goudgroen is,  
 met gelyke ftuurvederen, die  
 wit zyn, eene roode hals-  
 band. EDW. *Glean.* II. tab.  
 256. fig. 1.  
 Woond in Suriname.

Bloedkeel 7. BLOEMZUIGERTJE, met een krom-  
 (*Fugularis.*) me bek, dat blaauwagtig is,  
 de hals van onder bloedrood\*.  
 EDW. *Glean.* II. tab. 266.  
 fig. 1.

Verwonder-8. BLOEMZUIGERTJE, dat glanzig groen  
lyk is, de stuurvederen met wit  
(*Thauman-* is, de stuurvederen met wit  
*tias.*) gezoond, de buitenste van  
buiten wit \*. SEBA *Schatka-*  
*mer* I. tab. 59. fig. 5.  
Woond in Zuid America.

Van St. Do-9. BLOEMZUIGERTJE, dat glanzig groen  
mingo is, van onder afchgrauw,  
(*Dominicus.*) de stuurvederen in het mid-  
den roestverwig, aan de punt  
wit. BRISS. *Ornith.* III. pag.  
672. tab. 35. fig. 4.  
Woond in St. Domingo.

Fluweelach-10. BLOEMZUIGERTJE, met een krom-  
tig me bek, de stuurvederen van  
(*Holoseri-* boven zwart, een groen lig-  
*ceus.*) chaam blaauwe, borstband,  
en zwarte buik. EDW. *Birds.*  
I. 36. tab. 36.  
Woond in Mexico.

Colibri 11. BLOEMZUIGERTJE, met eene regte  
(*Colubris.*) bek, zwarte stuurvederen, de  
drie uiterste roestcoleurig,  
met witte tippen, de keel  
vuur

vuur colour. EDW. *Birds*. I.

38.

Woond in America.

Ourisia 12. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-  
 (Ourisia.) ten bek, goudgroen, byna  
 gelyke ftuurvederen, die  
 bruynagtig goud zyn, zwart-  
 te flagpennen, en eene blaau-  
 we buik.  
 Woond in Indien.

Blaauwhals (A) BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-  
 ten bek, groen ligchaam,  
 blaauwe hals en buik, de vleu-  
 gels en ftart bruyn\*. BUFF.  
*Hift. Nat. Ois.* tab. 227. f. 3.  
 Woond in Cayenne.

Bloemzuiger 13. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-  
 (Mellifugus.) ten bek, goudgroen ligchaam,  
 blaauwe ftuurvederen, zwart  
 blaauwe flagpennen, geveder-  
 de Dyen. EDW. *glean.* III.  
 360. fig. 1.  
 Woond in . . . . .

- Pegafus 14. BLOEMZUIGERTJE, met eenen rechten bek, goudgroenagtig ligchaam, van onder grys, de pooten gevederd \*. BRISS. *Ornith.* III. tab. 36. fig. 4. Woond in Cayenne.
- (*Pegafus.*)
- Zwarte 15. BLOEMZUIGERTJE, met eenen rechten bek, een zwart ligchaam, van onder goud couleur, witte dekvederen der staart, gevederde pooten. BRISS. *Ornith.* III. tab. 36. fig. 8.
- (*Niger.*)
- Gekuijde 16. BLOEMZUIGERTJE, met eenen rechten bek, bruyne vleugels, eene graauwbruyne buik, eene blaauwagtige kuif, [de keel en borst violet.] EDW. *Birds.* I. tab. 37. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 227. f. 1. Woond in America.
- (*Cristatus.*)
- Roodkuif 17. BLOEMZUIGERTJE, dat groenagtig goud is, met roestcolourige stuurvederen, die aan de tippen zwart zyn, met eene roode
- de



de afhangende kuif. EDW.  
*glean.* III. tab. 344.  
 Woond in Oost-Indien.

Witbuikje 18. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-  
 (Mellivorus.) ten bek, zwarte stuurvede-  
 ren, de zylingfche wit, het  
 hoofd blaauw, de rug groen,  
 de buik wit. EDW. *Birds.* I.  
 tab. 35. f. 1.  
 Woond in Indien.

Rood 19. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-  
 ten bek, de zylingfche stuur-  
 vederen violet, een bleek  
 rood ligchaam met bruyn ge-  
 vlakt. EDW. *Birds.* 32. f. 1.  
 Woond in Suriname.

Vliegvogelt-20. BLOEMZUIGERTJE, met eenen reg-  
 je ten bek, de zylingfche stuur-  
 vederen van buiten wit, het  
 ligchaam glanzig groen, van  
 onder witagtig. EDW. *Birds.*  
 III. tab. 105.  
 Woond in America.



### III. WATERVOGELN.

#### [ A N S E R E S.]

*De bek stomp met 'een vlies bekleedt, onder het grondstuk bultig, met een puntie aan het einde, de keel getand. De Tong vleeschig. De pooten gevleesde Zwempooten. [Een lange hals, eneyrondagtig ligchaam.]*

LXVII. EEND. De *bek* plaatagtig getand ver-  
 (ANAS.) heven, stomp.  
 De *Tong* hairig stomp.  
 a De *bek* aan het grondstuk  
 bultig.

Zwaan 1. EEND, met een halfronde zwarte bek,  
 (Cygnus.) geelwafchen wit ligchaam \*,  
 EDW. *Birds.* III. 150.  
 (b) Tamme Zwaan met  
 zwartknobbelig wafch.

EEND,

WildeZwaan 2. EEND, met eene halfrolronde bek,  
(*Cygnoides.*) bultig wafch en gezwollen  
oogleden. ALBIN. *Ois.* I.  
pag. 89. tab. 91.  
Woond in Spanje.

Gewapende 3. EEND, met eene half rolronde bek,  
(*Gambensis.*) bultig wafch en gedoornde  
fchouders. WILLUGBHY *Or-*  
*nith.* pag. 275. tab. 61.  
Woond in Gambia.

Brand-gaïs 4. EEND, met een ingedrukte bek,  
(*Sadorna.*) een plat voorhoofd, een  
zwarte groene kop, het lig-  
chaam uit [ros] zwart en wit  
gemengeld\*. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 53.  
Woond in Europa.

Aanziene- 5. EEND, met een bultige bek, die  
lyke zamengedrukt is, de keel  
(*Spectabilis.*) vederachtig zwart, het hoofd  
grys. EDW. *birds.* III. 154.  
Woond in Canada.

EEND,

Zwartbruyn 6. EEND, dat zwartagtig is, met het  
(*Fusca.*) onder ooglid en de vleugel-  
streep wit. BRISS. *Ornith.*  
VI. pag. 423.  
Woond in Europa.

Zwarte 7. EEND, met het grondstuk van den  
(*Nigra.*) bek bultig, het geheele lig-  
chaam zwart. BRISS. *Ornith.*  
VI. pag. 420. tab. 38. f. 2.  
Woond in Europa.  
(b) *De bek aan het grond-  
stuk effen.*

Witvlak 8. EEND, dat zwart is, de schouders  
(*Marila.*) afchgrauw gewolkt, een  
witte vlak op de vlerken.  
Woond in Noordwegen.

Gans 9. EEND, met eene halve rolronde  
(*Anser.*) bek, het ligchaam van boven  
afchgrauw, van onder bleek,  
de hals gestreept \*.  
(b) *De gans die bruin is,  
van Canada. EDW. 153.*  
Woond in Canada.

EEND,

Egyptifche 10. EEND, met eene half rolronde  
 (*Egyptiaca.*) bek, een gegolfd ligchaam,  
 de kruyn wit, en de vlak  
 der vleugelen wit, met een  
 zwarte band. *BUFF. Hist. Nat.*  
*des Ois.* 379.  
 Woond in Egypte.

Noordsche (A) EEND, dat wit is, met een geel  
 Gans voorhoofd, de roeipennen  
 halverweg zwart. *PALL. Specil. Zool fasc.* VI. p. 32.  
 Woond in Rusland.

Blaauwach- 11. EEND, dat gryns is, met een wit  
 tig voorhoofd, de dekvederen,  
 (*Coeruleus.*) en beneden rug blaauw.  
*EDW. Birds.* III. 152.  
 Woond in Canada.

NB. Deze zyn Ganzen.

Rotgans 12. EEND, dat bruyn is, de hals en  
 (*Bernicla.*) borst zwart, met een witte  
 halsband.  
 Woond in Europa.

Roodhals 13. EEND, met een zwarte kop, don-  
 ker

ker roffe hals, de borst wit,  
 en zwart gevlaakt, de rug en  
 vleugels zwart, de ftuurvede-  
 ren gryf. PALL. *Spicil Zool.*  
 VI. p. 22. tab. 4.  
 Woond in Noord Barbary-  
 en.

Gans van 14. EEND, dat afchgrauw is, het  
 Canada hoofd en ha's zwart, de koo-  
 nen, en keel wit. BUFFON:  
*Hift. Nat. Ois.* 346.

Eydervogel 15. EEND, met eene rolronde bek,  
 (*Moliffima.*) het wafch van agter gefchei-  
 den en ruw. EDW. *Birds.*  
 II. 98. BUFF. *Hift. Nat. Oif.*  
 208, 209.  
 Woond in Noord Europa.

MufcusEend 16. EEND, met naakte tepelachtige  
 (*Mofchata.*) wangen. MARSIGL. *Danub.*  
 V. pag. 116. tab. 56. 57.

Eend van Ba- 17. EEND, dat gryf is, met eene  
 hama. loodcoleurigen bek, met eene  
 (*Bahamensis.*) roffe vlak ter zyden, de vleu-  
 gelen

gelengeel en groen. CATESB.  
*Carol.* I. tab. 63.  
 Woond in Indien.

Wittertje 18. EEND, dat wit is, met eene zwarte rug en stuurvederen, het hoofd blaauw, het agterhoofd wit \*. EDW. *Birds.* tab. 100.  
 (*Albeola.*)  
 Woond in America.

Breedbek 19. EEND, met den bek aan het eind verbreed en rond, met een krom haakje. CATESB. *Carol.* tab. 96. BRISS. *Ornith.* IV. tab. 32. fig. 1.  
 (*Clypeata.*)  
 Woond in Europa en America.

Quakertje 20. EEND, met de vlak der vleugelen zwart, wit en ros \*.  
 (*Strepera.*)  
 Woond in Europa.

Wintertaling 21. EEND, dat witagtig is, met zwarte rug en stuurvederen, de kop van boven en van onder gezwollen, en glanzig (*pur-*  
 (*Hyberna.*)

per of groen.) CAT. Carol. I.  
tab. 95.

Woond in America.

Van St. Do-22. EEND, met een van vooren roeft-  
mingo verwig hoofd, een sneeuw  
(*Dominica.*) witte vlak op de vleugels,  
de schaften der stuurvederen  
zeer zwart. BRISS. *Ornith.*  
VI. tab. 41. fig. 2.  
Woond in Zuid America.

Roeper 23. EEND, dat wit en zwart bont is,  
(*Clangula.*) met eene violet coleurige  
dikke kop, en eenenzwar-  
te vlek by de gaping. AL-  
BIN. *Ois.* I. pag. 92. tab. 96.  
Woond in Europa.

Graauwe 24. EEND, dat bruin graauw is, met  
taling eene witte vlak aan de ooren  
(*Rustica.*) en vleugels. CATESB. *Carol.*  
I. pag. 98. tab. 98.  
Woond in America.

Bril Eend. 25. EEND, dat zwart is, met eene  
witte



- (*Perspicilla-*  
*ta.*)      witte kruyn en nek, en ee-  
 ne zwarte vlak agter de neus-  
 gaaten. EDW. *birds.* III. p.  
 155. tab. 155.  
 Woond in Canada.
- Bruinetje    26. EEND, met een zwartagtig lig-  
 (*Glaucion.*)      chaam, eene gewolkte borst,  
 en een witte streep, op de  
 vleugels. BRISS. *Ornith.* VI.  
 pag. 406. tab. 36. fig. 1. 2.  
 Woond in Europa.
- Fluiter      27. EEND, dat de staart wat puntig  
 (*Penelope.*)      heeft, de stuit zwart, het  
 hoofd bruyn, het voorhoofd  
 wit, de rug afchgrauw ge-  
 golfd. WILLUGBH. *Ornith.*  
 tab. 72.  
 Woond in Europa.
- Langstaart 28. EEND, met eene lange puntige  
 (*Acuta.*)      staart, van onder zwart.  
 BRISS. *Ornith.* VI. p. 369.  
 tab. 34. fig. 1. 2.  
 Woond in Europa.

Yslandsch 29. EEND, met een wigsgewyze staart,  
Eend de middelste stuurpennen zeer  
(*Hyemalis.*) lang, de slaap en borst, rug  
en vleugels zwart. EDW.  
*Birds.* III. 156. tab. 156.  
Woond in Europa en Noord  
America.

Van Terra 30. EEND, met een lange puntige  
Nova staart, een zwart ligchaam,  
(*Glacialis.*) dat van onder wit is. EDW.  
*glean.* II. 280.

Wild Eend 31. EEND, dat aschgrauw gegolfd is,  
(*Ferina.*) met eene bruine kop, eene  
zwarte band, stuit, en staart-  
vederen. BRISS. *Ornith.* VI.  
pag. 384. tab. 35. 1. *Milo-*  
*uin Male.*  
Woond in Europa.

Karnel 32. EEND, met eene groene vlak op  
(*Querque-*  
*dula.*) de vleugels, eene witte streep  
boven de oogen. BRISS. *Or-*  
*nith.* VI. pag. 427. tab. 39.  
fig. 12.  
Woond in Europa.

EEND,

Van Kam- (C) EEND, dat wit is, met een bleek  
 fchatka groene vlak aan den nek, de  
 vleugels witen zwart. PALL.  
*Specil. Zool.* VI. pag. 35.  
 tab. 5.  
 Woond in Kamfchatka.

Kraak Eend 33. EEND, met eene groene vlak op  
 (Crecca.) de vleugels, en eene witte  
 streep onder en boven de  
 oogen. ALBIN. *Ois.* I. pag.  
 95. tab. 100. II. p. 91. tab.  
 102.  
 Woond in Europa.

Circia 34. EEND, met eene veelverwige vlak,  
 streep boven de oogen, de  
 bek en pooten afchgrauw,  
 ALB. II. p. 92. tab. 103, 104.

Arlequin 35. EEND, dat bruynis, met wit en  
 (Histrionica.) blaauw, de ooren, en flaa-  
 pen met een dubbelde streep,  
 de hals en borst wit. EDW.  
*Birds.* IV. tab. 99.  
 Woond in America en Ysland.

VanHudfons36. EEND, dat grys is, met witte ooren, de eerste roeipennen zwartachtig. EDWARDS *Birds*. 157. tab. 157.  
 Baay  
 (*Minuta.*)  
 Woond in Hudfons baay en Ysland.

ZwartCalot 37. EEND, met blaauwe dekvederen, en groene stuurpennen, met een witte band op het voorhoofd. CATESB. *Carol. I.* pag. 100. tab. 100.

(b) Bruine dito. CATESB. *Carol. I.* p. 99. tab. 99.  
 BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 403.

Gekapte 38. EEND, dat bruyn is, het hoofd van vooren wit, en van achter zwart.  
 (*Viduata.*)  
 Woond in Carthagena.

Herfsttaaling 39. EEND, dat grys met zwarte staart en stuurvederen, de vlak der vleugelen ros, en wit.  
 (*Autumnalis.*)  
 EDW. *Birds.* IV. 194.  
 Woond in America.

(c) *Met eenige kromme stuurvederen.*

Gemeene Eend 40. EEND, met de stuurvederen, [van het mannetje] krom en de bek recht \*.  
(*Boschas.*)  
Woond in Europa.

Krombek 41. EEND, met de middelste stuurvederen krom, en eene kromme bek \*.  
(*Adunca.*)  
Woond in Holland.

(d) *Gekuifd dito.*

Kuif Eend 42. EEND, met eene afhangende [roode en groene] kuif, de rug, van agter wederzyds met een platte verheven, kromme veer [de hals en borst rood, de buik wit.] *Edw. Birds. II, tab. 102.*  
(*Galericulata.*)  
Woond in China.

(e) *Gekuifde.*

Bruidje 43. EEND, met een afhangende dubbele groene kuif, met wit en blaauw gemengeld. *CAT. Q 4 Carol.*  
(*Sponsa.*)

*Carol.* I. pag. 97. tab. 97.  
Woond in Noord America.

Boom Eend 44. EEND, dat grys is, met een kort  
(*Arborea.*) gekuifd hoofd, de buik wit  
enzwart gevlacht. *Edw. birds.*  
IV. 193.  
Woond in America.

Witvlak 45. EEND, met een afhangende kuif,  
(*Fuligula.*) een zwart ligchaam, de  
buik, en de vlak der vlerken  
wit. *ALBIN.* *Ois.* I. pag. 91,  
tab. 95.  
Woond in Europa.

LXVIII. ZAAGBEK. De *bek* zaagsgewyze ge-  
(*MERGUS.*) tandt en rolrondagtig.  
De bovenkaak aan de  
punt krom.  
[De binnenste vinger met  
een vliesje, aan de bin-  
nenste zyde bezet.  
Het onderste gedeelte van  
de Dyen zonder vede-  
ren.]

ZAAG-

Gekapte 1. ZAAGBEK, met eene bolronde kuif  
(*Cucullatus.*) aan wederzyden wit, het  
ligchaam van boven bruyn,  
en van onder wit. [De vlak  
der vleugelen wit met zwart  
geboord. *CATESB. Carol. pag.*  
94. tab. 94. *EDW. glean.*  
III. tab. 360. fig. 3.  
Woond in America,

Nonnetje 2. ZAAGBEK, met eene in de lengte  
(*Merganser.*) staande kuif [in het mannet-  
je] de borst ongevlakt, wit-  
agtig, de stuurvederen afch-  
grauw met eene witte  
scharf\*. *BUFF. Ois. 449. 450.*  
Woond in Europa.

Langbek 3. ZAAGBEK, met eene afhangende  
(*Serrator.*) kuif, de borst ros gevlakt,  
eene witte halsband, de stuur-  
vederen bruyn met afch-  
grauw gevlakt, [het hoofd  
zwartagtig blaauw, bek en  
pooten rood.] *EDW. Birds.*  
II. 95. *BRISS. Ornith. VI.*  
tab. 23.

Q 5

ZAAG-

224 W A T E R V O G E L E N .

Visfcher 4. ZAAGBEK, met één gekuifd afch-  
 (*Castor.*) graauw hoofd, van onder  
 roeftcoleurig, de keel wit,  
 bek en pooten zwart\*. BRISS.  
*Ornith.* VI. pag. 225. tab. 25.  
 Woond in Europa.

Witte Non 5. ZAAGBEK, met een afhangende kuif,  
 (*Albellus.*) het agterhoofd zwart, het  
 ligchaam wit, de rug en slaa-  
 pen zwart, de vleugels ge-  
 vlakt. BRISS. *Ornith.* VI. pag.  
 243. tab. 24.  
 Woond in Europa.

Pyltaart 6. ZAAGBEK, met eene ongekuifde  
 (*Minutus.*) gryze kop, een zwarte band  
 aan de oogen, en eene wit-  
 te vlak onder de oogen. ALB.  
*Ois.* I. p. 77. tab. 88.  
 Woond in Europa.

XLXIX. PAPEGAAYDUIKER. De *bek* kort, on-  
 (ALCA.) getand, plat,  
 verheven rond,  
 meest



meest dwarfch  
gegroefd.

Het onderkaak  
van onder bul-  
tig.

De *Neusgaaten*  
agter den bek.

De pooten  
meest al drie-  
vingerig.

Aek 1. PAPEGAAYDUIKER, met vier groe-  
(*Torda.*) ven aan den bek, en eene  
witte streep van de bek naar  
de oogen aan wederzyden\*.  
EDW. *Glean.* III. 358. tab.  
358. fig. 2.  
Woond in Europa.

Zeeduiker 2. PAPEGAAYDUIKER, met eene gladde  
(*Pica.*) platte bek, het ligchaam  
[zwart] van onder ende pun-  
ten der ftuurvederen wit, de  
pooten rood. BRISS. *Ornith.*  
VI. pag. 92. tab. 8. fig. 2.  
Woond aan de Noordpool.

Pingoin 3. PAPEGAAYDUIKER, met eene platte  
(*Impennis.*) gegroefde bek, eene eyronde  
[witte] vlak aan de oogen,  
[van boven zwart, en van onder wit.] EDW. *Birds.* III.  
147. tab. 147.  
Woond in het Noorden.

Groenland- 4. PAPEGAAYDUIKER, met eene zamen-  
fche gedrukte bek met vier groe-  
(*Arctica.*) ven, de oogkringen en wan-  
gen wit, de bovenste wenk-  
brauw gedoornd. EDW. *glean.*  
III. 358. fig 1. BUFF. *Ois.* 275.

Rottetetje 5. PAPEGAAYDUIKER, met eene kegel-  
(*Alle.*) agtige gladde bek, de buik  
en de agterste roeipennen  
wit; de pooten zwart. EDW.  
*Birds.* II. tab. 91.  
Woond in het Noorden van  
Europa en van America.

Gekuijde (A) PAPEGAAYDUIKER, die zwart is,  
met de zyden van het hoofd  
wit, met twee geelachtige af-  
hangende aigretten. DIERK.  
*Men.*

*Mengelw.* I. VI. stuk bl. 22.  
fig. 2.

Woond in Kamschatka.

Zee parkiet (B) PAPEGAAYDUIKER, die zwart is,  
met eene witte streep aan  
de oogen, de bek bloedrood,  
platagtig eirond, het onder  
kaakbeen opgewipt, de neus-  
gaaten pypagtig. PALL.  
*Specil. fasc. V. p. 15. tab. II.*  
Woond tusschen Kamschatka  
en America.

Zee Cacatoe (C) PAPEGAAYDUIKER, die zwart is,  
de rug met donker roestver-  
wige vlakken, het voorhoofd  
met eene opstaande kuif, de  
bek rood, uitgerand, kegel-  
agtig, aan de punt wit, de  
neusgaaten pypagtig. PALL.  
*Specil. V. pag. 20. tab. III.*  
Woond in de Eylanden by  
Japan.

Vierkleuri- (D) PAPEGAAYDUIKER, die van boven  
gezwart is, met roestcoleurige  
vlak-

vlakken, van onder bruyn afchgrauw, een witte vlak aan het oog, de bek bruyn geel. PALL. *Specil.* V. pag. 24. tab. 4.

Woond in Kamschatka.

LXX. ONWEERSVOGEL. De *bek* zonder tanden, (PROCELLARIA.)

den, wat zamengedrukt, de kaakbeenderen even groot, de bovensten met eene kromme punt, de punt der ondersten zaamengedrukt, ingegroeft.

De *Neusgaaten* rol-rond.

De voeten gevlied, de agterste nagel zonder vinger.

Rotje I. ONWEERSVOGEL, die zwart is, met eene witte stuit. Edw. *birds.*

(*Pelagica.*) II. p. 90. tab. 90. f. 1.

Woond

Woond in de Noordzee.

Kleine Pete-2. ONWEERSVOGEL, die zwart is, van  
rel onder wit\*.

(*Fregata.*) Woond in de Noordzee.

Malle mukke 3. ONWEERSVOGEL, die witagtig is,  
(*Glacialis.*) met eene gryze rug. BUFF.  
*Ois.* 59.

Woond aan de Noordpool.

Groote Pete-4. ONWEERSVOGEL, bruyn met een  
rel. geele bek, en bruynepooten.

(*Aequinoctia-* *EDW. Birds.* 89. tab. 1.

*lis.*) Woond aan de Kaap.

Kaapfche 5. ONWEERSVOGEL, die wit en zwart  
(*Capensis.*) bont is. *EDW. birds.* II. 90.  
tab. 90. f. 2.

Woond aan de Kaap.

Puffin 6. ONWEERSVOGEL, die het ligchaam  
(*Puffinus.*) van boven zwart, van on-  
der wit heeft. *EDW. Glean.*  
III. tab. 359.

- LXXI. ALBATROS. De *bek* regt, het opper-  
 (DIOMEDEA.) kaakbeen aan de punt  
 krom, 't onderfte geknot.  
 De *Neusgaaten* eirond, o-  
 penstaande vooruitste-  
 kende en zylingfch ge-  
 plaatft.

Albatros 1. ALBATROS, met gevederde vleu-  
 (*Exulans.*) gelen, de pooten drie vin-  
 gerig in evenwigt staande.  
 EDW. *birds.* II. tab. 88.  
 Woond tuffchen de keerkrin-  
 gen.

Magellaan- 2. ALBATROS, met ongevederde vleu-  
 fche Gans gelen, vier vingerige buiten  
 (*Demerfa.*) het evenwicht staande poo-  
 ten, alle de vingeren aan el-  
 kander gehecht\*. EDW. *birds.*  
 IV. tab. 94. BUFF. *Hift.*  
*Nat. Ois.* 384.  
 Woond in de ftraat van Ma-  
 gellanes.

LXXII. PELEKAAN. De *bek* zonder tanden, recht,  
(PELECANUS.) met een krom haakje ge-  
nageld. [plat]

De *neusgaaten* met eene spleet  
welke weinig zichtbaar is.

Het *aangezicht* byna naakt.

De *pooten* [korter dan  
het ligchaam,] en in des-  
zelve evenwigt geplaatst.

[Een vliezige zak aan de  
keel.]

Pelecaan 1. PELECAAN, [die wit is,] met eene  
(*Onocrata-* [geele] zak aan de keel \*.  
*lus.*) BUFF. *Hist. Nat. Oif.* 87.

b. Bruine Pelecaan. EDW.  
*Birds.* II. 93. tab. 93.

Woond in Africa, Asia.

b. in America.

Fregatvogel 2. PELECAAN, met eene schaarsgewy-  
(*Aquilus.*) ze staart, een zwart lig-  
chaam, roode bek en zwarte  
oogkringen. EDW. *glean*  
II. 309.

Woond in Zee.

Kormoran 3. PELECAAN, met eene ronde staart,  
 (*Carbo.*) een bek zonder tanden, de  
 kop eenigzints gekuifd.  
 BRISS. *Ornith.* VI. p. 511.  
 tab. 45. *Cormoran.*  
 Woond in Europa.

b. *Met getandde kaakbeenderen.*

Kleine Cor-4. PELECAAN, met eene ronde staart,  
 moran een zwart ligchaam, dat van  
 (*Graculus.*) onder bruin is, met twaalf  
 ftuurvederen, de bek onge-  
 tand.  
 Woond in de Europifche zee.

Jan van Gent 5. PELECAAN, die wit is, met eene  
 (*Basfanus.*) wigvormige staart, een  
 zaagswyze groenagtige bek,  
 de eerfte roeipennen zwart,  
 het aangezigt blaauw, [de  
 keel en de rand der oogen  
 zwart.] BUFF. *Hift. Nat. Ois.*  
 278. *Fou de Bosfan.*  
 Woond in de Noordzee.

Vifcher 6. PELECAAN, met eene wigvormige  
 (*Pifcator.*) staart, zaagswyze bek, wit  
 ligchaam, alle de roeipen-  
 nen



nen en het aangezicht zwart.  
Woond in Indien en Eu-  
ropa.

Gek 7. PELECAAN, met een witagtig lig-  
(*Sula.*) chaam, wigvormige staart,  
en zaagswyze bek, de eerste  
roeipennen aan de punt zwart,  
het aangezicht rood. CATESB.  
*Carol.* 87.  
Woond in de Indische zee.

Bruine Gek 8. PELECAAN, met eene wigvormige  
(*Fiber.*) staart, zaagswyze bek, bruin  
ligchaam, alle de roeipennen  
zwart, het aangezicht rood,  
BRISS. *Ornith.* VI. p. 499.  
tab. 43. fig. 1.  
Woond in de Africaanſche,  
en Americaanſche zee.

LXXIII. VISCHVANGER. De *bek* recht, puntig  
(PLOTUS.) en getand, het *aan-*  
*gezicht* gevedert.  
De *pooten* alle ge-  
palmd.

Anhinga 1. VISCHVANGER, die bruin is, de  
 (*Plotus*) vleugels en hals ros ge-  
 streept \*. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 107. *Anbinga*.  
 Woond in [Senegal, Benga-  
 le] America.

LXXIV. KEERKRINGVOGEL. De *bek* mesgewys-  
 (PHAETON.) regt, scherp,  
 de opening ver-  
 der dan de kaak-  
 beenderen ga-  
 pende.  
 De *Neusgaaten*  
 langwerpig.  
 De agterste *vin-*  
*ger* na vooren  
 gekeerd.

Langveer 1. KEERKRINGVOGEL, met twee zeer  
 (*Æthereus*) lange stuurvederen, een  
 zaagswyze bek, de pooten in  
 het evenwigt, de agterste  
 vinger gevliëdt. EDWARDS.  
*Birds.* III. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 369.

Woond

Woond tuffchen de Keer-  
kringen in de Zee.

Gorfou 2. KEERKRINGVOGEL, met ongeveder-  
(*Demersus.*) de vleugels, de pooten ver-  
buiten 't evenwigt naar ag-  
ter, de agterfte vinger los.  
EDW. *Birds.* I. 49.  
Woond aan de Zuiderkeer-  
kring.

LXXV. DUIKER. De *bek* zonder tanden, els-  
(*COLYMBUS.*) wyze, regt, puntig.  
De *keel* getand.  
De *Neusgaaten* als streepjes  
aan het agterfte van den bek.  
De pooten buiten het even-  
wigt.

Uria 1. DUIKER, met drievingerige ge-  
(*Grylle.*) palmde pooten, een zwart lig-  
chaam, en witte dekvederen.  
EDW. *Birds.* I. tab. 50.  
Woond aan den Poolkring.

(*Troile.*) 2. DUIKER, met gepalmde drievin-  
R 3 gerige

gerige de pooten, eenzwart  
ligchaam, de borst en buik wit,  
de tweede rei roeipennen aan  
de pant wit *Guillimot*. EDW.  
*glean*. III. 359.

Woond aan den Noordpool,

- Noordsche 3. DUIKER, met viervingerige ge-  
(*Septentrio-*  
*nalis*.) palmde pooten, de hals van  
onder met een roestcoleuri-  
ge vlak. EDW. *Birds*. II. 97.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois*. 308.  
*Plongeon à gorge rouge*.  
Woond in Noord Europa,

- Zwartkeel 4. DUIKER, met viervingerige gepalm-  
(*Arcticus*.) de pooten, een gryze kop,  
de hals van onder violet zwart  
met een witte band.  
Woond in Europa.

- Groote van 5. DUIKER, met viervingerige gepalm-  
Ferroe de pooten, een violet zwarten  
(*Glacialis*.) kop en hals, en een witte af-  
gebrooke band om de keel en  
hals. EDW. *Birds*. III. 146.  
Woond in de Noordzee.

DUI-

Immer 6. DUIKER, met viervingerige gepalmde pooten, het ligchaam van boven zwart, met wit gewolkt, van onder geheel wit. Woond in de Yssee.

Gekuifde (Cristatus.) 7. DUIKER, met gewebde pooten, een ros hoofd, een zwarte halsband, de tweede rei stuurvederen wit. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 404. 1. Woond in Europa.

Geoorde (Auritus.) 8. DUIKER, met gewebde pooten, gekuifde roestcoleurige ooren, [de hals en buik wit, de rug zwartagtig, de pooten blaauw, de middelste nagel lepelsgewyze stomp\*.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 400. Woond in Europa, America.

Duikelaar (Urinator.) 9. DUIKER, met gewebde pooten, een gladde kop, eene witte vlak op de vleugels. EDW. *gleam.* III. tab. 360 fig. 2. Woond in Zuid Europa.

Van St. Do- 10. DUIKER, met gewebde pooten,  
 mingo gladde kop, het ligchaam on-  
 (*Dominicus.*) der gevlaakt. *BRISS. Ornith. VI.*  
 pag. 64. tab. 5. fig. 2.  
 Woond aan St. Domingo.

Aarsvoet 11. DUIKER, met gewebde pooten, een  
 (*Podiceps.*) bruin ligchaam, de bek met  
 anderhalve band. *CAT. Carol.*  
 I. pag. 91. tab. 91.  
 Woond in Noord America.

Dubbel (A) DUIKER, met eene dubbelde kuif  
 Gekuijde van boven bruin en van on-  
 der wit, de hals van onder  
 met castanje bruine vlakken.  
*BRISS. Ornith. VI. pag. 42.*  
 tab. 3. fig. 2.  
 Woond in America.

Zwartborst (B) DUIKER, die bruin is, van onder  
 wit, met gryze vlakken, ee-  
 ne witte vlak tusschen den  
 bek en de oogen, een zwarte  
 vlak op de borst. *BRISS. Or-*  
*nith. VI. p. 58.*  
 Woond aan 't Eiland St. Tho-  
 mas.

MEEUW.

LXXVI, MEEUW. De *bek* zonder tanden, regt,  
(LARUS.) lepelsgewys, aan de punt  
krom: het onder *kaakbeen* van  
onder hoekig.

De *Neusgaten* midden op den  
bek, na vooren breeder.

[De *pooten* in het evenwigt,  
korter dan het ligchaam.]

Riffa  
(*Risfa.*)

1. MEEUW, die wit is, met eene graau-  
we rug, de *stuurvederen* wit,  
drie vingeren aan yder poot\*.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 253.  
*Goiland cendré.*  
Woond in Ysland.

Drievinge-  
rige  
(*Tridactylus.*)

2. MEEUW, die witagtig is, met eene  
grysachtige rug, de punten  
der *stuurvederen* (behalven  
de buitenste,) zwart, de poot-  
ten met drie vingeren. BRISS.  
*Ornith.* VI. pag. 189. *Mou-  
ette d'hyver.*

Gryze  
(*Canus.*)

3. MEEUW, die wit is, met eene graau-  
we rug, [de *bek* geel, de  
pooten geelrood.] BRISS. *Or-  
R 5 nith.*

*nith.* VI. p. 175. tab. 16. f.

1. *Mouëtte Cendrée.*

Woond in Europa.

NB. Deze is eene verscheidentheid van de *Riffa*.

Afchkleuri- 4. MEEUW, die wit is, met eene afch-  
ge                      colourige rug, eene bruine  
(*Cinerarius.*)                      vlak aan de oogen. BRISS.  
*Ornith.* VI. p. 178. tab. 17.  
f. 1. *Petite Mouëtte Cendrée.*

Witte                      5. MEEUW, die wit is, met eene afch-  
(*Naeuius.*)                      graauwe rug, de ftuurvede-  
ren aan de punt zwart. BRISS.  
*Ornith.* VI. p. 185. tab. 17.  
fig. 2.  
Woond in Europa.

Mantel-                      6. MEEUW, die wit is, met eene zwar-  
Meeuw                      te rug\*. PENNANT. *Zool. Britt.*  
(*Marinus.*)                      tab. I. 1.  
Woond in Europa.

Bruine                      7. MEEUW, die wit is, met eene brui-  
Meeuw                      ne rug. MARSIGL. *Danub.* V,  
(*Fuscus.*)                      pag. 84. tab. 40.  
Woond in Europa.

MEEUW,



Spotter 8. MEEUW, die wit is, met eenzwar-  
 (*Atricilla.*) agtig hoofd, roode bek, en  
 zwarte pooten. BRISS. *Or-*  
*nith.* VI. pag. 192. tab. 18.  
 fig. 1. CATESB. *Carol.* I. p.  
 89. tab 89.  
 Woond in America en Europa.

Kok Meeuw 9. MEEUW, die witagtig is, met eene  
 (*Ridibundus.*) zwartagtige kop, roode bek  
 en pooten:  
 Woond in Europa.

Gevlakte (A) MEEUW, die wit is, met bruine  
 hoekige vlakken. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 387.  
 Woond in Europa.

Strontjager 10. MEEUW, die bruin is, met eene  
 (*Parasiticus.*) zwarte kruin, een witagtige  
 buik, en lange middelste  
 stuurvederen. EDW. *Birds.*  
 III. tab. 148.  
 Woond tusschen de Keerkrin-  
 gen.

Noordsche 11. MEEUW, die [geel en bruin ge-  
 vlakt

Vogel  
(*Catarractes.*)

vlakt is, met eene witte vlak op de vleugels, de buik bleekgeel,] de roeipennen en stuurvederen by het ligchaam wit, de staart byna gelyk.  
EDW. *Birds.* III. tab. 149.  
Woond aan de Noordpool.

LXXVII. STERN. De *bek* zonder tanden, elsge-  
(STERNA) wyze, scherp, en wat za-  
men gedrukt.

De *Neusgaaten* aan het agter-  
ste van den bek.

Zotte  
(*Stolida*)

1. STERN, met eene wigvormige staart, een zwart ligchaam, en een witagtig voorhoofd met zwarte wenkbrauwen. CAT, *Carol.* I. p. 88. tab. 88.  
Woond in America.

Zeezwaluw  
(*Hirundo.*)

2. STERN, met eene schaarsgewyze staart, de twee buitenste stuurvederen half wit en zwart. BRISS. *Ornith.* VI. p. 203. tab. 19. f. 1,  
Woond in Europa.

STERN,

Zwarte (Nigra.) 3. STERN, met een byna schaarsgewyze staart, een gryns ligchaam, de kop en bek zwart, de pooten rood. BUFFON. *Ois.* 133. Woond in Europa.

Kleine (Minuta.) 4. STERN, met eene schaarsgewyze staart, wit Ligchaam, gryze rug, wit voorhoofd, en witte wenkbraauwen. Woond in Zuid Europa.

Gevlakte (Naevia.) 5. STERN, met eene uitgerandde staart, een gevlaakt ligchaam, eene zwarte vlak aan de ooren. BRISS. *Ornith.* VI. pag. 216. tab. 20. fig. 2. Woond in Zuid Europa.

Zwartagtige (Fuscata.) 6. STERN, met eene uitgerandde staart, een zwartagtig ongevlakt ligchaam, de pooten rood, en de bek bruin. BRISS. *Ornith.* VI. pag. 220. tab. 21. fig. 1. Woond in Zuid Europa.

Met gefplee ten pooten 7. STERN, met eene uitgerandde staart, zwart ligchaam, afchgrauwe rug

(Fisfipes.)

rug, witte buik, en roodagtige pooten. BRISS. *Ornith.* 17. p. 211. tab. 20. f. 1.  
Woond in Zuid Europa.

LXXVIII. WATERSNYDER. De *bek* regt: het  
(Rynchops.) opperkaakbeen  
veel korter dan  
het onder  
kaakbeen, dat  
aan de punt geknot is.

Zwarte  
(Nigra.)

1. WATERSNYDER, die zwartagtig is, van onder wit, de bek van agter rood. BRISS. *Ornith.* VI. pag. 223. tab. 21. fig. 2. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 357. Woond in America.

Rosse  
(Fulva.)

2. WATERSNYDER, die ros is, met eene zwarte bek.  
Woond in America.

STELT.



# I V. STELTLOOPERS.

[G R A L L Æ.]

*De Bek rolrondagtig, en wat stomp.*

*De Tong geheel en vleesachtig.*

*De Dyen naakt.*

LXXIX. FLAMINGO. Eene naakte geknakte  
(PHOENICOPTERUS.) geboogen, getandde  
bek.

*De Neusgaaten streéps-  
gewyze.*

*De pooten gepalmd en  
viervingerig.*

Rode  
(*Ruber.*)

1. FLAMINGO, die rood is, met zwarte  
stuurvederen \*. CATESB.  
*Carol. I. pag. 73. tab. 73.*  
Woond in Africa en America.

LE-

LXXX. LEPELAAR. De *Bek* platagtig, met  
(PLATALEA.)      een verbreed, rond,  
vlak uiterfte.

Witte      1. LEPELAAR, die wit is, met eene  
(*Leucorodia.*)      zwarte keel, het agterhoofd  
eenigzins gekuifd \*. BUFF.  
*Hift. Nat. Oif.* 405.  
Woond in Europa.

Roode      2. LEPELAAR, met een [bleek] rood  
(*Ajaja.*)      ligchaam \*. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 165.  
Woond in Zuid America.  
(b) Donker roode.

Kleene      3. LEPELAAR, die van boven bruin,  
(*Pygmaea.*)      en van onder wit is.  
Woond in Suriname.

LXXXI. KAMECHY. De *Bek* kegelrond, het  
(PALAMEDEA.)      bovenfte *kaakbeen*  
krom.  
De *pooten* viervingerig,  
gespleeten.

Anhima      1. KAMECHY, met dubbel gedoornde  
vleu-

(*Cornuta.*) vleugelen, het voorhoofd met eene lange hoorn. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 451. Woond in Brasfil en Guajania.

Gekuifde 2. KAMICHY, die ongewapend is, met  
(*Cristata.*) eengekuifd voorhoofd. WIL- LUGB. *Ornith.* tab. 51. Woond in Brasfil.

LXXXII. SCURVOGEL. De *bek* fcherp, wat  
(MYCTERIA.) opklimmende. De boven kaak driehoekig, en zeer recht. Het onder kaakbeen driehoekig fcherp, en wat naar boven opgewept. Het voorhoofd kaal. De *Neusgaaten* streeps gewyze. Geen Tong. De *pooten* viervingerig.

Brasiliaan- 1. SCURVOGEL, die wit is, met pur-  
Iste Deel IIde Stuk. S pe-





neusgaaten na de punt loopende.

De *Neusgaaten* streepsge-  
wyze.

De *pooten* viervingerig.

(a) *Gekuijfte*, den bek  
naauwlyks langer als  
het hoofd.

Balearifche 1. REIGER, met eene opstaande bor-  
Kraan stelige kuif, de slaapen en  
(*Pavonina*.) kwabben ongevedert. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 255. EDW.  
*Birds.* IV. 192.  
Woond in Africa.

Numidifch 2. REIGER, [die afchgrauw is, van  
Juffertje onder wit,] met witte  
(*Virgo*.) wenkbrauwen, die naar ag-  
ter als afhangende kuiven  
uitloopen \*. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 241. EDW. *birds.* III. 134.  
Woond in het Oosten.

(b) *Kraanen*, de kop on-  
gevedert.

Van Canada 3. REIGER, met het voorhoofd naakt

- (*Canadensis.*) en tepelachtig, het ligchaam afchig raauw, de vleugels uitwendig bleekrood. EDW. *Birds.* III.  
Woond in Noord America.
- Kraanvogel 4. REIGER, met het agterhoofd naakt, tepelachtig, de kruin- en roeipennen zwart, het ligchaam afchig raauw. EDW. *Birds* III. 132.  
(*Grus.*) Woond in Europa en Africa.
- Americaan 5. REIGER, met den nek en slaapen fche naakt en gepeteld, het voorhoofd, de nek en eerste ftuurvederen zwartagtig, het ligchaam wit. EDW. *Birds.* III. 132. CATESB. *Carol.* I. 75.  
(*Americana.*) Woond in Noord America.
- Antigone 6. REIGER, met een naakte kop en halsband, die tepelachtig en rood zyn, het ligchaam afchig raauw, de eerste ftuurvederen zwart EDW. *Birds.* I. 45.  
Woond in Afien.

Mexicaan- (A) REIGER, die afchgrauw is, met  
fche de kop van boven rood, de  
ftuurvederen zwart.  
Woond in Mexico.

Japanfche (B) REIGER, die wit is, met het bo-  
venfte van de kop rood,  
de hals en roeipennenzwart,  
de ftuurvederen wit.  
Woond in Japan.

Trompetter(C) REIGER, die zwart is, hals en  
Vogel borft goudblauw, de rug  
vuilwit, de ftuurvederen  
zwart \*. *BUFF. Hift. Nat.*  
*169. VOSM. befchryv. PALL.*  
*Spicil. Zool. p. fasc. tab. IV.*  
Woond in America.

(c) *Oyevaars*, met naak-  
te oogkringen.

Oyevaar 7. REIGER, die wit is, met naakte  
(*Ciconia.*) oogkringen, zwarte ftuur-  
vederen, en roode bek, huid  
en pooten \*.  
Woond in Europa, Afia, A-  
frica.

Zwarte (Nigra.) 8. REIGER, die zwart is, met naakte oogkringen, de buik en borst wit.

Groenstaart (D) REIGER, die bruin is, de hals met wit gestipt, de borst bruin, met wit gegolfd, de roeivederen violet, de stuurvederen groen, de bek zeer groen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 399. *Cicogne brune.*  
Woond in . . . . .

(d) *Reigers*, de middelste vinger naar binnen gekarteld.

Kwak (Nycticorax) 9. REIGER, met de kuif van het achterhoofd drievederig wit en regt uitsteekende, de rug zwart, de buik geelagtig\*. BRISS. *Ornith.* V. pag. 493, tab. 39. *Biboreau.*  
Woond in Zuid Europa.

Purpere (Purpurea.) 10. REIGER, met een zwart achterhoofd, een afhangende kuif met twee lange vederen, 't lyf olyf-

olyfcoleurig, van onderpurper. BRISS. *Ornith.* V. pag. 424. tab. 36. f. 2.

Woond in het Oosten.

Afchgrauwe (Cinerea.) 11. REIGER, met een glad zwart agterhoofd, met eene blaauwagtige rug, van onder witagtig, de borst met lange zwarte vlakken. BRISS. *Ornith.* V. pag. 392. tab. 34. Woond in Europa.

Groote (Major.) 12. REIGER, met een zwarte afhange kuif aan het agterhoofd, afchgrauw Lighaam, de hals met eene zwarte streep, en de borst met een zwarte band. BRISS. *Ornith.* V. pag. 396. tab. 35\*. Woond in Europa.

Kleine (E) REIGER, die afchgrauw is, de hals en borst wit met zwarte vlakken. Woond in Italien.

Cocoi 13. REIGER, met eene afhange afchgrauwe kuif, en rug, de hals

hals met zwart gevlacht, de zyden van de kop zwart. ALBIN. *Hist. Nat. Ois.* III. pag. 32. tab. 79.  
Woond in Cayenne.

Witte  
(*Garzetta.*)

14. REIGER, met een gekuifd agterhoofd, een wit ligchaam, eene zwarte bek, de pooten en de streep tusschen den bek en de oogen groenagtig. MARSIGL. *Danub.* V. pag. 14. tab. 5.  
Woond in het Oosten.

Groote Kuif  
Reiger  
(*Herodias.*)

15. REIGER, met een gekuifd agterhoofd, eene bruine rug, rosse dyen, de borst met lange zwarte vlakken. CATESB. *Carol.* III. pag. 10. tab. 10.  
Woond in America.

Violette  
(*Violacea.*)

16. REIGER, met een geel agterhoofd, en eene witte kuif, het ligchaam zwart en wit gestreept, van onder blaauwagtig, met geele pooten. CATESB. *Carol.*

*rol. I. p. 79. tab. 79.*

Woond in America.

**Twecoleu-** (F) REIGER, met een gekuifd agter-  
rige hoofd, een roffe hals en

blaauw ligchaam. *BUFF. Hist.*

*Nat. Ois. 349.*

Woond in America.

**Blaauwe** 17. REIGER, met een gekuifd agter-  
(*Coerulea.*) hoofd, en blaauw ligchaam.

CATESB. *Carol. I. p. 76. tab.*

76.

Woond in Noord America.

**Driecoleuri-** (G) REIGER, die zwartagtig blaauw  
ge is, van onder wit, met blaau-

we dekvederen der staart.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois. 350.*

Woond in America.

**Van Hud-** 18. REIGER, met eene zwarte gekuif-  
fons Baay de kruin, het ligchaam bruin-

agtig, van onder witagtig, de

hals van onder zwart, en ros

gevlakt. *EDW. Birds. III. tab.*

135.

Woond aan Hudfonsbaay.





BRISS. *Ornith.* V. pag. 412.  
tab. fig. 1.

Woond in het Oosten.

Soco 23. REIGER, met eene gladde kop, een  
(*Brasiliensis.*) zwartagtig met geel gestipt  
ligchaam, de roei en stuur-  
vederen, de bek en pooten  
zwartagtig. WILL. *Ornith.*  
209. tab. 51.  
Woond in Zuid America.

Witte 24. REIGER, met eene gladde kop, een  
(*Alba.*) wit ligchaam, rosse bek en  
zwarte pooten \*. MARSIGL.  
*Danub.* V. p. 12. tab. 4.  
Woond in Europa.

Van Caroli- 25. REIGER, met een gladde kop, wit  
na ligchaam, de twee stuurve-  
(*Aequinoctia-* deren aan den rand bruin.  
*lis.*) CAT. *Carol.* I. tab. 77.  
Woond in America.

Woud-Aap- 26. REIGER, met eene gladde kop,  
je een bruin ligchaam, dat van  
(*Minuta.*) onder rosis, de stuurvederen  
zwartagtig groen, de toom-  
ftee-

streepen geelagtig. EDW.  
*Glean.* II. tab. 275.

Woond in Barbaryen.

(b) *Blongios.* BUFF. *Hist.*  
*Nat. des Ois.* 323.

(c) Kleine Butoor van Se-  
 negal. ID. *ibid.* 315.

(b) Woond in Zwitser-  
 land en in Senegal.

LXXXV. COURLY. De *bek* lang spilrondagtig,  
 (TANTALUS.) wat krom.

Een naakt *aangezigt* tot  
 agter de oogen.

Eene korte, breede *tong*.

Een naakte zak aan de  
 keel.

Eironde *Neusgaaten*.

De *pooten* viervingerig,  
 naar agter gepalmd.

Americaan- i. COURLY, met een blaauwachtig  
 fche Peli- aangezicht, eene roodagtige  
 caan bek, roei en stuurvederen  
 (*Loculator.*) zwart, het ligchaam wit. CA-  
 TESB. *Carol.* I. pag. 81. tab. 81.  
 Woond in America.

Cou-

- Gevlakte 2. COURLY, met een zwart aange-  
 (*Falcinellus.*) zicht, blaauwe pooten, een  
 castanie bruin [met wit en  
 bruin gevlakt] ligchaam, de  
 vleugels en staart violet.  
 BRISS. *Ornith.* V. tab. 27.  
 fig. 2.  
 Woond in Italiën, Oostenryk.
- Kleine 3. COURLY, met een groen aangezicht,  
 (*Minutus.*) bek en pooten, het ligchaam  
 roeft verwig, van onder wit.  
 EDW. *Glean.* III. tab. 356.  
 Woond in . . . . .
- Ibis 4. COURLY, met roode wangen, een  
 geele bek, gryze pooten,  
 zwarte stuurvederen, het  
 ligchaam witagtig ros. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 389.  
 Woond in Egypten.
- RoodeWulp 5. COURLY, met roode wangen, bek  
 (*Ruber.*) en pooten, het lichaam bloed-  
 rood, de punten der vlu-  
 gelen zwart \*. BUFF. *Hist.*  
*Nat. des Ois.* 81.  
 Woond in America.
- Cou.

- Witte (Albus.) 6. COURLY, met roode wangen, bek en pooten, het ligchaam wit, de punten der vleugelen groen. CAT. Carol. I. tab. 82.  
Woond in Brazil.
- Bruine (Fuscus.) 7. COURLY, met roode wangen, bek, en pooten, een bruin ligchaam, dat van onder wit is. CATESB. Carol. I. tab. 83.  
Woond in America.
- vanMadagafcar (A) COURLY, die bruin is, van onder wit, de borst en zyden ros, met groote zwarte vlakken. BRISS. Ornith. V. pag. 321. tab. 28.  
Woond in Madagafcar.
- Castanje bruine (B) COURLY, die glanzig castanje bruin is, met eene groene borst, de stuurvederen castanje bruin. MARSIGL. Danub. V. p. 40. tab. 18.  
Woond aan den Donauw.

LXXXVI. SNIP. De *bek* spilrond stomp, langer dan de kop.  
(SCOLOPAX.)

De *Neusgaaten* als streepjes.

Het *aangezicht* gedekt.

De *pooten* viervingerig; de laatste met veele leedjes.

Gaurauna 1. SNIP, met eene kromme bek, die geelagtig is, bruine pooten, het lichaam bruin, met wit gestreept. BRISS. *Ornith.* V. p. 330.

Woond in Zuid America.

Uit Madagafchar 2. SNIP, met eene kromme bek, roffe pooten, en ruitagrige vlakken op den rug. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 198. *Courly.*

Woond in Madagafchar.

NB. Deze is een *Courly*, zie het voorgaande geflagt lett. B.

Witvlak 3. SNIP, met eene kromme bek, (Arquata.) blaauwagtige pooten, zwarte vleugels, met witte vlakken. ALBIN. *Ois.* I. tab. 79.

Woond in Europa.

SNIP,

Blaauwpoot 4. SNIP, met eene kromme bek,  
 (*Phæopus.*) blaauwagtige pooten, en  
 bruine ruitagtige vlakken  
 op den rug. Edw. *glean.* II.  
 307.  
 Woond in Europa.

Bruine 5. SNIP, met de bek aan de punt geböo-  
 (*Fusca.*) gen, het ligchaam wit, en  
 zwart gewolkt, de ftuit en  
 vleugelen van onder wit.  
 BRISS. *Ornith.* V. pag. 276.  
 tab. 23. fig. 2. *Barge.*  
 Woond in Europa

Houtfnip 6. SNIP, met een regte bek die aan  
 (*Rusticola.*) het grondftuk ros is, de poo-  
 ten afchgrauw, de dyen be-  
 dekt, eene zwarte band om de  
 kop. BORLACE *Cornub.* p.  
 245. tab. 24. fig. 12.  
 Woond in Engeland.

Snipje 7. SNIP, met eene regte geknobbel-  
 (*Gallinago.*) debek, bruine pooten, vier  
 bruine voorhoofds streepen,  
 de

stuit violet bont. **MAR SIGL.**  
*Danub.* V. tab. 15.  
 Woond in Europa.

Poelfnip 8. SNIP, met een regte geknobbelde  
 (*Gallinula.*) bek, groenagtige pooten,  
 bruine toomstreepen, de stuit  
 violet bont \*. **BRISS. Ornith.**  
 V. pag. 304. tab. 26. fig. 2.  
 Woond in Europa.

Tjerk 9. SNIP, met een regte geelgtige bek,  
 (*Fedoa.*) bruine pooten, de tweede rei  
 stuurvederen ros, met zwart  
 gestipt. **EDW. birds.** III. 137.  
 Woond in Noord America.

Glut 10. SNIP, met een regte bek, van on-  
 (*Glottis.*) der aan het grondstuk rood,  
 het ligchaam van onder wit,  
 de pooten groenagtig. **BRISS.**  
*Ornith.* V. pag. 272. tab. 24.  
 fig. 2.  
 Woond in Europa.

Ruiter 11. SNIP, met een roode regte bek,  
 (*Calidris.*) roode pooten, de tweede rei  
*Iste. Deel. IIde Stuk.* T stuur-

stuurvederen wit. BRISS. *Ornith.* V. p. 188. tab. 17.  
Woond in Europa.

Totanus 12. SNIP, met een byna regte bek, bruine pooten, witte wenkbraauwen, borst, buik, en stuit. BRISS. *Ornith.* V. pag. 267. tab. 23. f. 1.  
Woond aan stranden in Europa.

Barge  
(*Limosa.*) 13. SNIP, met een wat gekromde bek, die aan het grondstuk rood is, de pooten bruin, de stuurvederen meteene witte vlak, behalven de vier eerste. MAR-SIGL. *Danub.* V. p. 30. tab. 13, 14.  
Woond in Europa.

Kaapsche  
(*Capensis.*) 14. SNIP, met een regte rosagtige bek, en rosagtige kruinstreep, eene zwarte borstband, [het ligchaam blaauw] en een witte streep aan yder zyde. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 270.  
Woond aan de Kaap.

SNIP,



Saffraan- 15. SNIP, met een geelagtige wat ge-  
 borft kromde bek, [bruin ligchaam]  
 (*Lasponica.*) van onder roeftcoleurig ros  
 de pooten zwart. EDW. *birds.*  
 III. 138.  
 Woond in Lapland en Noord  
 America.

Roodhals 16. SNIP, met een regte bek, groen-  
 (*Ægocephala.*) agtige pooten, rosagtige kop  
 en hals, de drie roeivederen  
 zwart, aan hun begin wit.  
 MARSIGL. *Danub.* V. p. 36.  
 tab. 16.  
 Woond in Zuid Europa.

Witte 17. SNIP, met eene oranje coleurige  
 (*Alba.*) na bovengekromde bek, een  
 wit ligchaam met geelagtige  
 ftuur en roeipennen, bruine  
 pooten. EDW. *birds.* III. 139.  
 [de agterfte figuur.]  
 Woond in Noord America.

Witte ruit 18. SNIP, met eene regte bek, oran-  
 (*Candida.*) je pooten, een witagtig lig-  
 chaam, de roeipennen grys

met wit gebandeerd. EDWARD, *birds.* III. 139. [de voorste.]

Woond in Noord America.

LXXXVII. STRANDLOOPER. De *bek* spilronde-  
(TRINGA.) agtig, zoo lang

als de kop, [aan de punt stomp en glad.]

De *Neusgaaten* streepsgewyze.

De *pooten* vier-  
vingerig, de ag-  
terste met een  
leedje, en den  
grond niet raa-  
kende.

Kemphaant- I. STRANDLOOPER, met een roode bek  
je  
(*Pugnax.*)

en pooten, de drie zylingfche  
stuurvederen zonder vlak-  
ken, het aangezicht met ge-  
korrelde vleeschige tepelt-  
jes '\*.

*Paon de Mer.* BUFF.

*Hist.*

*Hift. Nat. Ois.* 305, 306.  
Woond in Europa.

Kievit 2. STRANDLOOPER, met roode pooten,  
(*Vanellus.*) eene afhangende kuif, en een  
zwarte borst. BUFF. *Hift.*  
*Nat. des Ois.* 242. *Vanneau.*  
Woond in Europa, Africa.

Van Senegal (A) STRANDLOOPER, met zeer lange  
geele pooten en bek, het  
voorhoofd met een afhan-  
gnd geel vlies, het ligchaam  
graauw, de dekvederen wit,  
de roeipennen zwart, de  
ftuurpennen wit, met eene  
breede zwarte band; de  
fchouders met eene doorn  
gewapend. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 362.  
Woond in Senegal.

Roode Rui- 3. STRANDLOOPER, met eene roode bek  
ter en pooten, het ligchaam geel  
(*Gambetta.*) en afchgraauw gemengeld,  
van onder wit. ALBIN. *Ois.*  
II. tab. 68.  
Woond in Europa.

Tolk 4. STRANDLOOPER, met roode poe'en,  
 (Interpres.) het ligchaam wit, zwart en  
 roeft coleurig gemengd, de  
 borst en buik wit. *Coulon chaud*,  
*Buff. Hist. Nat. Ois.* 340.  
 Woond in Europa en Noord  
 America.

[(b) Strandlooper, die ros  
 is met zwarte vlak-  
 ken, de kop en hals  
 witen zwart, de roei-  
 pennen bruin. *Edw.*  
*birds.* III. 141.

Woond in Hudfons baay.]

NB. Deze door Hr. LINNAEUS tot de Tolk  
 betrokken, en fchynt zoo geen an-  
 der zoort, ten minften eene aan-  
 merkelyke verfcheidentheid.

Gefcrepte 5. STRANDLOOPER, met den grond van  
 Ruiter den bek en de pooten geel,  
 (Striata.) de ftuurvederen wit, met  
 bruin gebandeerd, en de  
 meeste roeipennen wit. *Che-*  
*valier rayé.* *BRISS. Ornith.* V.  
 p. 196. tab. 18. f. 1.  
 Woondt in Europa.

STRAND-

Morinel 6. STRANDLOOPER, met roode pooten, zwartagtige stuurvederen, die aan hunnen grond wit zyn, het ligchaam grys, de borst zwart. *Coulon Chaud.* BRISS. *Ornith.* V. p. 137. tab. 11. f. 2. CAT. *Carol.* I. 72. tab. 72.  
Woond in America.

Zee Lyfter 7. STRANDLOOPER, met den grond van den bek en de pooten vleeschcoleurig, het ligchaam gevlakt, de wenkbraauwen, en de twee banden op de vleugelen wit. EDW. *Glean.* II. tab. 277. fig. 2.  
Woond in Europa en Noord America.

Gryze 8. STRANDLOOPER, met eene elsgewyze, aan de punt gekromde bek, de pooten gewebd, de borst met witgegolfd. EDW. III. 308.  
Woond in Engeland en Lapland.

Noordsche 9. STRANDLOOPER, met eene elsgewyze aan de punt gekromde bek, de voeten gewed, de borst afchkleurig, de zyden vanden hals roestverwig.

EDW. *birds.* IV. 143.

Woond in Hudfons baay, en Lapland.

Bruine 10. STRANDLOOPER, met gewedde pooten, eene regte geele bek, het ligchaam grys, van onder ros.

EDW. *birds.* IV. 142.

Woond in America.

Alpische 11. STRANDLOOPER, die rood bruin is, met eene zwartagtige borst, de stuurvederen ligt afchgraauw, de pooten bruinagtig.

BRISS. *Ornith.* V. p. 216. tab. 19. f. 2. *Alouette*

*de Mer.*

Woond in Lapland.

Zwitsersche 12. STRANDLOOPER, met eene zwarte bek en pooten van onder zwart, de buik wit, de stuurvede-

vede-

vederen wit, met zwart gebandeerd. *BRISS. Ornith. V. p. 106. tab. 10. fig. 1.*  
Woond in Zwitserland.

Roodbeen 13. STRANDLOOPER, met de punt van den bek gestipt, de pooten groenagtig, de rug bruin en groen, de buik en buitenste stuurvederen wit. *BRISS. Ornith. V. tab. 16. f. 1.*  
Woond in Europa.

(b) Strandlooper met eene gladde bek, groene pooten, een bruin ligchaam met wit gestipt, een witte borst.

Woond in Europa.

Hairfnep 14. STRANDLOOPER, met eene gladde bek, blaauwagtige pooten, het ligchaam afchgrauw met zwarte vlakken: van onder wit, *Puegnette. BRISS. Ornith. V. 183. tab. XVI. f. 2.*  
Woond in Europa.

Knot 15. STRANDLOOPER, met eene gladde  
 (*Canutus.*) bek, afchgrauwe pooten,  
 de voorfte roeipennen gekar-  
 teld, de voorfte ftuurveer  
 wit en ongevlakt. EDW.  
*Glean.* II. tab. 278.  
 Woond in Europa.

Sanderling 16. STRANDLOOPER, met zwarte bek  
 (*Arenaria.*) en pooten, een grysligchaam,  
 dat van onder wit is met ee-  
 ne gryze toomftreep. BRISS.  
*Ornith.* V. tab. 20. f. 2.  
 Woond in Europa.

Strandruiter 17. STRANDLOOPER, met een gladde  
 (*Littorea.*) bek, afchgrauwe pooten,  
 bruine roeivederen, de fchaft  
 der eerfte sneeuw wit. BRISS.  
*Ornith.* V. pag. 203. tab. 17.  
 fig. 2.  
 Woond in Europa.

Bruine (B) STRANDLOOPER, die van boven  
 bruin is, de vederen zwart  
 met bruin gerand, de roei-  
 pennen zwart, met witte  
 ran-



randen. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 300.  
Woond in Europa

Strandlooper  
(*Cinclus.*) 18. STRANDLOOPER, met eene zwarte bek en pooten, wittetoomstreep, het ligchaam en stuit grys en bruin. BRISS. *Ornith.* V. p. 211. tab. 19. f. 1.  
Woond in Europa.

Woodnip  
(*Calidris.*) 19. STRANDLOOPER, met eene zwartagtige bekenpooten, het ligchaam van onder olyfcoleurig, de stuit gestippeld. BRISS. *Ornith.* V. p. 226. tab. 20. fig. 1. *Maubeche.*  
Woond in Europa.

Kleine  
(*Puffilla*) 20. STRANDLOOPER, met eene bruine bek en pooten, het ligchaam van onder rosagtig, de buitenste stuurvederen met een witte schaft, de stuit bont. BRISS. *Ornith.* V. pag. 222. tab. 25. f. 2.  
Woond in St. Domingo.

STRAND-

Bonte  
(*Varia.*)      21. STRANDLOOPER, met eene zwarte  
bek en pooten, het ligchaam  
bruin met wit gemengeld,  
de buik wit, de ftuurvederen  
wit, met bruin gebandeert.  
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 366.  
Woond in Europa.

Bruine  
(*Fusca.*)      22. STRANDLOOPER, met bruine bek  
en pooten en een bruin onge-  
vlakt ligchaam. BRISS. *Ornith.*  
V. p. 148.  
Woond in Senegal.

Braakvogel  
(*Squaterola.*)      23. STRANDLOOPER, met een zwarte  
bek, en groenagtige pooten,  
het ligchaam grys, van onder  
witachtig. BRISS. *Ornith.* V.  
p. 100. tab. 9. f. 1.  
Woond in Europa.

LXXXVII. PLEVIER. De *Bek* fpilrondagtig-  
(CHARADRIUS.) ftomp, [aan het eind  
dikker.]  
De *Neusgaaten* als  
ftreepjes.

Drie

Drie voorvingeren zonder agtervinger.

- Pieper (Hiaticula.) 1. PLEVIER, met eene zwarte borst, een zwartagtig voorhoofd, met een wit bandje, de kruin bruin, de pooten geel. BRISS. *Ornith.* V. p. 63. tab. 5. f. 2. Woond in Europa en America.
- Alexandryn-2. fche (Alexandrinus.) PLEVIER, die bruin is, met het voorhoofd, de hals en rugge streep en buik wit, de zylingsche stuurvederen wit, de pooten bruin blaauw. HASSELQ. *Reiz.* II. d. n. 30. Woond in Alexandrien.
- Schreeuwer 3. (Vociferus.) PLEVIER, met de banden der borst, hals, voorhoofd, en koonen zwart, de staart geel, met eene zwarte band, de pooten geel. [de bek zwart.] CATESB. *Carol.* I. p. 71. tab. 71. Woond in Virginien.
- Egyptische 4. PLEVIER, met eene zwarte borst; band,

(Egyptius.)

band, witte wenkbrauwen,  
de stuurvederen aan de punt  
wit, met eene zwarte band,  
blauwe pooten. HASSELQ.  
*reiz.* N. 31.

Woond in Egypten.

Dottrel

(Marinellus.)

5. PLEVIER, met eene roestverwige  
borst, de band der borst en  
wenkbrauwen wit, de pooten  
zwart. BRISS. *Ornith.* V.  
54. tab. 4. f. 2.

Woond in Europa.

Van Hud-  
fonsbaay

(Apricarius.)

6. PLEVIER, met eene zwarte buik,  
een bruin ligchaam, dat wit  
en geel gestipt is, de pooten  
afschgrauw. EDW. *Birds.*  
III. tab. 140. *the spotted Plover.*

Woond in Zweeden en Canada.

GoudPlevier

(Pluvialis.)

7. PLEVIER, met een zwart en groen-  
gevlakt ligchaam, van onder  
witagtig, de pooten afsch-  
grauw. BRISS. *Ornith.* V.  
pag. 43. tab. 4. fig. 1.

Woond in Europa.

PLE-

Kleine goud-(A) PLEVIER, die van boven zwart-  
 Plevier agtig is, met geele vlakken,  
 van onder wit, de stuurve-  
 deren zwartagtig, met wit  
 engeel aan den rand gevlaakt.  
 BRISS. *Ornith.* V. p. 47.

Gekraagde 8. PLEVIER, met eene zwart gevlaak-  
 (*Torquatus.*) te borst, een wit voorhoofd,  
 de kruin en de halsband  
 zwart, de pooten en bek  
 blaauwagtig. BRISS. *Ornith.*  
 V. p. 70. tab. 6. f. 2.  
 Woond in St. Domingo.

Grysborst (B) PLEVIER, die van boven zwart-  
 agtig is, met geelagtige vlak-  
 ken, de hals en borst grys,  
 de randen der vleugelen geel-  
 agtig, de stuurvederen bruin  
 met witagtige vlakken. BRISS.  
*Ornith.* V. p. 48. tab. 6. f. 1.  
 Woond in St. Domingo.

Engelsche (C) PLEVIER, die van boven grysbuin  
 is, de randen der vederen  
 geel, van onder rosagtig wit,  
 do

de kop wit, geel en grysgelakt, een witte band boven de oogen. BRISS. *Ornith.* V. p. 58.

Woond in Engeland.

Gekraagde (D) PLEVIER, die van boven donker bruin is, van onder wit; de borst met zwarte vlakken, een witte halsband, de stuurvederen witagtig, met rosenzwart gemengeld. BROWN. *Nat. Hist. of Jam.* p. 477. Woond in Jamaica.

Bosch Ple- 9. PLEVIER, met eene zwarte bek en vier pooten, de toomstreep en (Calidris.) stuit grysgelakt, het ligchaam van [boven grysgelakt,] onder wit, ongevlakt, [de kop van voren wit.] BRISS. *Ornith.* V. p. 230. tab. 20. fig. 1. *Mau-beche grise.*

NB. Dit is eene Snip, geen Plevier.

Snep Plevier (E) PLEVIER, die bruin is, met violette vlakken, eene zwarte toom-

toomstreep, en een witte vlak onder de oogen. BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* 365.  
Woond in . . . . .

Griel 10. PLEVIER, die gryis is, de twee  
(*Oedipna-* voorste roeipennen zwart, in  
*mus.*) 't midden wit, de bek scherp,  
de pooten afchgraauw. PEN-  
NANT. *Zool. Britt.* tab. D. I.  
Woond in Engeland en in het  
Oosten.

Mathoen 11. PLEVIER, die wit is, met eene  
(*Himanto-* zwarterug, eene zwarte bek,  
*pus.*) die langer is dan de kop, en  
zeer lange roode pooten.  
BRISS. *Ornith.* V. p. 33. tab.  
3. f. 1. *Echasfe.*  
Woond in Zuid Europa.

Mexicaan- (F) PLEVIER, die wit is, de vleugels  
sche zwart en wit bont, de kop  
van boven zwart. BRISS.  
*Ornith.* V. p. 36. *Echasfe*  
*de Mexique.*  
Woond in Mexico.

Bengaalfche (G) PLEVIER, die van boven glanzig bruin is, met zwart gevlaakt, de kop, de keel en hals zwart, de koonen bleek castanje bruin. BRISS. *Ornith.* V. p. 82. EDW. *Glean.* I. p. 87. tab. 250.  
Woond in Bengale.

Gedoornde 12. PLEVIER, met een zwarte borst, pooten en ftuurvederen, het (*Spinofus.*) agterhoofd gekuifd, de ftuurvederen ter helfte wit, de de vleugels gedoornd. BRISS. *Ornith.* V. p. 86. tab. 7. f. 2.  
(b) Indifche Plevier met een zwarte borst EDW. *Birds.* I. 4 7. *Glean.* II. tab. 280.  
Woond in Egypte.

LLXXIX. KLUIT. De *bek* plat, zamengedrukt elsgewyze, naar boven omgekromt puntig, de punt buigzaam.  
De *pooten* drievingerig, gepalmt.

KLUIT



Kluit 1. KLUIT \* die wit en zwart bont is\*.  
 (Avocetta.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 353.  
 Woond in Europa.

XC. SCHOLEXTER. Eene zaamengedrukte *bek*,  
 (HAEMATOPUS.) aan de punt wigsgewyze.  
 De *neusgaaten* streepsge-  
 wyze.  
 De *pooten* drie vingerig en  
 gespleeten.

Scholexter 1. SCHOLEXTER, [die van boven zwart  
 (Orstalegus.) is, en van onder wit, de kop  
 en de hals zwart, een wit  
 vlakje onder de oogen.] CA-  
 TESB. *Carol.* I. tab. 85.  
 Woond in America.

XCI. WATERHOEN. De *bek* verheven, het op-  
 (FULICA.) perkaak met zynen rand  
 over het onderste flui-  
 tende, het ander kaak  
 been agter de punt bul-  
 tig.

V 2

De

De *neusgaaten* langwerpig.

Het *voorhoofd* kaal.

De *pooten* viervingerigen en wat geveesdt.

Bruin  
(*Fusca.*) 1. WATERHOEN, met een geelagtig voorhoofd, geelagtige dybanden, de pooten ongevliesdt, het ligchaam bruinagtig. BRISS. *Ornith.* VI. p. 6. Woond in Europa.

Koet  
(*Afra.*) 2. WATERHOEN, met een rood voorhoofd, geele dybanden, gevliesde pooten, het lighaam zwartagtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 393. Woond in Europa.

Zeeduivel  
(*Aterrima.*) 3. WATERHOEN, met een wit voorhoofd, roode Dybanden, het 't ligchaam zwartagtig. BRISS. *Ornith.* VI. p. 28. tab. 2. fig. 2. Woond in Europa.

Water- 4. WATERHOEN, met een oranje voorhoofd,

hoentje  
(*Chloropus.*)

hoofd, roode dybanden, de pooten ongevlied, het lichaam zwartagtig. BRISS. *Ornith.* VI. p. 3. tab. 1. f. 1. 2. Woond in Europa en America.

Poula Sul-  
tane  
(*Porphyrio.*)

5. WATERHOEN, met een rood voorhoofd, veele dybanden, ongevliesde pooten, groen lichaam, dat van onder violet is. BRISS. *Ornith.* V. p. 22. p. 512 tab. 42. f. 1. Woond in Indien.

NB. De Heer BRISSON betreft tot deze soort het purper Waterhoentje van EDWARDS, *Birds.* II. tab. 87. het geen eene andere soort is, en geheel donker blaauw, en de Heer EDWARDS zegt zelve, dat hy alom blaauw is: *there is a great likeness of colour al over the body of this bird, so that it needs on ly to be said that it is of a fine blue. — in some light it seems to have a little glos of green on the back:* UL. ALDROVANDUS. *Ornith.* Lib. XX.

part. III. p. m. 129. zegt ook *coeruleus ei toto corpore color*, hy is geheel blaauw, en in een andere was de kop en hals groenagtig, in een derde blaauw. De Heer SALERNE in zyne *Ornithologie* p. 355. n. 13. zegt insgelyks *il a tout le Corps bleu*, nu is het bekend, dat deze vogelkunde van SALERNE een vertaaling van de *Synopsis* van den Heer RAY is, welk ook van den Heer BRISSON hier toe betrokken word. De Heer LINNAEUS had dezen vogel in zyne voorige uitgaave beter als violet zynde beschreeven. Doch in de XIIde volgt hy den Heer BRISSON, welke ook door Dr. HOUTTUYN gevolgt is, en dus hebben zy geen van drie en de regte soort, by gebrek van wel na te zien, beschreeven.

VanCayen. (A) WATERHOEN, met een graauwe  
 ne kop, witte keel, zwarte hals,  
 groene rug, oranje borst,  
 buik en roeipennen, zwarte  
 buik

buik en stuurvederen, de pooten ongevlied. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 352.  
Woond in Cayenne.

Carthageen 6. WATERHOEN, met een blaauw voor-  
fche hoofd, het ligchaam ros, on-  
(*Carthagena.*) gevliedse pooten.  
Woond in Carthagena.

Bruine 7. WATERHOEN met een blaauw voor-  
Blaauwe hoofd, ongevliedse pooten,  
(*Martinica.*) het ligchaam bruin blaauw.  
Woond in Martinica.

XCII. CHIRURGYN. De *bek* wat spilrond en  
(PARRA.) stomp.  
De *Neusgaaten* eyrond, in  
het midden van den  
bek.  
Het *voorhoofd* geknobbeld  
met gekwabde knob-  
bels.  
De *vleugels* gedoorndt.

Van St. DC. I. CHIRURGYN, [met een ros ligchaam  
V 4 van

mingo  
(*Dominica.*) van onder roozen couleur,] matige nagels en geele pooten, [de kwab van het voorhoofd geel.] BRISS. *Ornith.* V. p. 118.  
Woond in St. Domingo.

Van Senegal 2. CHIRURGYN, met matige nagels en  
(*Senegalla.*) roode pooten.

NB. Deze is de Strandlooper van Senegal (zie bl. 267. gesl. 87. A.

Jacana 3. CHIRURGYN, met [zeer lange vingeren,] de agternagels zeer lang, de pooten graauw [het ligchaam castanje bruin, de hals zwart, de roeivederen groen \*.] EDW. *Glean.* III, tab 357.  
(*Jacana.*)  
Woond in Zuid America.

Bonte Chi- 4. CHIRURGYN, met verlengde agter-  
rurgyn nagels, blaauwagtige pooten, [groene roeipennen, het ligchaam gemengeldt, uitros wit en zwart, eene zwarte band over de oogen.] EDW.  
(*Variabilis.*)  
*Birds,*

*Birds.* I. 48. 1.

Woond in Zuid America.

Savacou 5. CHIRURGYN, met verlengde vin-  
(*Chavaria.*) geren, roffe pooten; een ge-  
kuifd agterhoofd\*. BUFF.  
*Hift. Nat. Oif.* 38.

Woond in Cayenne en aan  
de rivier Cinu.

NB. Deze zeer zeldzaame vogel, wel-  
ke ik in geene Cabinetten ge-  
zien heb, dan by den Heer JU-  
LIAANS, maakt misschien een ge-  
flagt op zich zelve, de wonder-  
lyke, zeer breede, in het midden  
gekielde, aan de punt uitgerand-  
de bek, de neusgaaten na by het  
voorhoofd, de twee vleeschige  
banden, welke het opperkaak-  
been als het waare aan het hoofd  
houden, het voorhoofd zonder  
kwab, de zeer korte nagels, schei-  
den hun van dit geslagt zeker af.

XCIII. RALL. De bek van agter dikker zamen-  
(RALLUS.) gedrukt, aan de rug na de punt

toe dunner en fcherp.

De *neusgaaten* eyrond.

De *pooten* viervingerig, en gefpleeten.

Het *Ligchaam* zaamen gedrukt.

Schriek  
(*Crex*)

1. RALL, met roeftverwige vleugelen, [de vederen zwart met roffe randen, de hals en borst afchgrauw, de bek en pooten grys.] BRISS. *Ornith.* V. p. 159. tab. 13. f. 2. *Roi des Cailles.*

Woond in Europa.

Fluweel  
hoentje  
(*Aquaticus.*)

2. RALL, met gryze vleugelen, die met bruin gevlaakt zyn, de zyden met wit gevlaakt, de bek van onder ros \*. BRISS. *Ornith.* V. pag. 151. tab. 12. fig. 2.

Woond in Europa aan de moeraffen.

Pernel  
(*Porzana.*)

3. RALL, met de twee binnenste ftuurvederen, met wit gezoomd, de bek en pooten olyfcoleur.

BRISS.



BRISS. *Ornith.* V. p. 155.  
tab. 13. fig. 1. *Marouette.*  
Woond in Europa.

Bruine 4. RALL, die bruin is, met witte  
(*Fuscus.*) staartvederen, die gegolfd  
zyn, de pooten geel. BRISS.  
*Ornith.* V. p. 173. tab. 15.  
fig. 2.  
Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Groene (A) RALL, die groen is, van onder  
geel, met eene staalcoleuri-  
ge vlak aan het oog. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 368.  
Woond in Cayenne.

Gestreepte 5. RALL, die zwartagtig is, van on-  
(*Striatus.*) der met wit gegolft, eene  
rosse keel. BRISS. *Ornith.* V.  
167. tab. 14. fig. 2.  
Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Gekraagde 6. RALL, die bruin is, van onder met  
(*Torquatus.*) wit gegolfd, eene witte streep  
bo-

bovende oogen. BRISS. *Ornith.*  
V. pag. 170. tab. 15. f. 1.  
Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Philippyn- 7. RALL, die bruin is, van onder met  
sche grysge andeert, witte wenk-  
(*Philippin-* brauwen, de hals van onder  
*sis.*) rosagtig. BRISS. *Ornith.* V.  
p. 163. tab. 14. f. 1.  
Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

VanBengale 8. RALL, die wit is, met eene zwar-  
(*Bengalensis.*) te kop en hals, de rug en  
vleugels groen, de grootste  
flagpennen met rood gevlaakt.  
*Chevalier de Bengale.* BRISS.  
*Ornith.* V. p. 209.  
Woond in Asia.

VanCarolina 9. RALL, die grys is, met een zwar-  
(*Carolinus.*) te kop, de borst loodcolour,  
de bek geel, de pooten groen-  
agtig. EDW. *Birds.* p. 144.  
Woond in Noord America.

RALL,

Virginifche 10. RALL, die bruin is, ongevlakt;  
 (*Virginia-* met bruine bek en pooten,  
*nus.*) CATESB. *Carol.* I. pag. 70.  
 tab. 70.

XCIV. TROMPETTERVO. De *bek* kegelagtig  
 GEL. rolrond verhee-  
 (PSOPHIA.) ven, wat fcherp,  
 het *opperkaakbeen*  
 langer.  
 De *Neusgaaten* ei-  
 rond en wyd.  
 De *pooten* viervin-  
 gerig, en ge-  
 spleeten.

Poephoen 1. TROMPETTERVOGEL, die zwart is,  
 (*Crepitans.*) met eene blaauwe en goud  
 groene borst.  
 Woond in America.

NB. Deze behoort tot de kraanen,  
 zie bladz. 251. gl. 84. C.

XCVI. TRAPGANS. De *bek* aan het *opperkaakbeen*  
 (OTIS.) verwulfd.

De

De *Neusgaten* eirond.

De *tong* gespleeten.

De *pooten* drievingerig.

Trapgans (Tarda.) I. TRAPGANS, die van boven roestcoleurig, en van onder wit is. EDW. *Birds*. II. tab. 73, 74. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* tom. II. p. 86. tab. 245. het mannetje.

Woond in Polen en in het Oosten.

NB. De Heer LINNAEUS geeft dezen bynaam van *Tarda* in navolging van *Aldrovandus*, en *Gesnerus*; welke meenden dat PLINIUS door *Avis Tarda*, den trapgans begreep; zie hier over de voorrede voor dit stuk.

Arabische (Arabs.) 2. TRAPGANS, met opstaande gekuifde ooren, [die zwart zyn, het ligchaam bruin, de buik wit, de hals graauw.] EDW. *Birds*. I. tab. 12. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p. 127.

Woond in Arabien.

TRAP-

Kleine Trap-3. TRAPGANS, die [bruin is met zwart  
gans gevlaakt engewolkt, [de hals  
(*Tetrax.*) zwart met twee witte banden  
in het mannetje.] BUFF. *Hist.*  
*Nat. des Ois.* II. p. 118.  
tab. 10. 25. EDW. *Glean.* III.  
pag. 89. tab. 251.  
Woond in Europa.

Ethiopifche 4. TRAPGANS, die zwart is, met een  
(*Cafræ.*) afch coleurige rug, en witte  
ooren. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* tom. II. p. 128.  
Woond in Ethiopien.

NB. Deze welke de Heer LINNAEUS,  
uit de verzameling der Kaapfche  
Dieren van den Heer J. BURMAN-  
NUS aanhaalt, zegt de Heer BUF-  
FON dezelve te zyn, als die ADAN-  
SON *Voyage de Seneg.* p. 164. on-  
der den naam van vliegende  
Struisvogel befchryft, doch de  
befchryving van ADANSAN met de  
afbeelding van die, by den Hoog-  
gel. Heer BURMANNUS vergely-  
kende, vind ik een aanmerkelyk  
onderscheid in gedaante, verw,  
en pooten. STRUIS-

XCVI. STRUISVOGEL. De *bek* kegelagrig.

(STRUTHIO.) De *Neusgaaten* eirond.

De *vleugels* niet be-  
kwaam tot vliegen.

De *pooten* twee, of drie  
vingerig.

Struisvogel 1. STRUISVOGEL, met twee vingerige

(*Camelus.*)

pooten. (\*) *BUFF. Hist. Nat.*

*Ois.* II. pag. 1. tab. 457.

Woond in Syrien, Arabien,

Lybien, Africa.

Casoar

2. STRUISVOGEL, met drie vingerige

(*Casuarus.*)

pooten, eene naakte kam,

en lellen \*. *BUFF. Hist. Nat.*

*Ois* tom. II. pag. 57. tab. 313.

Woond in Aſien, Sumatra,

Moluccos, Banda, en in

Africa.

Thoujou

3. STRUISVOGEL, met drie vingerige

(*Rhea.*)


pooten, de agterſte vinger

ſtomp en rond.

Woond in America.

(\*) Ik zoude hier de *Solitaire* van den Heer *BUFFON* bygebragt hebben, maar geen kenteekenen der zoort vindende, heb ik denzelven liefſt agtergelaten.

HOEN.



## V. HOENDERBENDE.

*De Bek verheven, het opperkaakbeen verwulft, en met den rand boven het onderste uitsteekende. De Neusgaten met een verheven kraakbeenig vlies halfgedekt. Meer dan XII. Stuurvederen. De Pooten gespleeten; doch met het laatste lid zamen gegroeid.*

**XCVII. WALGVOGEL.** De *bek* in het midden  
 (Dibus.) met twee dwarsche  
 rimpels vernaauwd,  
 beide *kaakbeenderen*  
 aan de punt krom.  
 Het *aangezicht* tot bo-  
 ven de oogen naakt.

Dodaers **WALGVOGEL**, [met een verheeven  
 (*Ineptus.*) borst, het ligchaam zwartag-  
 tig, de slagpennen, stuurve-  
 deren en pooten geel.] Edw.  
*Glean.* II. p. 179. tab. 294.  
 Woond op Banda.

*Iste.* Deels. IIde Stuk. X PAAUW,

XCVIII. PAAUW. De *Kop* met omgekrulde vederen bedekt.

De *Stuurvederen* zeer lang, met glanzige oogen.

Paauw 1. PAAUW, met een platte kuif op de  
(*Cristatus.*) kop, en enkele spooren\*.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom. II. p. 320. tab. 333, 334.  
Woond in Indien Ceilon, en thans in Europa.

Spiegeldra- 2. PAAUW, die de kop wat gekuifd en  
ger twee spooren heeft, [het lig-  
(*Bicalcaratus.*) chaamros, van boven bruin, de rug en vleugels met azuurblauwe, en de staart met

schoone groene ronde vlakken, met geele randen.]  
*Eperronier.* BUFF. *Hist. Nat. Ois.* Tom. II. p. 388. tab. 492, 493. EDW. *Birds.* II. tab. 67. 69.

Woond in China.

NB. Deze Vogel is noch Paauw noch Faifant, maar een middelgeslagt tusschen beiden.

PAAUW,



Japanfche 3. PAAUW , met eene puntige kuif,  
 (*Muticus.*) geen fpooren [de borft en  
 rug met goud blaauw en  
 goudgroengefchubd, de flag-  
 pennen groen met zwarte  
 punten, de ftaart met zeer  
 groote oogen.] *Spiciere.*  
 BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* tom.  
 II. pag. 386.  
 Woond in Japan.

NB. Deze is ook noch Paauw noch  
 Faifant, en behoort tot de voorige.

Chinquis (A) PAAUW, die grys is, met zwarte  
 ftreepen en witte ftippen,  
 de rug met groote fchitte-  
 rende ronde blaauwe vlak-  
 ken. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*  
 tom. II. p. 385. *Chinquis.*  
 Woond in China.

XCIX. KALKHOEN. De *kop* met fpongieufe  
 (*MELEAGRIS.*) knobbeltjes of kwabben.  
 De *keel* met een afhangen-  
 de vliesagtige kwab.

Kalkhoen 1. KALKHOEN, met de kop gekwabd  
(*Gallopavo.*) aan het voorhoofd en de keel,  
de borst van het mannetje  
gebandeerd. *BUFF. Hist. Nat.*  
*Ois.* tom. II. p. 190. tab. 97.  
Woond in Noord America.

Gekuifde 2. KALKHOEN, met opstaande vederen  
(*Cristata.*) op de kop, de slaapen vio-  
let; [het ligchaam rood, de  
dekvederen groen, de eerste  
stuurvederen zwart, de klei-  
nere rozenrood, de hals ge-  
vlakt, de staart lang.] *EDW.*  
*Birds.* I. tab. 13. *Guan.*  
Woond in Zuid America.

NB. Deze is geen Kalkhoen, maar  
een middelslag tusschen de hoen-  
deren en Paauwwiezen.

Gehoornde 3. KALKHOEN, met twee hoornen op  
(*Satyra.*) de kop, het ligchaam rood,  
met witte oogjes. *EDW.*  
*Birds* III. tab. 116.  
Woond in Bengalen.

C. PAAUWIES. De *bek* aan den wortel in beide  
*kaak-*

(CRAX.) *kaakbeenderen* met wafch bedekt.

De *Vederen* op de kop omgekruld.

Van Guajanai, PAAUWIES, met geel wafch, een  
(*Alector.*) zwart ligchaam, en witte buik \*. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* tom. II. p. 392. tab. 86.  
Woond in America.

Roode 2. PAAUWIES, die rood is, met een  
(*Rubra.*) blaauwagtige kop. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* tom. II. pag. 392. tab. 125.]  
Woond in Peru.

Mitu 3. PAAUWIES, met rood wafch, zwart  
(*Mitu.*) ligchaam, en bruine buik.  
Woond in Brazil, Guajane.

Van Curaçao 4. PAAUWIES, met geel wafch, de bult  
(*Globicera.*) op de neus rood, het ligchaam blaauwagtig zwart. EDW. *Glean.* II. tab. 295.  
Woond in Brazil, Curaçao.

Steen Paau- 5. PAAUWIES, met blaauw wafch, de  
X 3 bult

wies  
(*Pauxi.*)

bult der neus blaauw [niet] gekuifd, het ligchaam zwart-agtig, de buik en de staartpunten wit \*. EDW. *Glean.* II. tab. 295. f. 1. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* II. pag. 400. tab. 78.

Woond in in Mexico.

CI. FAISANT.  
(PHASIANUS.)

De *koonen* met een glad naakt vel, [de *bek* een kromme kegel. De *pooten* in de meeste naakt. De *staart* lang met puntig uitlopende stuurvederen.]

(a) *Hoenders* de kop met een kuif, de keel met twee lellen.

Haan  
(*Gallus.*)

I. FAISANT, met een zamengedrukte kwab op de kruin en twee aan de keel, naakte ooren, de staart zamen gedrukt, en regt opstaande. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* II. p. 136. tab. 1.

Ge-

- (b) Gekuifde. BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* II. p. 178. tab. 49.
- (c) Wilde van Afien *ibid.* pag. 179.
- (d) Acoho. *ibid.*
- (e) Krielhoentje van Java *ibid.*
- (f) Hoentje met een kraag van pluimen om de pooten. Uit de Landengte van *Darien* *ibid.* p. 180.
- (g) Krielhoentje van Cambogia, *ibid.*
- (h) Ruigpoot van Bantam *ib.*
- (i) Faisanthoentje uit Indien, *ibid.* p. 181.
- (k) Engelsche *Haan*, *ibid.*
- (l) Turksche.
- (m) Hamburgsche, *ibid.* pag. 182. ALBIN *Ois.* III. t. 13.
- (n) Met omgekeerde vederen, *ibid.*
- (o) Donschoen van Japan, *ibid.* tab. 98.
- (p) Zwarte, met eene kam van Java, St. Jago *ib.* p. 83.
- (q) Zonder stuit uit Perſien, *ib.*
- (r) Met vyf vingeren, *ibid.*

p. 184.

(s) Van Sansevere *ibid.* p. 185.(t) Van Caux, *ibid.*(u) *Faisanten*, zonder lellen.

Karacas 2. FAISANT, die bruin is, van onder  
(*Motmot.*) ros, met eene wigswyze  
staart, de zylyngs stuurvede-  
ren ros \*. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* II. pag. 382. tab. 146.  
Woond in America.

Faisant 3. FAISANT, die ros is, met een blaau-  
(*Colchicus.*) we kop, de staart wigsgewy-  
ze, de koonen getepeldt.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p.  
353. tab. 121.  
Woond in Asia, Africa.

Luen 4. FAISANT, die geel is, met zwart  
(*Argus.*) [gestipt, hetaangezicht rood,  
de nek [en agter overleg-  
gende kuif] blaauw. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* II. pag. 381.  
*Philosoph. transact.* tom. LV.  
88. tab. 3.

Gehoornde (A) FAISANT, die rood is, met witte  
vlak-

vlakken. EDW. *Birds*. III. 116.

Woond in Bengale.

NB. Deze is een Faifant, en geen kalk-  
hoen, gelyk de Heeren LINNAEUS  
en EDWARDS meenden.

Goudlaken-5. FAISANT, met eene geele kuif,  
fche roode borft, blaauwe ftuur-  
(*Pictus*.) vederen, en wigsgewyze  
ftaart \*. EDW. *Birds*. II. tab.  
68. 69. f. 2. BUFF. *Hift.*  
*Nat. Ois*. II. p. 376. tab.  
217. *Tricolor huppé*.  
Woond in China.

Zilverlaken-6. FAISANT, die wit is, met zwarte  
fche ftreepjes, de kuif en buik  
(*Nyctbemer-* donker violet \*. EDW. *birds*.  
*rus*.) II. tab. 66. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois*. tom. II. p. 379. tab.  
123, 124.  
Woond in China.

Hoazin (B) FAISANT, met een ros geele kuif,  
[die uit dunne van elkander  
ftaande vederen beftaat,]  
borft en buik, het ligchaam

donker olyfcoleur met wit gebandeerd, de staart zwart, aan het eind geel. *Buff. Hist. Nat. Ois.* p. 402. tab. 337. Woond in America.

Marail (C) FAISANT, zonder kuif, het lichaam groen, de keel rood, de stuit ros. *Buff. Hist. Nat. Ois.* II. p. 405. tab. 338. Woond in Cayenne.

Caracara (D) FAISANT, met een schoone blauwe hals en borst, de rug grys bruin, de vleugels en staart zwart. *BUFFON. Hist. Nat.* tom. II. pag. 407. Woond in de Antilles.

Chacamel (E) FAISANT, die van boven bruin is, van onder wit, de bek en pooten blaauw. *Buff. Hist. Nat. Ois.* II. p. 409. Woond in Mexico.

CH. POULEPEINTADE. De kop gehoornd met een



(NUMIDA.) een zamengedrukte  
gecoleurde hoornige  
kwab.

De *lellen* vleefchig en  
gekwabd.

De *bek* met wasch, in  
het welke de *Neus-*  
*gaten* loopen.

Gehoornde I. POULEPEINTADE, [met een zwart  
(*Meleagris*.)

blaauw ligchaam met witte  
vlakken en een celtatige  
kruin \*.] BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* tom. II. p. 216. tab. 108.

(a) Met een ligt paarel colour  
ligchaam met blaauwe  
vlakken \*.

(c) Witte \*.

(d) Bonte \*.

Woond in Africa.

Gekuifde (A) POULEPEINTADE, zonder lellen,  
wiens kop gekuifd is met  
eene zwarte kuif. PALL. *Dierk.*

*Mengelw.* VI. p. 9. f. 1.

Woond in Ooft-Indien.

Gemyterde (B) POULEPEINTADE, met een kegel-  
agti-

agtige myter op de kop, de keel met eene plooy, de pooten zwart. PALL. *Dierk. Mengelw.* bl. 11.

Woond in Africa.

CIII. BERKHOEN. Eene naakte getepelde vlak  
(TETRAO.) aan de oogen.

(a) met ruige pooten.

Ourhaan 1. BERKHOEN, met ruige pooten, een  
(*Urogallus.*) gerande staart, en witte oxelen.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. pag. 239. tab. 73, 74. *coq de bruyere.*

(b) *Bergfaisant.* EDW. *Birds.* III. 117.

Woond in Europa, en America.

Vorkstaart 2. BERKHOEN, met ruige pooten, een  
(*Tetrix.*) gevorkte staart, de tweede rei slagpennen aan den wortel wit.

BUFF. *Hist. Nat. des Ois.* tom. II. pag. 255. tab. 173, 174.

Woond in Europa

BERK.

van Canada 3. BERKHOEN, met ruige pooten, de  
 (*Canadensis.*) stuurvederen zwart, aan de  
 punt ros, met twee witte  
 vlakken aan de oogen. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* tom. II. p.  
 313. tab. 131, 132. EDW.  
*Birds.* III. 118. 71.  
 Woond in Canada.

Sneeuw- 4. BERKHOEN, met gepluimde poo-  
 hoen ten, witte slagvederen, de  
 (*Lagopus.*) stuurvederen zwart, aan  
 de punt wit, de middel-  
 ste wit. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* II. pag. 301. tab. 129.  
 494.  
 Woond in Europa.

Gekuisde 5. BERKHOEN, met ruige pooten, en  
 Veldhoen kleine wickjes aan den hals.  
 (*Cupido.*) CAT. *Carol.* I. tab. 1. BUFF.  
*Hist. Nat.* II. p. 314. tab. 104.  
 Woond in Virginien.

Schilddrager 6. BERKHOEN, met ruige pooten, de  
 (*Umbellus.*) halsvederen uitstaande. EDW.  
*Glean.* I. tab. 248.  
 Woond in Pensilvanien.

BERK-

Canace 7. BERKHOEN, met ruige pooten, een  
(*Canace.*) geheele staart, een witte vlak  
agter de neusgaten en ooren.  
BRISS. *Ornith.* p. 203. tab.  
20. f. 1, 2.  
Woond in Canada.

Getabberde 8. BERKHOEN, met ruige pooten, de  
(*Togatus.*) oxelvederen lang, zwart en  
blauw. BRISS. *Ornith.* I. p.  
207. tab. 2 f. f. 1.  
Woond in Canada.

Hazelhoen 9. BERKHOEN, met ruige pooten,  
(*Bonasia.*) afchgrauwe stuurvederen,  
met zwarte stippen, en een  
zwarte band, behalven op de  
twee middelste [het ligchaam  
ros en zwart gegolfdt.] Het  
mannetje met eene zwarte  
keel en een kuif. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois* II. p. 274. tab.  
274, 475. *Gelinotte.*  
Woond in Europa.

(b) *Met naakte pooten.*

Fraucolin 10. BERKHOEN, met naakte gespoode  
de

(*Francoll-  
nus.*)

de pooten, de buik en keel  
zwart, de staart wigsgewyze.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tom.  
II. p. 445. tab. 147, 148.  
Woond in Europa.

Pyreneische 11. (*Albata.*)

BERKHOEN, met wat ruige, onge-  
spoorde pooten, de mid-  
delste stuurvederen tweemaal  
langer elsgewyze. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* tom. II. pag. 183. tab.  
105, 106. *Ganga.* EDWARD.  
*Glean.* I. tab. 249.  
Woond te Montpellièrs, op  
't Pyreneefche gebergte,  
en in Syrien, Arabien.

van Senegal (A)

BERKHOEN, dat bleek ros is, met  
eene geele keel, blaauw aan  
de oogen. BUFF. *Ois.* tom.  
II. 130.  
Woond in Senegal.

Rosse  
(*Rufus.*)

12. BERKHOEN, met naakte gespoor-  
de pooten, die gelyk de bek  
rood zyn, de keel wit met  
een zwarte band, met wit ge-  
stipt.

stipt. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
tom. II. pag. 431. tab. 231.  
*Bartavelle.*

Woond in Zuid Europa.

(b) Roode Patrys. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* II. p. 439. tab. 150.  
Woond in Europa.

Patrys 13. BERKHOEN, met naakte gespoor-  
(*Perdix.*) de pooten, een naakte roode  
vlak onder de oogen, de staart  
roestcoleurig, de borst bruin\*.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
p. 415. tab. 27. [het wyfje.]  
Woond in Europa.

Berg Patrys (B) BERKHOEN, dat ros is, met een  
bleeke kop en hals, de stuur-  
vederen bruin. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* II. p. 430. tab. 136.  
Woond in Europa.

van Senegal 14. BERKHOEN, met een bruin lig-  
(*Bicalcaratus.*) chaam, dat met zwart ge-  
vlakt is, een witte en eene  
bruine streep aan de oogen;  
de pooten dubbel gespoordt.  
BUFF.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p. 450. tab. 137. *Bisergot.*  
Woond in Senegal.

Africaan- (C) BERKHOEN, dat zwart bruin is, met  
fche eene roode keel, en pooten,  
die dubbel gespoord zyn.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p. 450.  
tab. 180.  
Woond in Africa.

Mexicaan- 15. BERKHOEN, met ongespoorde  
fche naakte pooten, die benevens  
(*Mexicanus.*) de bek rood zyn, en een  
streep boven de wenkbraau-  
wen.  
Woond in Mexico, Louifanien.

Gepaerelde (D) BERKHOEN, dat donker bruin is,  
de borst en zyden met ron-  
de vlakken, en vier banden  
onder de oogen. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* II. p. 452. n. 3.  
Woond in China.

Virginifche 16. BERKHOEN, met naakte pooten,  
(*Virginia-* een zwarte band onder en  
*nus.*) boven de oogen, een rosfe  
Iste. Deel. IIde Stuk. Y steep

streep op de kruin. **CATESB.**  
*Carol.* III. p. 12. tab. 12.  
 Woond in America.

Van Nieuw 17. **BERKHOEN**, met naakte pooten,  
 Engeland witte wenkbrauwen, de hals  
 (*Marilandicus.*) wit en zwart gestipt. **ALBIN.**  
*Ois.* I. p. 26. tab. 28.  
 Woond in Maryland.

Gekuijde 18. **BERKHOEN**, met naakte onge-  
 (*Cristatus.*) spoorde pooten, eene afhan-  
 gende roffe kuif, en roffe  
 keel. **BUFF.** *Hist. Nat. Ois.*  
 II. p. 483. tab. 126. 1. *Zo-  
 né-Colin.*  
 Woond in Mexico, Guajania.

Colin (E) **BERKHOEN**, dat ros is, de kop  
 wit en zwart gemengeld, de  
 bek en pooten zwart. **BUFF.**  
*Hist. Nat. Ois.* II. p. 484.  
 Woond in America.

Coyoleos (F) **BERKHOEN**, dat van boven wit en  
 ros is, van onder ros, met  
 twee witte en zwarte banden  
 langs



langs den hals. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p. 485.  
Woond in Mexico.

Colenicui (G) BERKHOEN, dat ros is, van onder wit met zwart gegolfd, een witte zwarte vlak aan de oogen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* II. p. 486. tab. 149.  
Woond in Louifanien.

Chineefche 19. BERKHOEN, met naakte onge-  
(*Chinensis.*) spoorde pooten, een grys gevlakt ligchaam, met een zwarte keel met een witte boog. EDWARDS *Glean.* I. pag. 77. tab. 247. BUFF. *Hist. Nat.* II. pag. 477. tab. 126.  
Woond in China, de Philip-  
pynfche Eilanden.

Wachtel 20. BERKHOEN, met naakte pooten,  
(*Coturnix.*) een grys gevlakt ligchaam, witte wenkbrauwen, de ftuurvederen met een roeft-  
coleurige rand en maantjes.

Buff. *Hist. Nat. Ois.* II. p.  
454. tab. 170.

(b) Poolfche.

(c) Van de Maloiunfche Ei-  
landen. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* tab. 222.

(d) Van Madagafcar. BUFF.  
*Hist. Nat.* tom. II. p. 478.  
tab. 171.

(e) Van Java.



## V I. M U S S C H E N.

*De bek kegelachtig, fcherp gepunt. De  
Neusgaaten eirond, naakt, wyd.*

CIV. DUIV. Eene regte *bek* aan de punt wat  
(COLUMBA.) krom.

De *Neusgaten* langwerpig, met  
een zagt gezwollen vlies half  
gedekt.

De *Tong* geheel.

(a) Met eene gelyke *ftaart*.

DUIV,

Hout Duiv 1. Duiv, die blaauwagtig is, met een  
(*Oenas.*) glanzig groenen hals, het ag-  
terste van de rug wit, de  
band der vleugelen en punt  
der staart zwartagtig \*. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* tab. 466.  
Woond in Europa

Spaansche 2. Duiv, met een wit semelagtig  
(*Hispanica.*) wasch. [de bek regt \*.] BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* tom. IV. p.  
329. edit. 12.  
Woond in Europa.

Ruigpoot (3) Duiv, met gevederde pooten \*.  
(*Dasyptus.*) Woond in Europa.

Kropper 4. Duiv, met een opgezette borst.  
(*Gutturosa.*) (a) Bleek roode wyn coleuri-  
ge [*Soup en vin*] BUFF.  
(b) Witte.  
(c) Witte met gevederde poo-  
ten, en lange vleugels \*.  
(d) Gryze en gryze gevlak-  
te \*.  
(e) Staalgrauwe \*.  
(f) Blaauw en witte.

- (g) Vuurcoleurige.  
 (b) Nooteboomverwige.  
 (k) Caslanje bruine met witte vleugels.  
 (k) Fluweel zwarte.
- Kapper 5. DuiV, met de vederen van het achterhoofd regt opgekruld \*.  
 (*Cucullata.*) Woond in Europa.
- Ruige 6. DuiV, met kleine opstaande veertjes, hier en daar op de rug en vleugelen.  
 (*Hispida.*) Woond in Indien.
- Meeuw 7. DuiV, met de borstvederen gekruld \*. *Buff. Hist. Nat. Ois.* tom. IV p. 321. tab. XIV. e. dit. 12°.  
 (*Turbita.*) Woond in Europa.
- Paauwe 8. DuiV, met eene opstaande breede staart veelvederige staart. *Buff. ibid.* tab. XIII.  
 (*Laticauda.*) Woond in Europa.
- Tuimelaar 9. DuiV, die onder het vliegen zig omwenteld \*.  
 (*Gyratrix.*) Woond in Europa.
- DuiV,

Nonnetje 10. DuiV, met het hoofd, de roeien  
(*Galeata.*)                    stuurpennen van een ander  
  coleur dan het ligchaam.  
  Woond in Europa.

Turksche 11. DuiV, met een rood tepelagtig  
(*Tarcica.*)                    wasch. BUFF. *Hist. Nat. des*  
  *Ois.* tab. 110.  
  Woond in Europa..

Postduiv 12. DuiV, met rood geknobbeld wit-  
(*Tabellaria.*)                agtig wasch, en naakte oog-  
  leden.  
  Woond in Europa.

Bergduiv 13. DuiV, met naakte roode oog-  
(*Montana.*)                kringen, een ros lighaam,  
  dat van onder geel is. EDW.  
  *Birds.* III. 119.  
  Woond in Jamaica.

Witkop 14. DuiV, met witte oogkringen en  
(*Leucocephala.*)            kruin, het ligchaam blaauw-  
  agtig. CATESB. *Carol.* I. tab. 25.  
  Woond in Noord America.

Witvleugel 15. DuiV, met naakte blaauwe oog-  
(*Leucoptera.*)            kringen, afchgrauwe stuur-  
  vede-

vederen, die aan de punt wit zyn, de middelste bruin, [het ligchaam bruin, de rug en buik blaauw.] Edw. *Birds*. II. 76. Woond in Indien.

Guineefche 16. DuiV, met naakte roode oogkringen, (Guinea.) de vleugels met witte driehoekige vlakken, de ftuurvederen aan de punt zwart, [het ligchaam rood, de hals blaauw.] Edw. *Birds*. II. 75. Woond in Africa.

NB. Deze is eene TortelduiV.

Kroonvogel 17. DuiV, met zwarte oogkringen, (Coronata.) eene opstaande kuif, blaauw-agtig lichaam, en roode fchouders \*. Edw. *Glean*. II. tab. 338. Buff. *Ois*. 118. Woond in Banda.

Geftreeppte 18. DuiV, met witte oogkringen en (Striata.) toomftreep, het lichaam afch-graauw en zwart geftreept, van onder ros. Edw. *Birds*. I. p. 16. tab. 16. Woond in Ooft-Indien.

DuiV,

Ringduiv 19. DuiV, met de stuurvederen van  
 (Palumbus.) agter zwart, de eerste roei-  
 pennen aan den buiten rand  
 wit, de hals aan wederzy-  
 den wit [het ligchaam blaauw,  
 de borst bleek rood.] BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 316.  
 Woond in Europa en Asia.

Blaauwkop 20. DuiV, met een blaauwe kop, en  
 (Cyanosepha- eene witte band onder de oo-  
 la.) gen. [Het ligchaam rood, de  
 buik geel, de hals van voo-  
 ren blaauw, met een witte  
 rand.] BUFF. *Ois.* tab. 174.  
 Woond in Jamaica.

NB. Dit is een Tortelduiv,

van Madaga-21. DuiV, met gepluimde pooten,  
 fcar een violette staart, het lig-  
 (Madagasca- chaam zwartagtig blaauw.  
 riensis.) BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 11.  
 Woond in Madagafcar.

Phillippyn- (A) DuiV, die groen is, met een pur-  
 sche pere borst, en geele buik.  
 BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* tab.  
 138.

Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Kopercoleu-22. DuiV, met gepalmde pooten, de  
rige bek en pooten groen, het  
(*Aenea.*) het ligchaam kopercoleurig.

BRISS. *Ornith.* I. p. 148. tab.  
13. f. 2.

Geelfluit (B) DuiV, met gepluimde pooten, die  
groen is, met violette schou-  
ders, de ftuurvederen graauw  
van onder rood, met eene  
geele rand, de ftuit geel, de  
roeipennen zwart met geele  
randen. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*  
tab. 111.

Woond in Madagafcar.

Groene 23. DuiV, die groen kopercoleurig is,  
(*Viridis.*) het ligchaam van onder vio-  
let. BRISS. *Ornith.* I. pag.  
152. tab. 15. fig. 2.

Woond in Amboine.

Schoone (C) DuiV, die groen is, met zwarte  
vleugels, de dekvederen en  
ran-



randen der roeipennen geel.

BUFF. Ois. 163.

Woond in Amboina.

Van Marti- 24. DuiV, die violetagtig is, met een  
nique

(*Martinica*.)

rosagtige buik, de roeipen-  
nen van binnen ros. BRISS.

*Ornith.* I. pag. 129. tab. 12.

fig. 1.

Woond in Martinica.

Van Jamaica 25. DuiV, met blaauwe stuurpennen,

(*Jamaicensis*.)

aan het eind met eene witte

streep, [de buik wit.]

Woond in Jamaica.

Van Senegal 26. DuiV, die de drie buitenste stuur-

(*Senegallensis*.)

vederen aan de onderste

helft wit heeft, de hals van

onder met 'zwart gevlacht.

BRISS. *Ornith.* I. p. 125. tab.

8. fig. 3.

Woond in Senegal.

van Nicom- 27. DuiV, met een lange witte staart,  
bar

(*Nicobarica*.)

het ligchaam zwart, blaauwe

stuurvederen, groene rug, de

hals vederen verlengd, [groen

goud

goud paarsch \*.] BUFFON.  
*Hist. Nat. des Ois.* 491.  
 Woond in Nicombar.

Goudgroene(D) DUV, die blaauw is, met eene  
 goudgroene rug, vleugels en  
 staart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
 tab. 164.  
 Woond in de Molucces.

Chineefche 28. DUV, die bruin is, met zwart ge-  
 bandeerd, de buik wat bloed-  
 coleurig, de vleugelen geel, de  
 roeipennen, en de bek zwart.  
 Woond in China.

Indifche 29. DUV, met een purper ligchaam,  
 groene schouders, eene  
 blaauwagtige kruin. EDW.  
*Birds.* I. tab. 14.  
 Woond in Ooft-Indien.

(b) Tortel Duiven.

van Canada 30. DUV, met de voorfte roeipennen  
 aan den punt geelagtig, de  
 ftuurvederen byna asgrauw:  
 de buitenfte wit. BRISS. *Or-  
 nith.* I. p. 118.  
 Woond in Canada.

DUV,

van Batavia (E) DuiV, die groen is, een blaauwe kop, geele keel en stuit, de buitenste stuurvederen rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 214.  
Woond in Batavia.

African- 31. DuiV, die de buitenste stuurve-  
sche deren aan den grond wit  
(*Afra.*) heeft, eene witte vlak aan de  
punt, de vlakken der dek-  
vederen azuurblauw. BRISS.  
*Ornith.* I. pag. 122. tab. 10.  
fig. 1.  
Woond in Senegal.

Tortel DuiV 32. DuiV, met de stuurvederen aan  
(*Turtur.*) de punt wit, met een gryze  
rug, de zylingfche vlak aan  
den hals zwart, met witte  
streepjes, de borst incar-  
naat \*. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
394.  
Woond in Indien.

Lach-DuiV 33. DuiV, van boven geelagtig, met  
(*Risoria.*) een zwart maantje aan den  
hals \*, [de roei en stuurve-  
ve-

deren blaauw \*. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 244.  
Woond in Indien.

Roodbuik (E) *Duiv*, die van boven misvaal is, van onder tegelrood, een maansgewyze vlak aan den hals. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 161.  
Woond in Senegal.  
(b) Met drie azuure vlakjes op de vleugels, zwarte roeien stuurpennen, *ibid.* 160.  
Woond in Senegal.

Groenrug (F) *Duiv*, die het hoofd, hals en borst kopercoleurig heeft, de rug en vleugelen groen, de roeien en stuurpennen bruin. *Buff. Hist. Nat. Ois.* 177.  
Woond in Java.

Roodhals (G) *Duiv*, die groen is, met een blaauw voorhoofd, roode keel en hals, van vooren de dekvederen wit gerandt. *Buff. Hist. nat. Ois.* 142.  
Woond in Amboine.  
*Duiv*,

Musch-Duiv<sup>34</sup>. DUIV, met donker-coleurige stuur-  
(*Passerina*.) vederen en roeipennen, pur-  
peragtig ligchaam, geele bek  
en pooten. CATESB. *Carol. I.*  
tab. 26.

Woond in America, tus-  
schen de Keerkringen.

Kleine 35. DUIV, die bruin is, met vyf staa-  
(*Minuta*.) blaauwe vlakjes, de stuur-  
vederen aan het eind wit\*.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 243.  
Woond in St. Domingo en  
Martinique.

(c) Langstaartige.

Trekduiv 36. DUIV, met eene wigsgewyze staart,  
(*Migrato-* bloedroode naakte oogkrin-  
*rius*.) gen, een roffe borst. CAT.  
*Carol. I.* 23.

Woond in Noord America.

van Canada (H) DUIV, die bruin is, de kop, de  
agterrug, de twee rei stuur-  
vederen azuurblauw, de hals  
tegelrood, de buik wit.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 176.

Woond in Canada.

DUIV,

van Carolina 37. DUIV, met een lange wigsgewyze staart, blaauwe oogkringen, van onder rosagtig.

(*Carolinensis.*)

CATESB. *Carol.* I. tab. 24.

Woond in America.

Bruine (I) DUIV, die bruin is, van onder geel, de ftuur en roeipennen ftaalblaauw.

BUFF. *Hift. Nat.*

*Ois.* tab. 175.

Woond in Carolina.

van Amboina 38. DUIV, met een lange wigsgewyze staart, een ros ligchaam,

(*Amboinensis.*)

de halszwart gegolfd.

BRISS. *Ornith.* I. p. 127. tab. 9. f. 3.

Woond in Amboine.

Langftaart (K) DUIV, die boven ros is, van onder bruin geel, de ftuurveren aan de punt en rand wit.

BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 329.

Woond in Senegal.

Kaapfche 39. DUIV, met een wigsgewyze staart, de eerfte roeipennen aan de binnenzyde ros.

(*Capensis.*)

BRISS. *Ornith.*

I. p. 120. tab. f. 2.

Woond

Woond aan de Kaap de goede Hoop.

Gerande 40. DuiV, met een lange wigsgewyze  
(*Marginata.*) staart, een roode borst, de  
flagpennen aan de punt zwart  
met wit gerandt, [het lig-  
chaam grys met zwarte vlak-  
ken, de hals en het voor-  
hoofd zwart;] EDW. *Birds.*  
I. 15. tab. 15.  
b BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 487.  
Woond in America.

Witbuik (L) DuiV, die bruin is, de hals van  
agter blaauw, als ook de be-  
neden rug en de randen der  
eerste stuurvederen, de buik  
wit, de bek en pooten rood.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 176.  
Woond in Canada.

Zwarthals (M) DuiV, die graauw is, de hals  
van vooren zwart, als ook  
de flagpennen, de vleugels  
blaauwagtig, de agterste flag-  
pennen vermillioen rood, de  
middelste stuurpennen zeer

Iste Deel IIde Stuk.

Z

lang

lang. BUFFON *Hist. Nat. Ois.*  
140.

Woond aan de Caap.

CV. LEEUWRIK. De *bek* elsgewyze rolrond regt  
(ALAUDA.) uitgestregt, de *kaakbeenderen*  
gelyk, van agter nederwaards  
gaapende.

De *tong* gespleeten.

De *nagel* der agterste vinger  
zeer lang.

Akkerleeuw-1 LEEUWRIK, met de twee buitenste  
rik stuurvederen aan de buiten  
(*Arvensis.*) zyde wit, de middelste aan  
binnenzyde roest colourig\*.  
Woond in Europa.

Veldleeuw-2 LEEUWRIK, die de twee buitenste  
rik stuurvederen van buiten wit  
(*Pratensis.*) heeft, de streep der wenk-  
brauwen wit\*.  
Woond in Europa.

Boomleeuw-3 LEEUWRIK, met een ronde witte band  
rik om de kop. BRISS. *Ornith.*

III.



(*Arborea.*) III. p. 340. tab. 20. f. 1.  
Woond in Europa.

Zoodjes 4 LEEUWRIK, met bruine fluurvede-  
Leeuwrik ren; aan de onderste helft  
(*Canpestris.*) wit, behalven de twee mid-  
delfte, de borst en keel geel-  
agtig.  
Woond in Europa.

Picker 5 LEEUWRIK, met bruine fluurvede-  
(*Trivialis.*) ren, de buitenste half wit,  
de tweede aan de punt wigs-  
wyze wit, en een dubbele  
witte streep op de vleugels.  
Woond in het Noorden van  
Europa.

Gekuifde 6 LEEUWRIK, met zwarte fluurvede-  
(*Cristata.*) ren, de twee buitenste aan  
den rand wit, de kop ge-  
kuifd \*.  
Woond in Europa.

Rosvleugel (A) LEEUWRIK, die graauw is, met  
een bleeke kuif, met een  
bruine streep, het bovenste  
der vleugelen bleek rood,

de keel wit, met eene zwarte streep, de bovenste slagpennen wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 503. R. *Cochervis*.  
Woond in Europa.

Witbuik (B) LEEUWRIK, die graauw is, met een bruine kuif, met zwart gestipt, de buik wit. BUFF. *ibid.* f. 2.  
Woond in Europa.

Spinolet 7 LEEUWRIK, met bruine stuurvederen: de twee buitenste schuins, (*Spinoletta*.) ter helfte wit.  
Woond in Italiën.

Kaapsche 8 LEEUWRIK, met de drie zylyngsche (*Capensis*.) stuurvederen aan de punt wit, de keel geel, met zwart gerand, de wenkbrauwen, [en stuit] geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 504. 2.  
Woond aan de Caap.

van Senegal (C) LEEUWRIK, die bruin is, met een witte buik, en afhangende kuif, de buitenste stuurvederen

deren wit, de middelste  
 zwart, de overige bruin.  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 504. 1.  
 Woond in Senegal.

Calander 9 LEEUWRIK, met de buitenste stuur-  
 (Calandra,) vederen geheel wit, de twee-  
 de en derde aan de punt wit,  
 een bruine band op de borst.  
 BRISS. *Ornith.* III. pag. 352.  
 tab. 20. f. 2.  
 Woond aan de Alpische ber-  
 gen.

Gekraagde (D) LEEUWRIK, met alle de stuurvede-  
 ren bruin, de wenkbrauwen  
 wit, een zwarte band om den  
 hals. EDW. *Glean.* II. tab. 268.  
 Woond in . . . . .

Bruinborst (E) LEEUWRIK, die bruin is, van on-  
 der bleeker, de borst met  
 een bruine vlak. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 363. Calandre.  
 Woond in Europa.

Americaan- 10 LEEUWRIK, met de stuurvederen  
 fche ter helfte wit, de keel geel,  
 (Alpestris.) een zwarte band onder de  
 Z 3 oogen

oogen en om de borst. CAT.  
*Carol.* I. p. 32. tab. 32.  
 Woond in Noord America.

Groote  
 (*Magna.*)

II LEEUWRIK, die van onder geelis,  
 met een zwarte kromme borst  
 band; de drie zylingfche  
 ftuurvederen wit. CAT. *Ca-*  
*rol.* I. p. 33. tab. 33.  
 Woond in Africa, America.

Lyfter  
 Leeuwrik

(F) LEEUWRIK, die bruin is, van on-  
 der wit, de borst en keel  
 geel met half maansgewyze  
 vlakken, de ftuurvederen  
 met de punt der fchacht uit-  
 fteekende. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 490. *Calandrotte.*  
 Woond . . . . .

CVI. SPREEUW.  
 (STURNUS.)

De bek elsgewyze, hoekig,  
 wat ftomp, het *opperkaak-*  
*been* zeer geheel, de randen  
 wat gaapende.

De *Neusgaaten* van boven met  
 een randje.

De *tong* puntig uitgerand.

SPREEUW,

Gemeene 1 SPREEUW, met eenen geelagtigen  
(*Vulgaris.*) bek, het ligchaam zwart met  
witte puntjes\*.

Woond in Zuid Europa.

Caapfche 2 SPREEUW, die zwartagtig is, met  
(*Capensis*) de zyden van de kop, en  
onder wit, [alfook de bene-  
den rug, en den band der  
vleugelen, bek en pooten  
geel.] BUFFON. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 280.

Woond aan de Kaap.

Louifaan- 3 SPREEUW, die gryf en bruin gevlaakt  
fche is, de koplyn en wenkbraau-  
(*Ludoviciana.*  
*nus.*) wen, wit de keel zwart.  
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 256.

Woond in Louifanien.

Bengaalfche 4 SPREEUW, die bruin is, de oogvlak,  
(*Contra.*) de band der vleugelen, en  
buik wit, [de kop zwart met  
eene groene glans, de breed-  
fte band der middelste ftuur-  
vederen wit.] EDW. *Birds.*  
IV. tab. 187.

Watermeerl5 SPREEUW, die zwart is, met een  
(*Cinclus.*) witte borst.

Woond in Europa.

Roodborst (A) SPREEUW, die van boven bruin  
is, de hals van voren, de borst,  
de oogkringen, en de vlak  
voor de oogen, de schouders  
schoonrood, de streep onder  
de oogen, de zyden, buik en  
stuurvederen zwart. BUFF,  
*Hist. Nat. Ois.* 113. LINN.  
*Mant. alt.*

Woond aan de Magellanes.

CVII. LYSTER. De *bek* spilrond, van boven mes  
(TURDUS.) gewyze, het *opperkaakbeen* aan  
de punt krom, en uitgerand.  
De *neusgaaten* naakt, van bo-  
ven ter helfte met een vlies-  
je gedekt.  
De *keel* met hairtjes.  
De *tong* gescheurd en uitge-  
rand.

Gemeene I LYSTER, met een bruine rug, de  
hals

(*Viscivorus.*) hals met witte vlakken\*.  
Woond in Europa.

Kramsvogel 2 LYSTER, met zwarte stuurvederen,  
(*Pilaris.*) de buitenste aan de punt van  
den binnensten rand wit, de  
kop en stuit grysk. ALB. *Ois.*  
I. tab. 36.  
Woond in Europa.

Koperwiek 3. LYSTER, met de vleugels van on-  
(*Iliacus.*) der roestverwig, en witag-  
tige wenkbraauwen. BRISS.  
*Ornith.* II. pag. 208. tab.  
20. f. 1.  
Woond in Europa.

Zinglyster 4 LYSTER, met de slagvederen van  
(*Muscus.*) binnen aan hun begin roest-  
verwig.  
Woond in Europa.

Olyfcoleu- 5 LYSTER, die bruinagtig is, van on-  
rige der ros geel. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 221. *Merle.*  
Woond aan de Caap.

Treklyster 6 LYSTER, die grysk is, met een ros  
Z 5 fe

(*Migrato-  
rius.*)

fe buik, witte wenkbraauwen, de buitenste stuurvederen aan de binnenste hoeken wit. CAT. *Carol.* I. 29.  
Woond in America.

Geele  
(*Trichas.*)

7 LYSTER, die olyfcoleurig is, met een geele buik, een zwarte band aan de oogen. EDWARDS *Glean.* I. p. 56. tabl 237. f. 2.  
Woond in Noord America.

NB. Dit is een Vliegvinger.

Chineefche  
(*Canorus.*)

8 LYSTER, die gryis is, van onder roestcoleurig, een witte streep aan de zyden van de kop, de staart gerand. EDW. *Birds.* IV. 184.  
Woond in Bengale, China.

Roffe  
(*Rufus.*)

9 LYSTER, die roestverwig is, van onder bleeker gevlaakt, de slagpennen eencoleurig, de staart gerand, de stuurvederen ros. CAT. *Carol.* I. p. 28. tab. 28.  
Woond in America.

Praater

10 LYSTER, die donker afchgrauw is,  
van



(*Polyglottus*.) van onder bleek, de buienste roeivederen aan den buitenste helft wit. *CAT. Carol.* I. p. 27. tab. 27.  
Woond in Virginia Carolina Jamaica.

Zanger 11 LYSTER, met een bruine rug, de  
(*Orpheus*.) borst en ftuurvederen witagtig, en witte wenkbrauwen. *Edw. Birds.* II. 78.  
Woond in America.

Loodcoleu- 12 LYSTER, die blaauwagtig is, de  
rige keel wit met zwart geftippt,  
(*Plumbeus*.) de ftart wigsgewyze [zwart met witte punten, de flagpennen zwart met wit gerand, bek en pooten rood.]  
*Buff. Hist. Nat. Ois.* 560. 1. *Merle.*  
Woond in America.

Rotsmeerl 13 LYSTER, met een blaauwe kop, en  
(*Saxatilis*.) roeftcoleurige ftart, [de fchoft en vleugels zwart, de rug wit, de buik oranje met witte vlakken, en zwarte ftip.

stippen \*.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 562.

Woond in Zwitserland,  
Pruiffen, Oostenryk.

Glanzige (Nitens.) 14 L Y S T E R, die groen is, de dekvederen der vleugelen violet glanzig. BRISS. *Ornith.* II. 311. tab. 30. fig. 2.  
Woond in Angola.

Fraaye (A) L Y S T E R, die vanboven goudgroen is, van onder oranje. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 358. Merle.  
Woond in Senegal.

Witvlak (B) L Y S T E R, die donker olyfcoleurig is, eene witte vlak op de vleugels, van onder wit, de staart zeer lang. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 558. 1. Merle.  
Woond in St. Domingo.

Roosmeerl (Roseus.) 15. L Y S T E R, die bleek rood is, de kop vleugels en staart zwart, het agterhoofd gekuifd. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 251.  
Woond in Bourgogne, Lapland, en Zwitserland.

Lys.

Groenagtige(C) L Y S T E R, die van boven groenagtig bruin, en van onder geelagtig wit is. *BUFF. Hist. Nat. Ois. 558. 2. Merle.*  
Woond in Cayenne.

Zwart Calot (D) L Y S T E R, die donker graauw is, de stuit wit, het hoofd van boven zwart. *BUFF. Hist. Nat. Ois. 557. 2 Merle.*  
Woond in Madagafcar.

Goudvlerk (E) L Y S T E R, die bruin is, de borst ros, de buik wit, de slagvederen violet, met een goud glans. *BUFF. Hist. Nat. Ois. 557. 1.*  
Woond in Madagafcar.

Kaffer 16 L Y S T E R, die zwartagtig is, wat  
(*Cafer.*) gekuifd, de stuit en buik wit. *BRISSON. Ornith. II. p. 257. tab. 20. f. 2.*  
Woond aan de Caap.

Kaapfche 17. L Y S T E R, die zwartagtig is, met  
(*Capensis.*) een geelagtige buik, en een geele stuit. *BRISS. Ornith. II.*

II. p. 259. tab. 27. f. 3.

Woond aan de Caap.

Zwartkop 18 Lyster, die zwartagtig is, met  
 (*Atricapilla*) een zwarte kop, buik en  
 stuit ros, een witte vlak op  
 de vleugels. BRISS. *Ornith.*  
*Append.* 47. tab. 3. fig. 2.  
 Woond aan de Kaap.

Palm Meerl 19 Lyster, die olyfgroen is, van on-  
 (*Palmarum.*) der afchgrauw, de kop  
 zwart, met drie witte vlak-  
 ken aan wederzyden. BRISS.  
*Ornith.* II. p. 301. tab. 29.  
 fig. 1. 2.  
 Woond in Cayenne.

van Carolina (F) Lyster, die castanie bruin is, de  
 hals van agter zwart, de  
 vleugels purperagtig zwart.  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 556.  
 2. *Merle.*  
 Woond in Corolina.

Oranje buik (G) Lyster, die bruin is, met een  
 oranje buik met witte maant-  
 jes, de keel wit met zwarte  
 vlak.

vlakken. BUFF. *ibid.* fig. 1.

*Grive.*

Woond in Canada.

Graauwe (H) LYSTER, die donker graauw is, van onder wit, de randen der vederen wit, der flagpennen bruin, de tippen zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 515. *Grive.*

Woond in Cayenne.

Chineefche 20 LYSTER, die rosagtig is, met een bruin gestreepte kop, witte wenkbraauwen, bruine stuurvederen met donkere streepen, geele pooten. BRISS. *Ornith.* II. p. 221. tab. 23. fig. 1.

Woond in China.

van St. Domingo 21 LYSTER, die bruinagtig is, van onder wit, de eerste flagpenden aan hun begin, en de drie zylyngsche stuurvederen wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 558. 1.

Woond

Woond in St. Domingo.

Maarl 22 LYSTER, die zwart is, met eene  
(*Merula.*) geele bek, en geele oogleden \*.  
Woond in Europa.

Gekraagde 23 LYSTER, die zwartachtig is, met  
(*Torquatus.*) eene witte halsband, en geel-  
agtige bek \*.  
Woond in Europa.

Blaauw 24 LYSTER, die de randen der vede-  
Maerl ren blaauwagtig afchgrauw  
(*Cyanus.*) heeft, de bek en wenkbraau-  
wen geel EDW. *Birds.* I. tab.  
18. (het Mannetje). BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 250. (het  
Wyfje).  
Woond in Italien.

Riet Maerl 25 LYSTER, die roeft bruinis, van on-  
der witagtig tegelrood, met  
banden, die aan de punt ros  
zyn. BRISS. *Ornith.* II. pag.  
219 tab. 22. fig. 1.  
Woond in Europa.

LYS.

Moor 26 L Y S T E R, die glanzig zwart is, de  
(*Morio.*) voorste slagpennen ros, met  
zwarte tippen. *BUFF. Hist.*  
*Nat. Ois.* 199.  
Woond aan de Kaap.

Surinaam- 27 L Y S T E R, die glanzig zwart is, de  
fche kruin, de stuit en de borst  
(*Surinamus.*) aan de zyden geel.  
Woond in Suriname.

Ceylonfche 28 L Y S T E R, die groen is, van onder  
(*Zeilanus.*) geel, de oogstreep na de  
borst loopende, die zwart  
is, [de stuurvederen zwart  
met geele tippen.] *EDW.*  
*Glean.* III. 321.  
Woond in Ceylon.

vanCayenne(I) L Y S T E R, die donker graauw is,  
de randen der vederen  
blauwagtig wit, van onder  
vuilwit, de stuit wit, de roei-  
pennen zwartagtig met bruin  
gerand. *BUFF. Hist. Nat. Ois.*  
515.  
Woond in Cayenne

Oranjekop (K) L Y S T E R, die groen is, van on-  
*Iste. Deels. IIde Stuk.* Aa der

der wit, met zwarte vlakken, de kruin en nek oranje. BUFF. *Ois.* 398. 2.

(b) *Lyster*, die groen is van onder wit met zwarte vlakken.

Woond in St. Domingo, (b) in Gujana.

Mauvis (L) *LYSTER*, die bruin is, van onder vuilwit, de borst zwart, en de buik en zyde oranje gevakt, de streep boven de oogen wit. BUFF. *Hist. Nat.* *Ois.* 51.

Woond in Europa.

Zwartbek (M) *LYSTER*, die bruin is, de toomstreep, bek, keel en borst zwart met een oranje band, de buik groengeel, met zwarte vlakken, de roeivederen donker bruin, de tweede en derde stuurvederen zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 559. *Merle.* Woond in St. Domingo.

Roffe (N) *LYSTER*, die ros is, de hals van  
VOO-



vooren en ter zyden, en de borst zwart met eene witte rand, de dekvederender vleu-  
zwart, met witte vlakken en twee geele banden. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 560. *Merle a Cravate.*

Woond in Cayenne.

Prachtige (O) LYSTER, die groen is, de keel schitterend zeegroen, de buik violet, de dekvederen der staart en de oogvlak glanzig blaauw. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 561. *Merle.*

Woond in Angola.

Geschulpte (P) LYSTER, die bruin is, de randen der vederen wit, de kop en kuif bruin rood, de stuit roze rood, de buik wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 563. 1.

Woond aan de Kaap.

Graauwe (Q) LYSTER, die bruingraauw is, met eene witte buik. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 563. 2. *Merle.*

Woond in Senegal.

- Ooftindi- (R) L Y S T E R , die groen is, van onder  
 iche bleeker. BUFFON. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 564. 1.  
 Woond in Ooftindien.
- Glanzige (S) L Y S T E R , die bruin is, met eene  
 groene weerschyn, de buik  
 roeftcoleurig met bruine  
 vlakken. BUFFON. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 564. 2. *Merle Solitaire.*  
 Woond in de Manillese.
- Violette (T) L Y S T E R , die purper violet is, de  
 rug en vleugels groen, de staart  
 blaauw. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*  
 540.  
 Woond in het Koningryk  
 Juda.
- Palmift (U) L Y S T E R , die geel bruin is, de kop  
 en nek zwart, het voorhoofd,  
 de hals, de borst en buik wit.  
 BUFFON. *Hift. Nat. Ois.*  
 539. 1.  
 Woond in Cayenne.
- Gerande (V) L Y S T E R , die donker bruin is, de  
 randen der vederen geel, de  
 keel

keel zwart. BUFF. *Hift. Nat.*

*Ois.* 539. 2.

Woond in Madagafcar.

Graauwe (W) LYSTER, die graauw is, met de dekvederen en flagpennen wit gerand. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 182.

Woond in Europa.

Vuilkleurige(X) LYSTER, die groen is, kop en hals zwart, de buik en ftuit rood, de fchouders en dekvederen der ftaart blaauw, de drie eerfte roeipennen geel, de ftaart zwart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 89.

Woond in de Philippynfche Eilanden.

Langftaart (Y) LYSTER, die donker blaauw is, met een gouden weerfchyn, de ftaart zeer lang. BUFFON *Hift. Nat. Oif.* 220.

Woond in Senegal.

Blaauwvlerk(Z) LYSTER, die groen is, met een bruin hoofd, caftanje bruine

A a 3

borft,

borst, blaauwe dekvederen,  
de drie eerste roeipennen  
wit, de stuurvederen zwart,  
de drie middelste blaauw ge-  
rand. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
257. *Merle.*

Woond in de Moluccos.

Gekroonde (Aa) LYSTER, die groen is, de buik  
oranjekleur, de kop en hals  
zwart, de kop met een  
oranje band, de dekvederen  
blaauw, de stuurvederen  
zwart, met groen gerand,  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 258.  
Woond in Bengale.

Geelkeel (Ba) LYSTER, die groen is, de keel  
en buik geel, de oog streep  
en borst zwart, de wenk-  
brauwen geel. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 272.  
Woond in Bengale.

Bonte (Ca) LYSTER, die van boven zwart  
en wit bont is, van onder wit,  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 273. I.  
Woond in St. Domingo.

LYST

Bruinbek (D) LYSTER, die groenis, van onder graauwagtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 273. 1.  
Woond in Oost-Indien.

Donkere (Ea) LYSTER, die bruin is, de kopen keel, zwart de stuit geel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 317.  
Woond in Senegal.

Groenkop (Fa) LYSTER, die bruinis, met een witte keel van onder bleekbruin, de kop groen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 339. *Merle. Solitaire.*  
Woond in de Philippynsche Eilanden.

Podobé (Ga) LYSTER, die zwart is, met roffe vleugels, de staart donker bruin, sommige stuurvederen ter helfte wit. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 354. *Merle.*  
Woond in Senegal.

Blaauwkop (Ha) LYSTER, die ligt bruin is, met eene donker blaauwe kop, staart en stuurvederen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 392.  
Woond aan de Kaap.

Blaauwborft (Ia) Lyster, die de rug ros bruin heeft, de kruin en nek zwart, een breede geele band over de oogen tot aan den hals, de band onder de oogen tot aan de vleugels zwart, de keel bleek geel, de borst en staart blaauw, de buik geel met zwart gestreept, de slagvederen zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 355.  
Woond in Gujana.

Rousferolle (Ka) Lyster, die geel bruin is, van onder bleeker. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 513.  
Woond . . . . .

CVIII. COTINGA. De *bek* regt, verheven rond,  
(AMPELIS) het *opperkaak* langer, wat krom, aan weerzyden uitrand.  
De *tong* gespleeten, spits en kraakbeenig.

Boheemer i COTINGA, met een gekuifd agterhoofd, de tweede roeipennen

nen met een rood gecoleurd  
vliesje aan de punten\*. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 261.

Woond in Europa en America.

NB. Deze word by ons in de Provin-  
cie Groningen, dog zeldzaam, ge-  
vonden.

Purpervogel<sup>2</sup> COTINGA, die purper rood is, de  
(*Pompadora.*) dekvederen der vleugelen  
die naaft aan de flagpennen  
zyn zwaardsgewyze, lang,  
styf en gekield. EDW. *Glean.*  
III. tab. 341. BUFFON. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 279.

Woond in Suriname.

Bloedroode<sup>3</sup> COTINGA, die rood is, met een  
(*Carnifex.*) zwarte band boven de oo-  
gen, de stuurvederen, en  
flagpennen aan hunne tippen  
zwart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
378. EDW. *Birds.* I. 39.

Woond in Cayenne.

Zwartstaart<sup>4</sup> COTINGA, die zeer glanzig is van  
(*Cotinga.*) onder purper violet, de slag  
en stuurpennen zwart. BUFF.

Aa 5 *Hist.*

*Hist. Nat. Ois.* 186. EDW.  
*Glean.* 241.

Woond in Brasfil.

Gevlakte (A) COTINGA, die blaauw is, van onder  
purper, met vyf oranje vlak-  
ken, en een blaauwe borst-  
band, de buik blaauw, de  
staart en roeipennen zwart\*.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 188.  
EDW. *Glean.* III. 341.  
Woond in Brasfil.

Violetkeel 5 COTINGA, die glanzig blaauw is,  
(*Maynana.*) met een purpere keel. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 229.  
Woond in Mayana.

Quereiva 6 COTINGA, die glanzig blaauw is, de  
(*Cayana*) keel violet, [de hals met  
zwarte streepjes, het lig-  
chaam hier en daar zwartag-  
tig \*.] VOSM. *Beschr.* tab.  
V. *der Vogelen.*  
Woond in Cayenne.

Fraaye 7 COTINGA, die glanzig blaauw is, met  
(*Terfa.*) eene zwarte rug, de buik  
witagtig geel.  
Woond . . . . .

KERN-



**CIX. KERNBYTER.** De *bek* een bultige [verkorte] kegel, aan de kop rond, het *onderkaakbeen* zylingfch ingeboogen. De *neusgaaten* aan het begin van den *bek*. De *tong* geheel.

**Kruisvink** 1 **KERNBYTER**, met eene fchaarsgewyze *bek* \*. EDW. *Glean.* III. 303. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 218. Woond in Europa.

(*Curvirostra.*)

**Dikbek** 2 **KERNBYTER**, met een witte ftreep over de vleugels, de middelste roeivederen aan de punt ruitagtig, de ftuurvederen aan het begin zwart \*. EDW. *Birds.* III. 188. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 99. 100. *Grosbec.* Woond in Duitfchland.

(*Coccothraustes.*)

**Schillebyter** 3. **KERNBYTER**, met een dubbele witte ftreep over de vleugels, de ftuurvederen geheel zwart. EDW. *Birds.* III. 123. Woond in het Noorden.

(*Enucleator.*)

KERN-

- Goudvink 4 KERNBYTER, met zwarte leden, de  
(*Pyrrhula.*) dekvederen der staart en  
roeipennen wit, de borst  
van het mannetje rood, de  
kruin en keel zwart\*. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 145.  
Woond in Europa.
- Kardinaal 5 KERNBYTER, die rood is, met een  
(*Cardinalis.*) kuif, een zwarte halster, bek  
en pooten bloedrood\*. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 37.  
Woond in Virginien.
- uit Madaga- 6 KERNBYTER, die rood is, met een  
fcar zwarte band boven de oo-  
(*Madagascarenfis.*) gen, de rug zwart gevlaakt.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 134.  
2. *Moineau.*  
Woond in Madagascar.
- Mexicaan- 7 KERNBYTER, die rood is, met zwarte  
fche vleugels en staart. BUFF.  
(*Mexicanus.*) *Hist. Nat. Ois.* 135. 1.  
Woond in Mexico, [Cana-  
da.]
- van St. Do- 8 KERNBYTER, die zwart is, met een  
mingo scharlaken kop en keel, de  
borst

(*Dominica.*) borst en buik, en de randen der roeipennen wit. EDW. *Birds.* III. 127.  
Woond in Brasil.

Gekuifde (A) KERNBYTER, die zwart is, met eene vuurroode opstaande kuif, de kop, keelenborst van onder wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 103.  
Woond in Louifanien.

Cacatoevink<sup>9</sup> KERNBYTER, die witagtig is, het voorhoofd gekuifd, de stuit en pooten rood, de middelste stuurvederen zeer lang. J. BURMANNUS, *Afbeeld. van Kaapsche Dier.*  
Woond in Æthiopien.

Roodkop 10 KERNBYTER, die aschgrauw is, met een purper agterhoofd, de borst wit gevlaakt. EDW. *Birds.* III. 180. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 309.  
Woond in Brasil.

Witkop 11 KERNBYTER, die bruin is, met een witte kop. EDW. *Glean.* II. tab.

tab. 306. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 119. 1.

Woond in Oost-Indien.

Coliou <sup>12</sup> KERNBYTER, met een zeer lange wigsgewyze staart, de buitenste stuurvederen van buiten wit, het ligchaam aschgrauw, van onder wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 282. 1.  
Woond in Senegal.

Kuif Coliou (B) KERNBYTER, die blaauwagtig is, met een blaauwe kuif, en bruine dekvederen, de staart driemaal zoo lang als het ligchaam. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 282. 2.  
Woond aan de Kaap.

NB. De kromme punt van den bek, en dat het kaakbeen van onder niet bultig is, brengen deze en de voorgaande tot een byzonder geslagt, gelyk de Heeren BRISS. *Ornith.* III. pag. 304. en BRUNETHE. *Zool. fundam.* pag. 90. te recht gedaan hebben.

KERN-

Geelagtige 10 KERNBYTER, die geel is, met een  
(*Flavicans.*) groenagtige rug en een oran-  
je geele kop. BUFFON. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 201. 1.

Woond in Cayenne.

Ryftvogeltje 14 KERNBYTER, die graauw is, met  
(*Oryzivora.*) witte slaapen, en een roode  
bek \*. EDW. *Birds.* I. 41.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 152. 1.  
Woond in Asia, en Ethio-  
pien.

Tarwvogel 15 KERNBYTER, die zwart is, met  
(*Panicivora.*) witte vleugeldekken en een  
roode bek. EDWARDS. *Birds.*  
I. 42.

Woond in Asia en Ethiopien.

NB. Deze is het Wyfje van de voo-  
rige. EDW.

Blaauwbek 16 KERNBYTER, die roestcoleurig is,  
(*Malacca.*) met een zwart hoofd en buik,  
de bek blaauw. EDW. *Glean.*  
III. 355.

Woond in China, Java,  
Malacca.

BERN-

Gestippelde 17 KERNBYTER, die roestcoleurig is,  
(*Punctulata.*) de buik wit en zwart ge-  
vlakt. EDW. *Birds.* I. 40.  
Woond in Java.

Gegolfde 18 KERNBYTER, die bruinagtig is, de  
(*Molucca.*) kop de keel en staart zwart,  
de buik wit en zwart ge-  
golfd. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
139. *Domino.*  
Woond in Java, in de Mo-  
luccos.

Havervink 19 KERNBYTER, die geelros is, met  
(*Hordeacea.*) witte slaapen, borst en staart  
zwart.  
Woond in Indien.

Bloedbek 20 KERNBYTER, die grysis, van on-  
(*Sanguiniro-*  
*stris.*) der wit, de bek en pooten  
rood. EDW. *Glean.* II. 271.  
fig. 2.  
Woond in Afien.

Astrild 21 KERNBYTER, die grysis, met bruin  
(*Astrild*) gegolfd, de bek, borst en  
oogkringen rood \*. EDW.  
*Birds.* IV. 179. *Glean.* III. 354.  
Woond

Woond in Ooft en West-Indien.

Blaauwe 22 KERNBYTER, die blaauw is, met  
(*Cyanea.*) zwarte roei en ftuurvederen.  
Edw. *Birds.* III. 125.  
Woond in Angola.

Groene 23 KERNBYTER, die groen is, met  
(*Virens.*) blaauwe fchouders.  
Woond in Suriname.

Angoofsche 24 KERNBYTER, die blaauwagtig zwart  
(*Angolenfis.*) is, met een roeftcoleurige  
buik, en een witte vlak op  
de vleugels. Edw. *Glean.*  
35<sup>e</sup>. 2.  
Woond in Angola.

Streepkruijn 25 KERNBYTER, die zwart is, met  
(*Lineola.*) een witte ftreep op het voor-  
hoofd, en witte flaapen.  
Woond in Afien.

Mexicaan- 26 KERNBYTER, die grys is, de keel,  
fche ftuit, wenkbraauwen, en  
(*Mexicana.*) voorhoofd geel. Edw. *Birds.*  
I. 44.  
Woond in Mexico.

- Groenling 27 KERNBYTER, die geelagtig is, de  
(*Chloris.*) eerste roeipennen van voo-  
ren geel, de vier zylyngsche  
ftuurpennen aan hun begin  
geel; [de dekvederen, de  
roeipennen aan hun einde,  
en de ftuurvederen geheel  
zwart.] BUFFON. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 267. 2. *Verdier.*  
Woond in Europa.
- Botervink 27 KERNBYTER, die groenagtig is,  
(*Butyracea.*) het voorhoofd, de wenk-  
braauwen, borst en buik  
geel, de ftart aan de punt  
wit. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*  
114. 2. *Tangara.*  
Woond in Brafil.
- NB. Deze is een *Tangara.*
- van Canada 29 KERNBYTER, die olyf groen is,  
(*Canadensis.*) van onder geelagtig olyf-  
groen met een zwarte halfter.  
BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 152. 2.  
Woond in Canada.

Zwavelgeele 30 KERNBYTER, die bruin olyfgroen  
(*Sulphurata.*) is, met een geele keel en  
en



en wenkbraauwen. BRISS.  
*Ornith.* III. p. 225. tab. 11.  
 fig. 1.

Woond aan de Kaap.

Gekraagde 31 KERNBYTER, die bleek geel is, de  
 (Collaria.) borst en halsband geel, de  
 slaapen zwart.

Woond in Indien.

Bengaalsche 32 KERNBYTER, die gryns is, met een  
 (Benghalen- geele kruin, witagtige slaa-  
 sis.) pen, de buik witagtig met  
 bruin gevlacht. EDW. *Birds.*  
 IV. 189.

Woond in Bengale.

Malabaar- 33 KERNBYTER, die afchgrauw is,  
 sche met een zwarte staart en  
 (Malabari- vleugels, en witte keel, en  
 ca.) dekvederen der staart.

Woond in Indien.

Zwartkop 34. KERNBYTER, die geel is, met een  
 (Melanoce- zwarte kop.

phala.) Woond in Guinea.

Gryze 35 KERNBYTER, die gryns is, met zwart-  
 (Cana.) te roei ftuurpennen, de poe-

Bb 2 ten

ten rood. EDW. *Birds.* IV.  
179. 1. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
393. 1.

Woond in Asia, [en Virgi-  
nien.]

Philippyn- 36 KERNBYTER, die bruin is, van on-  
fche  
(*Philippina.*)

der geelagtig wit, de kruin  
en borst geel, de keel bruin.  
BRISS. *Ornith.* III. p. 232.  
tab. 12. f. 1.

Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Gestreepte 37 KERNBYTER, die bruin is, met  
(*Striata.*)

roestcoleurige streepen van  
onder wit, de keel zwart.  
BRISS. *Ornith.* III. pag. 243.  
tab. 13. fig. 4.

Woond in 't Eiland Bourbon.

van St. Louis 38 KERNBYTER, die zwart is, de borst,  
(*Ludoviciana.*)

buik en band der roeiveders  
wit. BRISS. *Ornith.* III. pag.  
247. tab. 12. fig. 2.

Woon in 't Eiland St. Louis.

Kaapsche 39 KERNBYTER, die zwart is, met een  
(*Capensis.*)

geele stuit en dekvederen.

BRISS.

BRISS. *Ornith.* III. p. 171.  
tab. 16. fig. 1.

Woond aan de Kaap.

Zwarte 40 KERNBYTER, die zwart is, met een  
(*Nigra.*) witte vlak aan de schouder  
en het begin der twee bui-  
tenste roeipennen. CATESB.  
*Carol.* I. p. 39. tab. 39.  
Woond in America..

Van Carolina 41 KERNBYTER, die blaauw is met  
(*Coerulea.*) bruine vleugelen en een pur-  
pere band. CAT. *Carol.* I.  
tab. 39.  
Woond in America.

Witbuik 42 KERNBYTER, die blaauw is, van on-  
(*Madagascari-  
na.*) der wit met een zwarte hal-  
fter. BRISS. *Ornith.* II. pag.  
197. tab. 16. f. 3.  
Woond in Madagascar.

Violette 43 KERNBYTER, die violet is met roo-  
(*Violacea.*) de wenkbraauwen, keel en  
stuit. CATESB. *Carol.* I. 40.  
Woond in America.

Dikke 44 KERNBYTER, die blaauwagtig grys  
Bb 3 is,

(Grosfa.)

is, met een zwarte keel, en  
 stuurvederen, de bek rood,  
 de kin van onder wit. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 154.

Kleine  
 (Minima.)

45 KERNBYTER, die bruin is, van on-  
 der bleek rood, de eerste  
 stuurvederen aan hun begin  
 en de andere van agter wit.  
 Woond in Suriname.

Bruine  
 (Fusca.)

46 KERNBYTER, die bruin is, van on-  
 der witagtig, de stuurvede-  
 ren, van de derde tot de ne-  
 gende, aan hun begin wit.  
 BRISS. *Ornith.* III. pag. 319.  
 tab. 17. f. 1.  
 Woond in Africa, Bengale.

Gryze  
 (Minuta.)

47 KERNBYTER, die grys is, de stuit  
 en buik roestcoleurig, de  
 vierde, vyfde, en zesde stuur-  
 vederen aan weerzyden wit,  
 de staart geheel.  
 Woond in Suriname.

Tweecoleu. 48 KERNBYTER, die bruin is, van on-  
 der

- rige  
 (*Bicolor.*) der rood. EDW. *Birds.* II.  
 88. f. 1.  
 Woond in Indien.
- Zwartbuik (C) KERNBYTER, die rood is, met een  
 zwarte buik, hoofd en bek,  
 de roei en stuurvederen  
 bruin. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
 309.  
 Woond in Cayenne.
- Bleekbek (D) KERNBYTER, die bruin is, de bek  
 bleekrood, de buik wit.  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 109.  
*Maia.*  
 Woond in Cuba.
- Witstuit (E) KERNBYTER, die rood is, de vleu-  
 gels en staart zwart, de stuit  
 wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
 135. 1.  
 Woond in Canada.
- Gevlakte (F) KERNBYTER, die geelis, met een  
 zwarte keel en vlakken, de  
 vleugels bruin met wit ge-  
 randt, de staart bruin met  
 geel gerand. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 135. 2.  
 Bb 4 Woond

Woond in de Philippynsche  
Eilanden.

Zwartkruin (G) KERNBYTER, die rood is, de kruin,  
koonen en vleugels zwart,  
de roeipennen met roode  
randen. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 134. 1 *Moineau.*

Woond aan de Kaap.

Van Coro- (H) KERNBYTER, die zwart is, met een  
mandel geele rug en schouders. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 101. 1.

Woond in Coromandel.

Jacobin (I) KERNBYTER, die bruin is, de hals  
en buik zwart, de borst wit.  
BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 139.  
2 *Jacobin.*

Woond in Java.

Gewolkte (K) KERNBYTER, die bruin is, de buik  
wit, met zwart gewolkt.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 139. 1.

Woond in Moluccos.

Breedstaart (L) KERNBYTER, die bruin rosis, met  
een witte buik, de staart  
waye.

wayeragtig. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 330.  
 Woond in Virginien.

Roodhals (M) KERNBYTER, die zwart is, de  
 streep der dekwederen wit,  
 de stuurpennen van onder ter  
 helft wit, als ook de buik, de  
 hals van vooren rood. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 153. 2.  
 Woond in Louifanien.

Nonnetje (N) KERNBYTER, die van boven  
 blaauwagtig is, de hals, koo-  
 nen, buik en borst wit, met  
 een dubbele zwarte band om  
 de borst, de vleugels wit,  
 zwart en bleek bruin. BUFF.  
 393. 3 *Nonette.*  
 Woond . . . . .

Goudkop (O) KERNBYTER, die bruin is, de kruin  
 goudgeel, de koonen wit, de  
 buik wit, met bleeke vlak-  
 ken. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*  
 393. 2.  
 Woond in Indien.

- Paus (P) KERNBYTER, die groen is, de kop en de hals van agter blaauw, van onder rood, de rug en staart bruin. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 159.  
Woond in Louifanien.
- Gekapte (Q) KERNBYTER, die bruin is, het voorhoofd, koonen en keel zwart, de kop borst en buik oranje. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 223. 1.  
Woond in Senegal.
- Rouwdrager (R) KERNBYTER, die geheel zwart is. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 224. 3.  
Woond in Cayenne.
- Witband (S) KERNBYTER, die zwart is, met een band om de borst. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 224. 2.  
Woond in Java.
- Geelrand (T) KERNBYTER, die zwart is, de roeien stuurvederen met geele randen. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 224. 1.
- Zwartstaart (V) KERNBYTER, die rood is, de kop zwart,



zwart, met een kromme band,  
om de oogen, zyde en keel  
loopende, van onder wit, de  
staart zwart. *BUFF. Hist. Nat.*  
*Ois. 230. 1.*  
Woond aan de kaap.

Roodoog (W) KERNBYTER, die de kop van ag-  
ter blaauw, de rug en vleu-  
gels bruin heeft, van onder  
blaauw en roodagtig wit, de  
vlak aan de oogen bloedrood.  
*BUFF. Hist. Nat. Ois. 230. 2.*

Roodveer (X) KERNBYTER, die bruin is, van on-  
der bleeker, de dekvederen  
der staart rood. *BUFF. Hist.*  
*Nat. Ois. 230. 3.*

Rouwdrager (Y) KERNBYTER, die zwart is, van on-  
der en aan de oogen geel.  
*BUFFON. Hist. Nat. Ois. 341. 1.*  
*Verdier.*  
Woond aan de Kaap.

Streepborst (Z) KERNBYTER, die groen is, met  
wenkbraauwen, de borst  
roestcoleurig, met zwarte  
streepjes, de buik en stuit  
wit.

wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
341. 2.

Woond in St. Domingo.

Bourbon- (Aa) KERNBYTER, die ros is, met een  
fche zwarte kop en vleugels, de  
buik wit.

(b) Geheel roffe, met een  
zwarte kruin, vleugels en  
staart. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 1, 2. *Bouvreuil.*

Woond in Bourbon. (b) aan  
de Kaap.

Schulpvlek (Ba) KERNBYTER, die ros is, de rug,  
kop en vleugels zwartag-  
tig, de schulpen der vederen  
met wit gerand. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 319. 2. *Bouvreuil.*  
Woond in Cayenne.

Gekrulde (Ca) KERNBYTER, die zwart is, van  
onder en ter zyde de keel  
wit, de vederen der buik  
lang en gekruldt. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 319. 1.  
Woond in Brasfil.

GEEL-

EX. (GEELGORS.) De *bek* kegelagtig [verlengd.]

(EMBERIZA.) De *Kaakbeenderen* van agter van elkander wykende; en de randen naar binnen ingedrukt.

Sneeuwvo. 1 GEELGORS, met witte roeipennen, gel de eerste van buiten zwart, (Nivalis.) de stuurvederen zwart, de drie zylingfche wit. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 497. EDW. *Birds.* III. 126. Woond in Lapland en Spitsbergen.

Wintervo- 2. GEELGORS, die zwart is, met een gel. witte buik. CAT. *Carol.* I. *Hyemalis.* tab. 36. Woond in Noord America.

Gevlakte 3. GEELGORS, die grys is, van onder (Miliaria.) met zwart gevlakt, en roffe oogkringen. ALBIN. *Ois.* II. p. 46. tab. 50. Woond in Europa.

Ortolan 4 GEELGORS, met zwarte roeipennen; (Hortulana.) de drie eerste aan den rand wit.

witagtig, de stuurvederen  
zwart, twee zylingfche van  
buiten zwart, [het ligchaam  
ros met zwarte vlakken, de  
keel graauwagtig, de wenk-  
brâauwen wit.] *Buff. Hist.*  
*Nat. Ois.* 511. 1.

Woond in Europa.

Witbuik (A) GEELGORS, die bruin is, met zwart  
gevlakt, van onder wit, de  
drie eerste roeipennen zwart  
met een witte rand, de vier  
volgende wit. *Buff. Hist.*  
*Nat. Ois.* 511. 2.

Woond . . . . .

(b) De rug ros met zwart ge-  
stipt, van onder wit met  
rosse stippen. *Buff. Hist.*  
*Nat. Ois.* 497. 2.

Woond . . . . .

Groeninger 5. GEELGORS, met zwartagtige stuur-  
(*Citrinella.*) vederen, de twee buitenste  
aan de binnen zyde met een  
puntige vlak \*.

Woond in Europa.

GEEL-

Olyfcoleu- 6 GEELGORS, die olyfcoleurig is, van  
 rige onder bleeker, de keel o-  
 (*Olivacea.*) ranje, een zwartagtige band  
 om de borst. BRISS. *Ornith.*  
 III. p. 30. tab. 13. fig. 5.  
 Woond in St. Domingo.

Gryze 7 GEELGORS, die grys, met een zwart  
 (*Orix.*) voorhoofd en buik, de hals  
 en ftuit ros, de bek zwart.  
 EDW. *Birds.* IV. 178.  
 Woond in Africa.

Roodbek 8 GEELGORS, die grys is, met een  
 (*Quelea.*) zwart voorhoofd, en roode  
 bek. BUFF. *Hift. Nat. Ois.*  
 183. 2. *Moineau.*  
 Woond in Senegal.

Kaapfche 9 GEELGORS, die grys is, met eene  
 (*Capensis.*) witagtige keel, eene zwart-  
 agtige band aan de oogen en  
 kaakbeenderen. BUFF. *Hift.*  
*Nat. Ois.* 158. 2. *Ortolan.*

uitLouifiane 10 GEELGORS, die grys is, van onder  
 (*Ludoviciana.*) bleek, de borst ros, de kop  
 van boven met eene zwarte  
 boog.

boog. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
158. 1. *Ortolan.*  
Woond in Louifiane.

- Veldgors. 11 GEELGORS, die rosagtig is, de kop  
(*Cia.*) met zwartagtige ftreepjes,  
en witte wenkbraauwen.  
Woond in Zuid Europa.
- Heggevlie- 12 GEELGORS, die gryis is, met eene  
ger gevlake borst, geele wenk-  
(*Cirlus.*) braauwen en de twee buiten-  
ste ftuurvederen, met een  
wigswyze witte vlak.  
Woond in Zuid Europa.
- Gemeen- 13 GEELGORS, die gryis gevlaakt is, de  
zaame de punten der ftuurvederen  
(*Familiaris*). wit, de rug van agter geel.  
Woond in Afien.
- Geele 14 GEELGORS, die gryis is, de kop van  
(*Flaveola*) vooren geel.  
Woond in de warme Ge-  
westen.
- Surinaam- 15 GEELGORS, die bruin is, met ee-  
fche ne goudgeele kruin, en wit-  
te

(*Amazona.*) te dekvederen der staart\*.  
Woond in Suriname.

Ryftediefje 16 GEELGORS, die bruin is, met eenen  
(*Oryzivora.*) roffen hals een zwarte buik,  
puntige ftuurvederen. EDW.  
*Birds.* III. 291. BUFF. *Hift.*  
*Nat. Ois.* 388.  
Woond in Cuba, Carolina,  
Louifiana.

Rietortolan 17 GEELGORS, die een zwarte kop  
(*Schoeniclus.*) heeft, een grys en zwart lig-  
chaam, de buitenfte ftuur-  
vederen, met een witte wig-  
vormige vlak. BUFF. *Hift.*  
*Nat. Ois.* t. 497. 2.  
Woond in Europa.

Goudvleu- 18 GEELGORS, die afchgrauw bruin  
gel is, met geel roffe vleugels,  
(*Psittacea.*) en twee zeer lange ftuurve-  
deren. SEB. *Schatk.* I. tab.  
66. f. 5.  
Woond in Brafil.

Weeuwttje 19 GEELGORS, die bruin is, met een  
(*Parauifea.*) roode borft [en hals] de vier  
middelste ftuurvederen zeer  
*Iste. Deels. IIde Stuk.* C c lang

lang en puntig uitlopende,  
de bek zwart. BUFFON. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 194. [*Veuve.*]  
Woond in Angola.

Rouwdrager<sup>20</sup> GEELGORS, met een roode kruin  
(*Serena.*) en een zwarte band om de zel-  
ve, eene wigvormige staart;  
de twee middelste stuurvede-  
ren zeer lang, [de dekvede-  
ren der vleugelen wit, de  
bek rood.] BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 82. *Petite Veuve.*  
Woond . . . . .

Langstaart <sup>21</sup> GEELGORS, die zwartagtig is, van  
onder witagtig, de vier  
middelste stuurvederen lang  
en puntig uitloopende, twee  
zeer lang, de bek rood.  
BRISS. *Ornith.* III. p. 127.  
tab. 8. f. 2.  
Woond in Indien.

Schoone <sup>22</sup> GEELGORS, die gevlakt is, de borst  
(*Principalis.*) ros, de vier middelste stuur-  
vederen zeer lang; de beken  
pooten rood. EDW. *Glean.*  
II.



II. p. 126. tab. 270. *Long-tailed Sparrow.*

Woond in Angola.

Koning-lyke (Regia.) 23 GEELGORS, met de vier middelste stuurvederen zeer lang van dezelve grootte, en alleen aan den punt gevedert, de bek rood \*. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* tab. 8. fig. 1.

Chineefche (Ciris.) 24 GEELGORS, met een blaauw hoofd, een oranje buik, een groene rug, de slagpennen groen bruin. EDW. *Birds.* II. tab. 130.

Woond in Noord America.

Geelband (B) GEELGORS, die zwart is, met een geele band over de rug en vleugels. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 123. *Moineau.*

Woond in Juda.

CXI. TANGARA. (TANAGRA.) De Bek kegelagtig, puntig, uitgerand, aan het grondstuk wat driehoekig, de punt naar beneden hellende.

Jacapa            1 TANGARA, die zwart is, met de keel,  
(*Jacapa.*)                borst en voorhoofd lakrood.  
Edw. *Glean.* II. pag. 120.  
tab. 267.

Woond in Zuid America.

NB. Tot welk geslagt deze vogel behoore, is zeer twyffelagtig. Zy is by LINN. een *Tangara*, by BRISSON een vliegevangter, en by de Heer PALLAS een klaauwier.

Brafiliaan-        2 TANGARA, die lakrood is, met een  
sche                zwarte ftaart en vleugels.  
(*Brafilia.*)                BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 156. I.

Woond in Brafil, Canada,  
en in Ooft-Indien.

Roode            3 TANGARA, die rood is, met zwarte  
(*Rubra.*)                vleugelen en ftaart, de ftuur-  
vederen aan de punt wit.  
BRISS. *Ornith.* III. p. 48. tab.  
2. f. 5.

Woond in Canada.

Jacarina        4 TANGARA, die violet zwart is, de  
(*Jacarine.*)                de vleugels van onder witag-  
tig, de ftaart dubbel gewerkt.

Edw.

EDW. *Glean.* III. tab. 306. f. 2.  
Woond in Brasfil.

Teitei 5 TANGARA, die violet is, van onder  
(*Violacea.*) hoog geel. EDW. *Glean.* II.  
p. 112. 263. fig. 1. *the golden Titmouse.*  
Woond in Brasfil en Cayenne.

Blaauwe 6 TANGARA, die koornblauw is met  
(*Cyanea.*) bruine ftuurvederen \*. CAT.  
*Carol.* I. tab. 45.  
Woond in Carolina.

Gyrola. 7 TANGARA, die groen is, met een  
(*Gyrola.*) roode kop, een geele hals-  
band, en blaauwe borft.  
EDW. *Birds.* I. tab. 23. BUFF.  
*Hift. Nat. Ois.* 133. 2.  
Woond in Peru en Suriname.

van Cayenne 8. TANGARA, die geelros is, met een  
(*Cayana.*) groene rug, een roffe kruin,  
en zwarte koonen. BRISSON.  
*Ornith.* III. p. 21. tab. 4. f. 3.  
Woond in Cayenne.

Zwarte 9 TANGARA, die glimmend zwart is\*.  
(*Atrata.*) Woond in Ooft-Indien.

- van Mexico 10 TANGARA, die zwart is, van onder geelagtig, de borst en stuit blaauw. EDW. *Birds*. III. tab. 350.  
 (Mexicana.) Woond in Mexico, Cayenne.
- Paradys 11 TANGARA, die violet is, met een Mees zwarte rug, en geele stuit, (Tatao.) groene kop, violette borst en vleugels, [de buik zee-groen.] EDW. *Glean*. III. tab. 349. p. 289. BUFFON. *Hist. Nat. Ois*. 127. 2.  
 Woond in Brasil, Cayenne.
- Witbek 12 TANGARA, die zwart is, met een (Albirostris.) geele vlak op de vleugels en staart, de buik wit.  
 Woond in America.
- Bloedkeel 13 TANGARA, die zwartagtig, van is (Gularis.) onder wit, de kop zwart, de keel purper. BRISS. *Supl. Ornith*. p. 67. tab. 4. f. 4.  
 Woond in America.
- Geelborst 14 TANGARA, die blinkend zwart is, de

- (*Nigra.*) de borftaan wederzyden, en de vleugels van onder geel. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 114. 3. Woond in Cayenne, Mexico, Brafil.
- Zwartborft 15 TANGARA, die zwart is, van onder wit, de keel en ftuit blaauwagtig, de borft en kop van vooren zwart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 155. 1. Woond in Brafil in Cayenne.
- (*Brafilienfis.*)
- Gevlakte 16 TANGARA, die zwart gevlacht is, van boven bruin, van onder witagtig. BRISS. *Ornith.* III. p. 37. tab. 2. fig. 4. Woond in St. Domingo.
- (*Dominica.*)
- Bruine Car-17 TANGARA, die bruin is, met een dinaal roode borft, keel en fchou- ders. EDW. *Birds.* II. 82. Woond in America.
- (*Militaris.*)
- Witvlak 18 TANGARA, die zwart is, met een witte bek, en witte vlak op de vleugels en aan het begin van

van de staart. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 197. 2.  
Woond in America.

Biffchop 19 TANGARA, die afchgraauw is, met  
(*Episcopus.*) de staart en vleugels van buiten blaauw.  
Woond in Brasfil.

Sajacu 20 TANGARA, die grys is, met blaauw-  
(*Sayaca.*) agtige vleugels \*. EDW. *Glean.* III. tab. 350. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 178. 1. *Eveque.*  
Woond in Brasfil en Cayenne.

Gestipte 21 TANGARA, die groen is, met zwarte  
(*Punctata.*) stippen, van onder geelagtig wit. EDWARDS. *Glean.* II, 262. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 133. 1.  
Woond in Ooft Indien,

Groene 22 TANGARA, die groen is, van onder  
(*Virens.*) geelagtig, met eenzwarte toomstreek, keel en kooenen.  
Woond in Mexico, Peru  
Cayenne.

TAN-

Geel zwarte<sup>23</sup> TANGARA, die glanzig zwart is, met een geele borst, buik en voorhoofd, de buitenste stuurveer van binnen met eene zwarte vlak. BUFF. *Hist. Hist. Nat. Ois.* 114. 2. Woond in Cayenne.

Gekuisde <sup>24</sup> TANGARA, die zwart is, met een (Cristata.) oranje kuif, de keelen stuit ros, [de rand der vleugels wit.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 72. Woond in Cayenne.

Driecoleuri-(A) TANGARA, die groen is, de rug en vleugels, de roeien stuurvederen zwart, met blaauwe banden. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 301. 1. Woond in Cayenne.

Groenkop (B) TANGARA, die zwart is, de kop en schouders groen, de rug rood, de stuit geel, de stuurvederen groen, de vier buitenste rozenrood met blaauwe randen, de keel en vlak

Cc 5

der

der vleugelen blaauw, de borst en buik zeegroen. BUFF.

*Hist. Nat. Ois.* 7. 1.

Woond in . . . . .

Geelstuit (C) TANGARA, die groen is, de kop zeegroen, de rug, de keel, en de stuit geel, de vleugels blaauw, de stuur- en roeipennen groen, de buitenste roeipennen blaauw. BUFF.

*Hist. Nat.* 33. 1.

Woond in Cayenne.

Blaauwkop (D) TANGARA, die groen is, de kop blaauw, de keel en de hals van van agter rood, de rug zwart. BUFF.

*Hist. Nat. Ois.* 33. 2.

Woond in Cayenne.

Donkere (E) TANGARA, die zwart is, de kop, hals, en buik blaauw. BUFF.

*Hist. Nat. Ois.* 179. 1.

Woond in America.

Groote (F) TANGARA, die bruin is, van onder ros, de keel wit, van onder oranje, met eene zwarte streep ter zyden.

BUFF.



BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 205.  
Woond in Cayenne.

Gekroonde (G) TANGARA, die ligt groen is, de  
buik rosgeel, de kruin oran-  
je. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
290. 1.  
Woond in Cayenne.

Pompadour-(H) TANGARA, die donker purper is.\*  
Vogel BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 128. 1.  
Woond in Cayenne.

Bruine (I) TANGARA, die bruin is, van onder  
wit, de kop en keel rood.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 155. 2.  
Woond in America.

Fraye (K) TANGARA, die zwart is, de buik  
en kruin geel. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 114. 1.  
Woond in Cayenne.

Bruinrug (L) TANGARA, die vaalgroen is, de  
rug bruin, de vlak der vleu-  
gels zwavel colour, de roei  
en stuurpennen zwart.

NB. Deze

NB. Deze is, zegt BUFFON, het Wyfje van de Sajacu. p. 20.

Woond in Cayenne en Brasil.

CXII. VINK. De *bek* kegelachtig recht, en (FRINGILLA.) puntig.

Laplandsche 1 VINK, met eene zwarte kop, een (*Lapponica.*) grys en zwart gemengeld lichaam, witte wenkbrauwen, de buitenste stuurvederen met een witte driehoekige vlak.

Woond in Europa.

Surinaam- 2 VINK, die grys is, de roeivederen  
fche aan wederzyden wit, de zy-  
(*Surinama.*) lingsche stuurvederen van  
onder wit.

Woond in Suriname.

Vink 3 VINK, met zwarte leden, de roei-  
(*Coelebs.*) vederen wederzyds wit, de  
drie eerste ongevlakt, de  
twee stuurvederen schuin-  
sch wit. ALBIN. *Ois.* I. tab. 63.

Woond in Europa.

VINK,

Bergvink 4 VINK, met het grondstuk der vleugelen van onder zeer geel.  
 (*Montifringilla*.) Woond in de Boffchen.

Zweedfche 5 VINK, die bruin is, de borft en fchouders ros, de vleugelen zwart, met eene roffe vlak.  
 (*Fulenis*.) Woond in Zweeden.

van Carolina 6 VINK, die zwart is, met eenen rooden weerfchyn, de buik ros-agtig en eene witte vlak op de vleugelen. CATESB. *Carol.* I. p. 34. tab. 34.  
 Woond in America.

Distelvink 7 VINK, met de flagpennen aan de voorzyde geel, de buitenfte ongevlakt, de twee buitenfte ftuurvederen in het midden, en de andere aan de punt met eene witte vlak. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 54. I.  
 Woond in Europa.

Chineefche 8 VINK, die groen is, met eenen rooden kop en ftart, de buik wit en zwart gegolfd. EDW. *Birds*.

*Birds.* III. 128. *the green gold finch.*

Woond in China.

Caapfche 9 VINK, met een bruine kop en borft,  
Mufch een caftanje bruin ligchaam,  
(*Alario.*) dat van onder wit is, de vier  
zylingsche ftuurvederen met  
een zwart ftreepje. BRISS.  
*Ornith.* III. p. 106. tab. 5.  
fig. 2.  
Woond aan de Caap.

Geftippelde 10 VINK, die bruin is, en rosagtig,  
Bengali met wit geftipt\*. EDW.  
(*Amanda- Glean.* III. 355. 1. BUFF.  
va.) *Hift. Nat. Ois.* 115. 3.  
Woond in Ooft-Indien.

Granadier 11 VINK, met eene wigswyze ftart,  
(*Granatina.*) een rosagtig ligchaam, roo-  
de bek, de flaapen, ftuit en  
nek donkerblauw. EDW.  
*Birds.* IV. 191. BUFF. *Hift.*  
*Nat. Ois* 1093.  
Woond in Brazil.

Americaan- 14 VINK, die geel is, met een zwart  
fche voorhoofd, en bruine vleu-  
gelen.

- (*Tristis.*) gelen. CATESB. *Carol.* I. tab. 43. EDW. *Glean.* III. 274. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 202. 2. Woond in Noord America.
- van Bahama 13 VINK, die zwart is, van onder (Zena.) wit, eene witte streep onder en boven de oogen, een goud-geele borst. CAT. I. fig. 42. Woond in Noord America.
- Aartige 14 VINK, die bruinagtig groen is, (Lepida.) met een roffe keel, en streep onder en boven de oogen, zwarte borst. Woond in de Havana.
- Herfstvink 15 VINK, die groenagtig is, met ee- (Autumna- ne roffe kop, en bleek roode lis.) stuit. Woond in Suriname.
- Citroentje 16 VINK, die groenachtig is, de rug (Citrinella.) bruin gevlacht, de pooten vleesch couleur. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 321. 1. *Bruant de Bresil.* Woond in Zuid Europa [en America.]

VINK

- Serin 17 VINK, die na den groenen trekt, (Serinus.) het onderkaakbeen wit, de rug en zyden met bruin gevlokt, de vlak der vleugelen geel.  
Woond in Zuid Europa.
- Senegali 18 VINK, die roeft bruin is, met de (Senegala.) kruin en buik ros, de bek zwart en rood gestreept.  
BRISS. *Ornith.* III. p. 208. tab. 10. fig. 2.  
Woond in Senegal.
- Nachtvink 19 VINK, die zwart is, met eene ros- (Noctis.) se keel en toomstreep, en eene zwarte bek. BRISS. *Ornith.* III. p. 118. tab. 7. fig. 1.
- Chineefche 20 VINK, die olyfgroen is, van on- (Sinica.) der tegelrood, de ftuur- en roei-pennen zwart, aan hun begin geel. BRISS. *Ornith.* III. p. 175. tab. 7. fig. 2.  
Woond in China.
- Witbuik 21 VINK, die zwart is, van onder (Nivalis) sneeuw wit, de tweede rei flag-

stuurvederen, en de dekvederen wit. BRISS. *Ornith.* III. p. 162. tab. 15. f. 1.  
Woond in America.

Geele Vink 22 VINK, die groen is, met een geelle borst, buik en wenkbrauwen, de eerste slagpennen aan den buitenrand wit. EDW. *Birds.* II. 84.  
Woond in Madera.

Canaryvogel 23 VINK, met een wit geelagtig lichaam, en bek, de stuur- en roeipennen groenagtig, de bek witagtig \*. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 202. 1. *Serin.*  
Woond in de Canarische Eilanden.

Geeltje 24 VINK, die geel is, met een goudgeel voorhoofd, de vleugels en staart zwart, met geel gerand.  
Woond . . . . .

Sysje 25 VINK, die de slagpennen in het midden geel heeft, de vier eerste ongevlakt, de stuur-

Iste Deel IIde Stuk. D d vede-

vederen aan hun begin geel  
en aan de punt zwart\*.

Woond in Europa.

Kuifvink 26 VINK die bruin is, met een vuur-  
(*Flammea.*)                      colourige kuif.

Woond in Europa.

Geelbek 27 VINK, die bruin is, met een geel-  
(*Flaviro-*                      agtige bek.

*stris.*)

Woond in Europa.

Rietvink 28 VINK, die de voorste slagpennen  
(*Cannabina.*)                      en de stuurpennen zwart  
heeft, aan weerzyden wit  
gerandt. FRISCH *Av.* II. tab.  
9. fig. 1, 2.

Woond in Europa.

Vlasvink, 29 VINK, met bruine slag en stuurve-  
(*Linaria.*)                      deren, met bleeke randen,  
de vlak der vleugelen witag-  
tig, [het ligchaam ros.]

ALBIN. *Ois.* III. p. 70. tab. 75.

Woond in Europa.

Kraagmufsch 30 VINK, die graauw is, met witte  
(*Pitronia.*)                      wenkbraauwen, en een gee-  
le keel.

Woond in Europa.

VINK,



- Vink van Angola  
(*Angolensis.*) 31 VINK, met een bruine rug, de buik en staart blaauw. EDW. *Birds.* III. 131.  
Woond in Angola en Bengale.
- Bengali  
(*Bengalus.*) 32 VINK, die bleek blaauw is, met een graauwe kop en rug, de zyden van de kop purper.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 115. 1.  
Woond in Bengale.
- Van Jamaica  
(*Jamaica.*) 33 VINK, die grys is, met een blaauw groene borst, zwarte vleugels en staart.  
Woond in Jamaica.
- Driekleurige  
(*Tricolor.*) 34 VINK, die zwart is, de kop en stuit geel, de schouders groen, de buik geelagtig.  
Woond in Suriname.
- Maja  
(*Maja.*) 35 VINK, die purperagtig is, met een donkerer borstband. BRISS. *Ornith.* III. p. 214. tab. 7. fig. 4.  
Woond in Oost en West-Indien.
- Musch 36 VINK, met bruine roei- en stuur-  
Dd 2 pen-

(Domestica.)

pennen, een gryns en zwart  
ligchaam, een enkele witte  
vlak op de vleugels. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 6. 1. [het  
mannetje.] *Moineau franc.*  
Woond in Europa.

Bergmosch  
(Montana.)

37 VINK, met bruine roei- en stuur-  
pennen, een gryns en zwart  
ligchaam, met een dubbele  
witte vlak op de vleugels.  
EDW. *Glean.* II. 269.  
Woond in Europa.

Tweecoleu-  
rige  
(Bicolor.)

38 VINK, met een zwarte kop en  
borst, de rug, vleugels, en  
staart donker groen. CATESB.  
*Carol.* I. tab. 37.  
Woond in America.

Krul-Vink  
(Crispa.)

39 VINK, die olyfcoleurig is, van on-  
der geel, de kop zwart, de  
meeste vederen omgekruld.  
EDW. *Glean.* II. 271.  
Woond in Angola.

van Mozam-  
bique

(A) VINK, die groen is, van onder  
geel, de randen der roei- en  
stuur-

stuurpennen geel. BUFFON.  
*Hist. Nat. Ois.* 364.  
 Woond in Mofambique.

Donkere (B) VINK, die bruin is, met zwarte  
 stuurvederen, de twee bui-  
 tenste aan wederzyden wit,  
 de buik zwavel geel. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 151. 1.  
 Woond in Europa.

Wyngaard (C) VINK, die bruin is, met zwarte  
 Vink stuur en slagpennen, de borst  
 rood, de keel en buik geel.  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 151. 2.  
 Woond in Vrankryk.

Scharlaken (D) VINK, die scharlaken rood is, met  
 Musch een zwarte buik, borst, zy-  
 den en vleugels, de dekve-  
 deren bruin, en de slagpen-  
 nen wit gerand. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 16. 2. *Cardinal du*  
*Cap. de b. Esp.*  
 Woond aan de Kaap.

Nieuwjork- (E) VINK, die groen is, het voor-  
 sche hoofd en de kruin zwart, het  
 agterhoofd, de keel en hals  
 Dd 3 geel,

geel, de buik en stuit wit,  
de vleugels en staart zwart,  
met sneeuw witte randen.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 292.

*Tarin de la Nouv. York.*

Woond in Nieuw York.

**Gemengelde (F) VINK**, die bruin is, met zwarte  
vlakken, de randen der dek-  
vederen en roei en slagpen-  
pen wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
233. *Proyer.*

Woond in Europa.

**Bruinrug (G) VINK**, die lakrood is, de rug,  
staart en vleugels bruin, de  
bek wit. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 157. I. *Senegali.*

Woond in Senegal.

**BoschMusch (H) VINK**, die bruin is, van onder  
wit, de kop met één bleek  
roode en zwarte band boven  
de oogen. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 225.

Woond in Europa.

**Roodpoot (I) VINK**, die geel is, de rug, en  
vleugels groenagtig, met don-

donkere vlakken, de pooten rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 321. 1. *Bruant.*

Woond in Brasil.

Bourbon- (K) VINK, die rood is, de vleugels  
fche en staart bruin, met bleeke  
randen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
321. 2. *Bruant.*  
Woond op het eiland Bour-  
bon.

Kaapfche (L) VINK, die ros bruin is, met een  
Vink zwarte kop, een witte streep  
over de oogen, de buik wit,  
de ftuurvederen van onder  
blauw. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
386. 2. *Bruant.*  
Woond aan de Kaap.

Mexicaan- (M) VINK, die bruin is, de kop en  
fche keel geel, de buik bleek met  
bleeke zwarte vlakken. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 386. 1. *Bruant.*  
Woond in Mexico.

Roodborstje (N) VINK, die bruin is, de borst rood,  
de slag en ftuurpennen zwart.

*Hift. Nat. Ois.* 485. 1 *Linotte*.  
Woond in Europa.

Roodkopje (O) VINK, die bruin is, het voor-  
hoofd rood, de borst bleek  
rood, de buik wit. BUFFON.  
*Hift. Nat. Ois.* 485. 2. *Ca-  
baret*.  
Woond in Europa.

Geelborst (P) VINK, die groen is, met de hals  
van vooren, de keel en borst  
geel, een geelē band over de  
vleugelen; de buik wit. BUFF.  
*Hift. Nat. Ois.* 435. 3.  
Woond in Europa.

Staalkeurige(Q) VINK, die donker staalcoleurig  
blauw is, de bek en pooten  
bleekrood. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 291.  
Woond in Brasil.

Dominicaan (R) VINK, die zwart en wit bont is,  
met een scharlaaken roode  
kop en keel. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 55. 2. *Cardinal Domini-  
quain*.  
Woond in St. Domingo.  
VINK,

Gekapte (S) VINK, die van boven bruin, van onder fcharlaaken rood is, de ftuit, bek en leggende kuif carmyn rood, de twee buitenfte ftuurvederen zwart. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 181. 1. Woond in Cayenne.

Roodhals (T) VINK, die bruin is, met een zwarte kop en ftuurvederen, de hals en ftuit rood, de borft geel met eene zwarten band. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 182. 2. Woond in Carolina.

Gefchulpte (U) VINK, die groen is, de kop en hals van agter graauw, van vooren gloeyendrood, de borft met een geele band, de buik en zyden zwartagtig groen, met witte vlakken, de ftuurvederen rood. BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 203. 1. Woond aan de Kusten van Africa.

Blaauwe (V) VINK, die geheel fchoon hemelfch blaauw is, de roei en ftuur-  
D d 5 pen-

pennen donker, met ligter randen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 203. 2.

Woond in Cayenne.

CXIII. Vliegenvanger. De *bek* byna drie-

(MUSCICAPA.) hoekig, aan wederzyden uitge-  
randt, de punt krom, de *Knevel* *hairtjes* naar de keel gestrekt.

De *Neusgasten* [langwerpig] rondagtig.

Schoone 1 Vliegenvanger, met een zwarte  
(*Paradisi.*) blaauwe gekuifde kop, een wit ligchaam, de staart wigswyze, de twee middelste stuurvederen zeer lang. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 284. 2.

(a) Het ligchaam van boven rood. fig. 2.

Woond aan de Kaap, en op Ceylon.

Langstaart 2 Vliegenvanger, die gekuifd is,  
van



(*Mutata.*) van boven zwartagtig groen,  
 van onder wit, de twee mid-  
 delste ftuurvederen zeer lang,  
 wit, met een zwarte fchaft,  
 de zylingfche zwart. BUFF.  
*Hift. Nat. Ois.* 248. 2.  
 Woond in Madagafcar.

Vierkleurige(A) VLIEGENVANGER, met een don-  
 ker groene kuif, het ligchaam  
 rood, de drie eerfte flagpen-  
 nen zwart, de overige wit,  
 de middelste ftuurvederen  
 zeer lang. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 248. 1.  
 Woond in Madagafcar.

Van Marti- 3 VLIEGENVANGER, met eengekuifde  
 nique  
 (*Martinica.*) kop, van boven bruin, van  
 onder afchgrauw, de bui-  
 tenfte randen der flagpennen  
 witagtig. BUFF. *Hift. Nat.*  
*Ois.* 568. 1.  
 Woond in Martinique.

Tyran 4 VLIEGENVANGER, met een zeer lan-  
 ge [zwarte] gevorkte ftart,  
 (*Tyrannus.*) de buitenfte ftuurvederen  
 aan

aan de binnen zyde wit, het ligchaam zwart, van onder wit, [de vleugels bruin, de kruin groen.] *BUFF. Hist. Nat. Ois.* 571. 2.

Woond in Canada en Suriname.

Surinaam- 5 **VLIEGENVANGER**, met eenen geronden  
fche staart, die aan de punt  
(*Surinama.*) wit is, het ligchaam zwart,  
van onder wit.  
Woond in Suriname.

Gekroonde (B) **VLIEGENVANGER**, met een oranje  
roode kuif, die plat is en op-  
staat, de punt der vederen  
blauw, het ligchaam bruin  
groen, de vleugels bruin, de  
buik en stuit geel, de staart-  
vederen oranje coleurig.  
*BUFF. Hist. Nat. Ois.* 289.  
Woond in Cayenne.

Gehairde 6 **VLIEGENVANGER**, met een blauwag-  
(*Crinita.*) tige gekuifde kop, en hals,  
de buik geelagtig, de stuur-  
en

en slagpennen ros. CAT. *Carol.* I. p. 52.

Woond in Noord America.

Bengaalsche 7 VLIEGENVANGER, die een grys kuif-  
(*Emeria.*) je heeft, van onder wit is,

de slaapen en stuit rood. EDW. *Birds.* IV. 190.

Woond in Bengale.

Roode 8 VLIEGENVANGER, die rood is, de bek  
(*Rubra.*) geelagtig. EDW. *Glean.* I.

tah. 239. fig. 2.

Woond in Noord America.

(b) Van onder wit, de punten der slagpennen zwart.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 453. 1.

Woond in Noord America.

Groenrug (C) VLIEGENVANGER, die groenekuif,  
hals en rug heeft, de vleugels, en staart caneelcoleurig, de borst en keel graauw, de buik gloeiend geel. BUFF.

*Hist. Nat. Ois.* 569. 1.

Woond in Virginien.

Geelbuik (D) VLIEGENVANGER, die bruin is, de  
kruin

kruin zwart en geel gevlacht,  
 een witte kop, band en keel,  
 de borst en buik geel. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 569. 2.  
 Woond in Cayenne.

Zwartkop 9 VLIEGENVANGER, die zwart is, de  
 (*Atricapilla.*) vlak op het voorhoofd en de  
 vleugelen, de buik, borst en  
 zylingfche ftuurvederen van  
 buiten, wit. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 566. 3.  
 Woond in Europa.

Roodftaart 10 VLIEGENVANGER, die zwart is, de  
 (*Ruticilla.*) borst, vlak der vleugelen en  
 ftuurpennen roodagtig geel.  
 EDWARDS. *Birds.* II. 80. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 566. 1. 2.  
 Woond in America.

Groenagtige 11 VLIEGENVANGER, die bruinagtig  
 (*Virens.*) groen is, van onder geel,  
 de wenkbraauwen wit.  
 Woond in Carolina.

vanCayenne 12 VLIEGENVANGER, die bruin is, van  
 (*Cayanensis.*) onder geel, de wenkbraau-  
 wen

wen wit, de kruin oranje-  
 agtig. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
 212.

Woond in Cayenne en Bra-  
 zil.

Gevlakte (E) VLIEGENVANGER, die bruin is,  
 de staart gevlacht, de kruin  
 geel, het voorhoofd en de  
 keel wit, de buik en borst  
 geel met zwarte vlakken.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 453. 2.

Woond in Cayenne,

van Canada 13 VLIEGENVANGER, die afchgrauw  
 (*Canadensis.*) is, van onder geel, met gee-  
 le toomstreepen, de kruin  
 zwart gevlacht. BRISS. *Ornith.*  
 II. p. 406. tab. 39. fig. 4.

Olyfgroene 14 VLIEGENVANGER, die olyfcoleurig  
 (*Olivacea.*) is, van onder bleeker, de  
 wenkbrauwen wit, de oo-  
 gen rood. EDW. *Glean.* II.  
 252.

Woond in Jamaica.

van Senegal 15 VLIEGENVANGER, die bont is, met  
 witte

(*Senegallensis.*)

witte wenkbrauwen, de buitenste stuurvederen ter helfte wit, BRISS. *Ornith.* II. p. 374. tab. 37. 2.

(*b*) Dezelve met eene bruine borst. *idem ibid.* p. 376. tab. 37. 3.

Woond in Senegal.

Kaapfche  
(*Capensis.*)

16 VLIEGENVANGER, die bruin is, van onder wit, met een zwarte borst, de band op de vleugels ros, de stuurvederen aan de punt wit. BRISSON. *Ornith.* II. p. 372. tab. 36. 3. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 572 1. Woond aan de Caap.

Gekraagde  
(*Terquata.*)

17 VLIEGENVANGER, die zwart is, van onder wit, de borst ros, de binnenste stuurvederen aan de punt wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 572. 2.

Woond aan de Caap.

Zwarte

(*F*) VLIEGENVANGER, die geheel zwart is, de stuit geel. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 572. 3.

Woond

Woond op het Eiland Bourbon.

van Carolina 18. VLIEGENVANGER, die bruin is, van  
 (Carolinensis.) onder afchgrauw, de kop  
 zwart, de stuit van boven  
 rood. CAT. Carol. I. tab. 66.  
 Woond in Carolina.

Gevlakte 19 VLIEGENVANGER, die bruin is, van  
 (Petechia.) onder afchgrauw met roos  
 gevakt, de keel en stuit van  
 boven ros. BRISS. Ornith.  
 II. p. 364.  
 Woond in Martinique.

Grifola 20 VLIEGENVANGER, die bruinagtig is,  
 (Grifola.) van onder witagtig, de hals  
 in de lengte gevakt, de bo-  
 ven stuit rosagtig. BRISS.  
 Ornith. II. p. 357. tab. 35. f. 3.  
 Woond in Europa.

Bonte 21 VLIEGENVANGER, die bruin is, het  
 (Variegata.) voorhoofd en ligchaam van  
 onder, en de stuit, wit.  
 Woond in Indien.

Gerande (G) VLIEGENVANGER, die bruin is,  
 Iste. Deels IIde Stuk. Ee de

de randen der dekvederen wit, de keel en hals graauw, de buik geel, de drie middelste slagpennen, en de middelste stuurveêr rood. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 571. 1. *Petit Tyran.*

Woond in Cayenne.

Purperkeel (H) VLIEGENVANGER, die zwart is, met een purpere keel, BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 381.

Woond in Cayenne.

Bruine (I) VLIEGENVANGER, die bruin is, van onder bleeker. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 568. 2.

Woond in Martinique.

Zwartkaak (K) VLIEGENVANGER, die de rug bleek zwart heeft, de stuurvederen zwart, als ook de vleugels, doch met een witte band, de kruin caneel coleurig, met een witte rand, de borst bruin, de keel en buik wit. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 567. 1.

Woond in Senegal.

VLIÉ-



Fraaye (L) VLIEGENVANGER, die zwart is, met een witte band om de kop, en op de vleugelen, de borst en buik wit. *BUFF. Hist. Nat. Ois. 567. 2.*  
Woond in Senegal.

Blaauwruig (M) VLIEGENVANGER, die van boven blaauw is, de keel bruin met een zwarte rand, de vleugels zwart, met een witte band, de stuurvederen zwart; doch de twee buitenste wit, de buik wit. *BUFF. Hist. Nat. Ois. 567. 3.*  
Woond in Senegal.

Bruine (N) VLIEGENVANGER, die bruin is, van onder wit, met een witte vlak op de vleugels. *BUFF. Hist. Nat. Ois. 565. 2. 3.*  
Woond in Europa.

Blaauwbuiik (O) VLIEGENVANGER, die aschgrauw is, de kop zwart, de buik blaauw.  
Woond in Madagafcar.

Groenkeel (P) VLIEGENVANGER, die ros bruin is,  
E e 2 met

met eenen zeer langen staart,  
de kuif, keel, krop en borst  
groen; de buik afchgrauw.

BUFF. *Hist. Nat.* 573. 2.

Woond in Senegal.

Groenkuif (Q) VLIEGENVANGER, die ros bruin is,  
met een groene kuif en keel,  
de borst afchgrauw.

BUFF. *Hist. Nat.* 573. 2.

Woond op 't Eiland Bourbon.

Oranjeborst (R) VLIEGENVANGER, die donker  
bruin is, de borst oranje  
bruin, de buik afchgrauw.

BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 574. 1.

Woond in Cayenne.

Oranjekuif (S) VLIEGENVANGER, die bruin is, met  
een oranje kuif, en twee oker-  
geele banden op de vleugelen.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 574. 3.

Woond in Cayenne.

Groene (T) VLIEGENVANGER, die groen is, met  
Zwartkruin een zwarte kruin, bruine  
borst en geele buik.

BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 574. 2.

Woond in Cayenne.

KWIK.

CXIV. KWIKSTAERT. De *bek* elsgewyze recht,  
(MOTACILLA.) met even groote *kaak-*  
*beenderen.*

De *Neusgaaten* eirond.

De *tong* gescheurd en  
uitgerand.

Nagtegaal 1 KWIKSTAERT, die rosagtig afch-  
(*Luscinia.*) graauw is, met afchgrauwe  
kniebanden \*.  
Woond in Europa.

Hangneft 2 KWIKSTAERT, van boven groenag-  
(*Caledris.*) tig bruin van onder rosgeel,  
met een zwarte ftreep onder  
en boven de oogen. EDW.  
*Birds.* III. 121. fig. 2.  
Woond in Jamaica.

Zanger 3 KWIKSTAERT, die van boven grys  
(*Modularis.*) bruin is, de dekvederen der  
vleugelen aan de punten wit,  
de borst blaauwagtig afch-  
grauw.  
Woond in Europa.

Bies Nagte- 4 KWIKSTAERT, die roodagtig bruin  
Ee 3 is,

- gaal is, van onder bleekrood, de  
 (Schoenoba- kop gevlaakt.  
 nus. Woond in Europa.
- Veld Nagte-5 KWIKSTAERT, die grys is, met een  
 gaal groene afchgraauwe kop, de  
 (Campestris.) stuurvederen alle van eene  
 couleur, de buik witagtig.  
 EDWARDS *Birds*. III. 122. fig 2.  
 Woond in Jamaica.
- Bastardnag- 6 KWIKSTAERT, die van boven bruin  
 tegaal is, van onder wigtagtig, met  
 (Curruca.) bruine stuurvederen, d bui-  
 tenste met een dun wit randje,  
 Woond in Europa.
- (Hippolais.) 7 KWIKSTAERT, die groenagtig afch-  
 graauw is, van onder geel-  
 agtig, de leeden bruin, de  
 wenkbraauwen witagtig.  
 Woond in Europa.
- Riet Nagte-8 KWIKSTAERT, die afchgraauw is,  
 gaal van onder wit, met witte  
 (Salicaria.) wenkbraauwen. ALBIN. *Ois*.  
 III. 26.  
 Woond in Europa.

KWIK.

- Sylvia 9 KWIKSTAERT, die van boven afch-  
 (Sylvia.) graauw is, van onder wit,  
 de eerste stuurveer in de  
 lengte half wit, de tweede  
 wit aan de punt. BRISS. *Or-  
 nith.* III. p. 376. tab. 21. f. 1.  
 Woond in Europa.
- Vygeneeter 10 KWIKSTAERT, die wat bruin is,  
 (Ficedula.) van onder wit, de borst afch-  
 graauw gevlaakt.  
 Woond in Europa.
- Witte 11 KWIKSTAERT, met een zwarte borst,  
 (Alba.) de twee zylyngsche stuurve-  
 deren ter helfte in de schuinte  
 wit. ALBIN. *Ois.* I. 49.  
 Woond in Europa.
- Geele 12 KWIKSTAERT, [die groenagtig is]  
 (Flava.) de borst en buik geel, de twee  
 zylyngsche stuurvederen ter  
 helfte, in de schuinte, wit.  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 28. 1.  
 Woond in Europa.
- Gryze (A) KWIKSTAERT, die grys is, de keel  
 zwart, de borst en buik geel,  
 Ee 4 de

de vleugels bruin, de buitenste stuurvederen wit. EDW. *Glean.* I. tab. 259. *the grey water wagtail.*

Woond in America.

Bengaalsche 13 KWIKSTAERT, die groen is, van  
Vygeneter  
(*Tiphia.*)

onder geelagtig, de vleugels zwart met witte banden.

EDW. *Birds.* II. tab. 79.

Woond in Bengale.

Bruine 14 KWIKSTAERT, die roestcoleurig is;  
(*Stapazina.*)

de vleugels, staart en plaats der oogen bruin, de buitenste stuurvederen ter zyden wit. EDW. *Birds.* I. tab. 31.

Woond in Italiën, Spanje,

Witgatje 15 KWIKSTAERT, met een graauwe  
(*Oenanthe.*)

rug, een wit voorhoofd, een zwarte band om de oogen.

(*b*) *Kwikstaert*, die van onder bleek is, de stuurvederen aan de binnenzyde wit; de rug gegolfd.

BRISS. *Ornith.* III. p. 452. tab. 21. fig. 2.

Woond in Europa.

KWK-

- Noordsche 16 KWIKSTAERT, die zwartagtig is, met witte wenkbraauwen, en een witte vlak op de vleugelen, de borst en keel geelagtig BRISSON. *Ornith.* III. pag. 432. tab. 24. 1. Woond in Europa.
- (*Rubetra.*)
- Rosbuik 17 KWIKSTAERT, die grys is, van onder rosagtig, de keel met een witte band, en zwarte toomstreepen. Woond in de heggen in Europa.
- (*Rubicola.*)
- Zwartkap 18 KWIKSTAERT, die bleekrood is, van onder aschgrauw, met een zwartagtige kruin. Woond in Europa.
- (*Atricapilla.*)
- Penfylvanische 19. KWIKSTAERT, met een geelagtige kruin, en bloedroode zyden, [de keel en eerste stuurvederen van binnen wit.] EDW. *Glean.* II. 301. Woond in Penfylvanien.
- (*Penfylvanica*)
- Goudvlerk 20 KWIKSTAERT, die bruin is, van onder wit, de kruin en vlak op de
- (*Chrysopte-*

- ra.) de vleugelen geel, de keel  
zwart. EDW. *Glean.* II. 299.  
Woond in Pensylvanien.
- Gekroonde 21 KWIKSTAERT, die zwart gevlaakt  
(*Coronata.*) is, de kruin, zyden en stuit  
geel. EDW. *Glean.* II. 298.  
Woond in Pensylvanien.
- Van Senegal 22 KWIKSTAERT, die bruin is, de roei-  
(*Senegalen-* pennen van binnen ros, de  
*sis.*) ftuurvederen zwart, met wit-  
te punten.  
Woond in Senegal.
- Gemengelde 23 KWIKSTAERT, die wit en zwart  
(*Varia.*) bont is, met twee witte ban-  
den op de vleugelen, de staert  
gespleeten. BRISSON. *Ornith.*  
III. p. 529. tab. 27. f. 5.  
Woond in Jamaica, St. Do-  
mingo.
- Kaapfche 24 KWIKSTAERT, die bruin is, van on-  
(*Capensis.*) der witagtig, met een bruine  
borstband, witte wenkbrau-  
wen, de zylingfche ftuurve-  
deren fchuinfch wit. BUFF.  
*Hift. Nat. Ois.* 28. 2.  
Woond aan de Kaap.

KWIK-



- Geelkop 25 KWIKSTAERT, die grys is, van onder witagtig, de kruin geel, de oogband zwart, en twee geele banden op de vleugels. BRISS. *Ornith.* III. p. 517. tab. 27. f. 2.  
(*Icterocephala.*)  
Woond in Canada.
- van St. Domingo 26 KWIKSTAERT, die afchgrauw is, van onder wit, eengeele vlak voor, een witte agter, en een zwarte onder de oogen. BRISS. *Ornith.* III. pag. 520. tab. 27. f. 3.  
(*Dominica.*)  
Woond in Jamaica, St. Domingo.
- van Canada 27 KWIKSTAERT, die afchgrauwagtig is, van onder wit, de kruin en band om den buik geel, de borst bruingevlakt. BRISS. *Ornith.* p. 524. tab. 27. f. 1.  
(*Canadensis.*)  
Woond in Canada.
- van Madagafcar 28 KWIKSTAERT, die groenagtig is, van onder witagtig, de keelen aers geel, de oogleden wit.  
(*Maderaspatana.*)  
Woond in Madagafcar.

KWIK-

Goudkop 29 KWIKSTAERT, die olyfgroenis, van  
(*Aurocapilla*.) onder wit, de kruin goudgeel, de wenkbrauwen zwart, de borst met zwart gevloekt. EDW. *Glean.* I. 252. Woond in Penfylvanien.

Gemazelde 30 KWIKSTAERT, die olyfcoleurig is,  
(*Petechia*.) van onder geel, met rood gestipt, de kruin rood. EDW. *Glean.* II. tab. 206. 2. Woond in Noord America.

Witborst 31 KWIKSTAERT, die afchgrauw bruin  
(*Dumetorum*.) is, met een blaauwagtige kop, de keel en borst wit. Woond in Europa.

Kanneelec- 32 KWIKSTAERT, die gryis is, van on-  
ter der rood, de keel zwart, de  
(*Cinnamo-* vier eerfte roeipennen aan 't  
*mea*.) begin rood, Woond in Ceylon.

Zwarte 33 KWIKSTAERT, die zwart is, de fluit  
(*Caprata*.) en dekvederen der fluit en der vleugelen wit. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 235. 1. *Traquet*.

Woond

Woond in het Eiland Luçon.

Muurnagte-34 KWIKSTAERT, met eenezwarte keel,  
 gaal de buik en staart ros, de kop  
 (Phoenicu- en rug grys. BUFFON. *Hist.*  
*rus.*) *Nat. Ois.* 351. 1.

(b) *Kwikstaart* met zwartag-  
 tige slagpennen, het mid-  
 delste paar zwart, van bui-  
 ten ros.

NB. Volgens de afbeelding van  
 BUFFON is het wyfje van bo-  
 ven groenagtig bruin, van onder  
 zwavel geel, de stuurpennen ros.  
 Woond in Europa.

Roodstaart 35 KWIKSTAERT, met eengraauwe rug  
 (*Erithacus*) en slagvederen, de buik en  
 stuurvederen ros, de twee  
 buitenste afchgrauw.  
 Woond in Europa.

Guira 36 KWIKSTAERT, die groen is, van  
 (*Guira.*) onder geel, de koonen en  
 keel zwart, met een geele  
 rand. EDW. *Glean.* III. 352.  
 fig. 2.  
 Woond in Brazil.

KWIK-

- Blaauwborst 37 KWIKSTAERT, met een roestverwi-  
 (Succica.) ge borst met een blaauwe  
 band, de stuurvederen bruin,  
 aan hun begin roestverwig.  
 EDW. *Birds* I. 28.  
 Woond in Europa.
- Blaauwbrug 38 KWIKSTAERT, die van boven blaauw  
 (Sialis.) is, van onder geheel rood;  
 de buik wit. EDW. *Birds* I.  
 24. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 396.  
 Woond in de Bermudische  
 Eilanden.
- Philippyn- 39 KWIKSTAERT, die zwartagtig vio-  
 sche let is, met castanje bruine  
 (Fulicata.) dekvederen der staart, de  
 vlak der dekvederen op de  
 vleugelen wit. BRISS. *Or-  
 nith.* III. p. 444. t. 23. f. 2.  
 Woond in de Philippynsche  
 Eilanden.
- van Cayenne 40 KWIKSTAERT, die blaauw is, de  
 (Cayana.) halster, schouders, vleuge-  
 len en staart zwart. BRISS.  
*Ornith.* III. p. 534. t. 28. f. 1.  
 Woond in Mexico.

KWIK-

- Surinaam- 41 KWIKSTAERT, die blaauw is, de  
fche buik en stuit oranje. EDW.  
(*Velia.*) *Birds.* I. 22.  
Woond in Suriname.
- Van Canada 42 KWIKSTAERT, die van boven blaauw  
(*Canadensis.*) is, van onder wit, de keel,  
vleugels en staart zwart. EDW.  
*Glean.* I. 252. 1.  
Woond in Canada.
- Blaauwe 43 KWIKSTAERT, die van boven blaauw  
(*Coerulea.*) is, van onder wit, met een  
zwarte staart en vleugels.  
EDW. *Glean.* I. tab. 252. 1.  
Woond in America.
- Zingende 44 KWIKSTAERT, die zwartagtig is,  
(*Sibilis.*) van onder wit, de borst ros,  
een witte vlak op de vleugels.  
BRISS. *Ornith.* III. pag. 439.  
tab. 24. f. 4.  
Woond in Madagafcar.
- Roodborstje 45 KWIKSTAERT, die grys is, met  
(*Rubecula.*) een roestcoleurige keel en  
borst.  
Woond in Europa.
- Gegolfde 46 KWIKSTAERT, die grys is, de vleu-  
gels

(*Troglodytes.*) gels uit zwart en afchgrauw gegolfd. ALBIN. *Ois.* I. tab. 53. B.  
Woond in Europa.

Groen-geele 47 KWIKSTAERT, die afchgrauw groen  
(*Calendula.*) is, met een gloeyend geel-  
le streep op de kruin, de buik  
en vleugels van onder geel-  
agtig. EDW. *Glean.* II. 254. 2.  
Woond in Pensylvanien.

Winterko- 48 KWIKSTAERT, die de tweede rey  
ningje slagveeren aan den buiten  
(*Regulus.*) rand geel heeft, en in het  
midden wit; de kruin geel.  
CATESB. *Carol.* III. tab. 3.  
Woond in Europa [en Ame-  
rica.]

Kleine 49 KWIKSTAERT, die afchgrauw groen  
(*Trochilus.*) is, de vleugels van onder en  
aan de dekvederen geelag-  
tig, de wenkbraauwen geel.  
Woond in Europa, Asia, en  
America.

(B) KWIKSTAERT, die van boven bruin  
de

de kruin en oogkringen geel,  
de borst rood, de buik geel,  
en een witte vlak op de vleu-  
gelen. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
58. 3.  
Woond . . . . .

Driecoleuri-(C) KWIKSTAERT, die van boven  
ge zwart, van onder wit is, de  
zyden en het begin der stuur-  
pennen geel, en vyf geele  
vlakken op de vleugels.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 391. 2.  
Woond in Cayenne.

Bontkuif (D) KWIKSTAERT, die groen is, van  
onder geel, de kuif uit wit  
en bruin gemengeld. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 391. 1.  
Woond in Cayenne.

CXV. MANAKIN. De *bek* korter dan de kop,  
(PIPRÆ.) aan zyn begin wat drie-  
hoekig, zeer geheel, wat  
krom aan de punt.  
Drie voor en een agter *Vinger*.

- Rotshaan 1 MANAKIN, met een [zamengedruk-  
(*Rupicola.*) te] regt opstaande oranje  
kuif met een purpere rand,  
het lichaam oranje geel, de  
dekvederen der slagpennen  
geknot \*. EDW. *Glean.* II.  
tab. 264. fig. 2. BUFF. *Hist.*  
*Nat. Ois.* 39. VOSM. *Beschr.*  
Woond in America.
- Tye 2 MANAKIN, met een bloedroode  
(*Pareola.*) kuif, een zwart ligchaam en  
blaauwe rug. EDW. *Glean.* I.  
tab. 261. 1.  
Woond in Brasil en Cayen-  
ne.
- Gekuifde 5 MANAKIN, met eene geele kuif,  
(*Cristata.*) en purper ligchaam.  
Woond in Brasil.
- Geelkuif 4 MANAKIN, met een geele kuif, en  
(*Rubetra.*) een bleekrood lichaam; met  
blaauwe roei- en stuurvede-  
ren.  
Woond in America.
- Witkol 5 MANAKIN, met een witte kuif, een  
(*Albifrons.*) bleek roodligchaam, en een  
zwarte



zwarterug. EDWARDS. *Glean.*  
tab. 344.

Woond . . . . .

Roodkop 6 MANAKIN, die zwart is, met geele  
(*Erythrocephala.*) kniebanden en kop. BUFF.  
*Hist. Nat. Ois.* 34. 1.

(b) Roodkop PALL. *Spicil.*  
*Zool.*

Woond in Brasil.

Roode 7 MANAKIN, die zwart is, met een  
(*Aureola*) roode kop en borst, de stuur-  
vederen van vooren met een  
witte vlak. EDW. *Glean.* II.  
tab. 261.

(b) Zwart en oranje. EDW.  
*Birds.* II. 83.

Woond in Zuid America.

Witkop 8 MANAKIN, die zwart is, met een  
(*Leucocephala.*) witte kop\*. BUFF. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 34. 2.

Woond in Suriname.

Witkruin 9 MANAKIN, die zwart is, met eene  
(*Leucocilla.*) witte kruin. BRISS. *Ornith.*

IV. p. 446. tab. 35. fig. 2.

F f 2

Woond

Woond in Brasil, Suriname.

- Witkeel 10 MANAKIN, die zwart is, meteene  
(*Gutturalis.*) witte keel. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 324. 1.  
Woond in America.
- Fraaye 11 MANAKIN, die zwart is, met een  
(*Serena.*) blaauwe stuit en oranje  
buik \*. BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
324. 2.  
Woond in Cayenne en Suriname.
- Witkops 12 MANAKIN, die zwart is, van onder  
(*Manacus.*) wit, de vlak op de nek  
en op de vleugels wit \*. EDW. *Glean.* II. 260. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.* 302. 1.  
Woond in America.
- Kleine 13 MANAKIN, die grys is, de kop wit  
(*Minuta.*) en zwart gestippeld \*.  
Woond in Indien.
- Roode (A) MANAKIN, die zwart is, de kop,  
borst en buik rood, de keel  
en

en schouwers geel. BUFF.  
*Hist Nat. Ois.* 34. 3.  
 Woond in America.

Zwartkop (B) MANAKIN, die wit is, de kop,  
 rug, vleugels en staart zwart.  
 BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 303. 1.  
 Woond in America.

Gekuifde (C) MANAKIN, die groen is, met ee-  
 ne afhangende bloedroode  
 kuif. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*  
 303. 2.  
 Woond in America.

CXVI. MEES. De *bek* zeer geheel, [klein elsge-  
 (PARUS.) wyze] aan het begin met bor-  
 ftels gedekt.

De *Tong* geknot, en met bor-  
 ftels eindigende.

[De *Neusgaaten*, door de vederen  
 van den grond der bek be-  
 dekt.]

Twecoleu-1 MEES, met een gekuifde kop, die  
 rige van vooren zwart is, een  
 Ff 3 afch-

(Bicolor.)

afchgraauw ligchaam, van  
 onder rosagtig wit. CAT.  
*Carol.* I. tab. 57.

Woond in Noord America.

Gekuifde 2 MEES, met een [zwart en wit] ge-  
 (Cristatus.) kuifde kop, een zwarte hals-  
 band, en witte buik [het  
 ligchaam groenagtig ]

*BUFF. Hist. Nat. Ois.* 502. 2.

Woond in Europa.

Plakker 3 MEES, met een zwarte kop, witte  
 (Major.) slaapen en eene geele nek.

*ALBIN. Ois.* I. p. 44. tab. 46.

Woond in Europa, des zo-  
 mers veel in Spanje.

Blaauwkuif (A) MEES, met een blaauwe kuif, wit-  
 te slaapen, zwarte keel, groen  
 ligchaam, klaauwe vleugels,  
 en geele buik. *BUFF. Hist.*  
*Nat. Ois.* 3. f. 2.

Woond in Europa.

Americaan 4 MEES, die blaauwagtig is, met  
 sche geele slaapen, buik en rug,  
 de

- (*Americanus.*) de zyden purperagtig. CAT. I. tab. 64.  
Woond in Noord America.
- Blaauwe 5 MEES, met blaauwagtige ftuurvederen, de eerfte aan de buitenrand wit, het voorhoofd wit, de kruin blaauw. ALBIN. *Ois.* I. tab. 47.  
(*Coeruleus.*) Woond in Europa.
- Zwartkop 6 MEES, met eene zwarte kruin en keel, een afchgrauw lichaam, dat van onder wit. is: BRISS. *Ornith.* III. pag. 553. tab. 29. f. 1.  
(*Atricapillus.*) Woond in Canada.
- Koolmees 7 MEES, met een zwarte kop, en afchgrauwe rug, het agterhoofd en borst wit. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.* 3. 1.  
(*Ater.*) Woond in Europa.
- Riet Mees 8 MEES, met een zwarte kop, een afchgrauwe rug, en witte  
(*Palustris.*) Ff 4 flaa-

slaapen. BUFFON. *Hist. Nat.*  
*Ois.* 3. 3. *Nonette.*  
 Woond in Europa.

NB. In de afbeeldingen van deze  
 plaat is eene feil, zynde N, 3.  
 voor No. 1. gesteld en No. 1.  
 voor No. 3.

Virginiaan- 9 MEES, met een geele stuit en afch-  
 fche graauw ligchaam. CATESB.  
 (*Virginianus.*) *Carol.* tab. 58.  
 Woond in Noord Ameri-  
 ca.

Vreemde 10 MEES, met een roode stuit, en  
 (*Peregrinus.*) een afchgrauw ligchaam, dat  
 van onder wit is.  
 Woond in . . . . .

Staertmees 11 MEES, met een witte kruin, [een  
 (*Caudatus.*) zwarte band over de ooggen,  
 en langs den hals, het lig-  
 chaam okergeel,] de staart  
 langer dan het ligchaam, [de  
 drie eerste stuurvederen  
 wit.]

wit.] BUFF. *Hist. Nat. Ois.*  
502. 3.  
Woond in Europa.

Baardman- 12 MEES, met eene graauwe kruin, de  
netje staart langer dan het lig-  
(*Biarmicus.*) chaam, de kop gebaard.  
EDW. *Birds.* II. 55.  
Woond in Europa.  
NB. Dit is een Klaauwier.

Remiz 13 MEES, met een wat roestcoleu-  
(*Pendulinus.*) rige kop, een zwarte oog-  
band, bruine vleugels en  
staart, beide met roestco-  
leurige randen. ALBIN. *Ois.*  
III. p. 53. tab. 59.

Witbek 14 MEES, die zwart is, met een wit-  
(*Cela.*) te bek, de vlak op de vleugels  
en het begin der staart geel.  
Woond in Indien.

CXVII. ZWALUW. De *bek* zeer klein, krom,  
(HIRUNDO) elsgewyze, aan het be-  
gin plat.

De *gaping* grooter dan de kop.

- Boerezwa- 1 ZWALUW, met een witte vlak op  
 luw de ftuurvederen, behalven  
 (*Rustica.*) op de twee middelste. AL-  
 BIN. *Ois.* I. p. 43. tab. 45.  
 Woond in Europa.
- Capus 2 ZWALUW, met een witte vlak op  
 (*Esculenta.*) alle de ftuurvederen. BRISS.  
*Ornith.* II. pag. 510. tab. 46.  
 fig. 2.  
 Woond in Europa.
- Stadszwa- 3 ZWALUW, met ongevlakte ftuurve-  
 luw deren, de rug zwartagtig  
 (*Urbica.*) blaauw, van onder geheel  
 wit. ALBIN. *Ois.* II. tab.  
 56. fig. A.  
 Woond in Europa.
- Strand-Zwa-4 ZWALUW, die afchgraauw is, met  
 luw eene witte keel en buik.  
 (*Riparia.*) BUFF. *Hift. Nat. Ois.* 543. 2.  
 Woond in Europa.
- Langvleugel5 ZWALUW, die zwartagtig is, met  
 eene



(*Apus.*) eene witte keel, alle vier de vingers naar vooren. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 542. 1. *Martinet.*

Woond in Europa.

Purpere 6 ZWALUW, die geheel violet is, met  
(*Purpurea.*) een gespleeten staart. CAT. *Carol.*I. I. tab. 51.

Woond in Noord America.

Blaauwe van 7 ZWALUW, die zwartagtig blaauw is,  
Canada de bek en het onderlyf asch-  
(*Subis.*) graauw wit. EDW. *Birds.* III. 120. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 545. 2.

Woond aan Hudfons Baay.

Van Senegal 8 ZWALUW, die glanzig zwart is,  
(*Senegalen-* van onder ros. BUFFON. *Hist.*  
*sis.*) *Nat. Ois.* 310.

Woond in Senegal.

Tapera. 9 ZWALUW, met gelyke stuurvederen,  
(*Tapera.*) een zwartagtig ligchaam, onder wit. BRISS. *Ornith.* II. p. 502. tab. 45 f. 3.

Woond in America.

ZWA-

- Puntstaart 10 ZWALUW, met gelyke stuurvederen, met naakte elsgewyze punten, [het ligchaam zwart-agtig van onder ros. BUFF. *Hist. Nat Ois.* 544. 1.  
Woond in Martinica.
- Bruine 11 ZWALUW, die bruin is, met een  
(*Melba.*) witte keel en buik. EDW. *Birds.* I. 27.  
Woond te Cadix.
- Zee Zwaluw 12 ZWALUW, met halv naakte dyen.  
(*Praticola.*) BRISS. *Ornith.* V. pag. 141.  
tab. 12. fig. 1.  
Woond in het Zuidlyke van  
Europa aan de Stranden.
- Americaan- (A) ZWALUW, die van boven blaauw  
fche is, van onder vuil wit, de  
kop, keel en borst bruin.  
BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 545. 1.  
Woond in America.
- Blaauwrug (B) ZWALUW, die de kop en halve  
rug blaauw heeft, de vleu-  
gels en staart zwart, van  
onder wit, de vingers alle  
vier

vier naar vooren. BUFFON.  
*Hist. Nat. Ois.* 542. 2. *Martinet.*

Woond . . . . .

Roskeel (C) ZWALUW, die blaauw is, met een roffe keel, bruine borst, en witte buik \*. BUFFON.  
*Hist. Nat. Ois.* 543. 1.  
 Woond in Europa.

Donkere (D) ZWALUW, die roodagtig zwart is, van onder ligter, met zwarte langwerpige vlakken. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 544. 2.  
 Woond op het Eiland Bourbon.

Gevlakte (E) ZWALUW, die zwart is, van onder wit, met zwarte vlakken. BUFF. *Hist. Nat. Ois.* 546. 1.  
 Woond in Cayenne.

Bonte (F) ZWALUW, die blaauw is, met witte dekvederen, en zwarte roeipennen van onder wit.

wit. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*

546. 2.

Woond . . . . .

CXVIII. GEITENMELKER. De *bek* maatig krom,  
(CAPRIMULGUS.) zeer klein, elsge-

wyze, en aan zyn  
begin plat.

De *Knevelharen* op  
eene rei, als oog  
haren.

De *gaping* zeer  
wyd.

De *Tong* puntig en  
zeer geheel.

Europifche GEITENMELKER, die bruin is, met  
(*Europaeus.*)

ros wit en zwart gevlakt,  
een witte vlak op de fluur-  
vederen; de kop zwartag-  
tig. BUFFON. *Hist. Nat. Ois.*  
193.

Woond in Europa en Ame-  
rica.

Americaan- 2 GEITENMELKER, die ligt geel is,  
met.

fche  
(*America-*  
*nus.*)

met roffe, roode, en brui-  
ne vlakken, de oogkringen  
geel, de ftaart met zwavel  
coleure banden, van onder  
wit. BUFFON. *Hift. Nat. Ois.*  
325.

Woond in America.

*Einde van het I. Deel's, IIde Stuk.*



DRUK-

DRUKFOUTEN aldus te verbeteren.

bladz.

- 99 reg. 17 voor haar vederen lees *stuurvederen* wier  
middelste
- 100 — 4 agter gefipt zyn ; l. de borst ros.
- — 10 roefte l. roeft.
- laatste van binnen l. aan de binnen kant
- 101 — 5 agter was te voegen gepluimde.
- 102 — 9 — buik l. de rug blaauwachtig zwart.
- — 22 voeg by, Woond in Europa Africa.
- 104 — 9 13 l. 15
- — 23 *Tinunculus* l. *Tinnunculus*.
- 109 — 8 onder kleine te voegen, minutus
- — 13 met een ros lichaam l. met hoorens
- 100 — 8 onder Americaanfche voeg *Afio*
- 116 — 21 onder langstaart l. *Macrourus*
- 117 — laatste 5 l. 9.
- 120 — laatste Senegal l. Madagafcar.
- 122 — puper l. purper
- 126 — groenen l. roey en
- 132 — 9 roeftwervige l. roeftverwige
- 132 — 12 staart l. ftraat.
- 134 — 4 lees kortstaartige Papegaay die groen  
is.
- 139 — 18 lees kortstaartige Papegaay die gèel is.
- 146 — 2 onder goudvlek l. *Crysopterus*
- 148 — 15 onder Toucan l. *Ramphastos*,
- 154 — 8 *oscon* l. *icon*.
- 156 — 14 rood l. rond
- 159 — 12 13 l. 14
- ibid. — 17 14 l. 15
- 160 — 3 15 l. 16
- 161 — 20 14 l. 17
- ibid. — 21 *pyrocorax* l. *pyrrhocorax*
- 162 — 13 lees de bek mesvormig
- 166 — 14 staart l. ftuit.

bladz.



4827













